ट्राइसाइक्लोजोल 75% डब्ल्यू पी
इंडोफिल का बाण
आंतरप्रवाही फफूंदनाशक

इंडोफिल का बान यह एक आंतरप्रवाही फफूंदनाशक है जिसमें ट्राईसाइक्लोजोल सक्रीय तत्व 75% बाकी दूसरे पदार्थ है । यह अत्यध्ययी महत्वपूर्ण फसल जैसे धान पर आने वाले सहसामारी रोग (ब्लास्ट) का प्रभावकारी रूप से नियंत्रण करता है । इसका इस्तेमाल बीज उपचार और परिली फुहार – पर्णा गर्दन सहसामारी (ब्लास्ट) नियंत्रण के लिए (फुहार विशेषत : बाली निकलने के पहले की अवस्था में और पर्णा सहसामारी (ब्लास्ट) के चिन्ह देखने पर).

उपयोग की मात्रा :

फसल	रोग का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हैक्टर				आखिरी छिड़काव और कटाई के बीज का अन्तर (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी में बनाने के लिए (लीटर)		
धान	सहसामारी (ब्लास्ट) (फुहार)	225-300	300-400	500		30 दिन
	सहसामारी (बीज उपचार) (ब्लास्ट)	22.5 ग्रा प्रति10कि. बीज	30 ग्रा प्रति10 कि. बीज	1 लि. प्रति 10 किलो बीज		

पौध सुरक्षा साधन : बीज उपचार के लिए बीज उपचार यन्त्र का उपयोग कीजिये । फफूंदनाशक को छिड़काव करते समय, पीठ पर लादने वाले छिड़ाकाव यन्त्र को हालो कोन नोजल लगा कर, इसका इस्तेमाल करें । **सावधानियाँ :** घोल तैयार करते समय गन्ध सांस के भीतर न जाने दें और ना ही चमड़ी से स्पर्श होने दें । इसे नंगे हाथों से न मिलायें । उपयोग के समय तमाखू ना चंघुलना और धुम्रपान ना किजिए । **विषबाधा के लक्षण :** पहले लक्षण कई संयोग में हो सकता है जैसे सिरदर्द, चक्कर , मितली या निगल जाने पर शरीर मे ऐंठन । **प्रथमोपचार :** त्वचा दूषित होने पर भरपूर पानी और साबून से धोइये । आखों में जाने पर स्वच्छ पानी से धोइये ।

विषनाशक : चिकित्सानुकूल, निगल जाने पर उल्टी करवाइए, ऐक्टिवेटेड कोयले (चारकोल) के साथ गॅस्ट्रिक लव्हेज दीजिये । इसके बाद सेलाइन और कॅथर्ट्रीक और समर्थक चिकित्सा दीजिए । **संचय :** १) फफूंदनाशक के डिब्बे अलग कमरे मे रखिये तथा अन्य (खाद्य) पदार्थ के रखने वाली जगह से दूर रखिए । फफूंदनाशक के वजन तथा फैलाव के हिसाब से अलग तालाबन्द अलमारी में रखिए। २) फफूंदनाशक रखने वाला कमरा या जगह सूखी, रोशनदान, हवायुक्त, ठंडी, अच्छी तरह बनी तथा बड़े आकारवाली होनी चाहिए ताकि वातावरण दूषित न हो । **खाली डिब्बों को नष्ट करना :** १) खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सानों के रहने वाली जगह से दूर, नष्ट करें तथा जमीन में गाड दें । २) खाली डिब्बों को बाहर न रखें ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो सके । ३) डिब्बे, बचा हुआ कीटनाशक तथा सफाई वाले पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फैंके (रखें) ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो ।

उत्पादक व विक्रेता : **इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड**
रजि. ऑफ़िस : कल्पतरू स्क्वेअर, चौथी मंज़िल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९ Hindi

ट्रायसायक्लोझोल ७५% डब्ल्यू पी
इंडोफिलचा बाण
आंतरप्रवाही बुरशीनाशक

इंडोफिलचा बाण हे एक आंतरप्रवाहि बुरशिनाशक असून त्यामध्ये ट्रायसायक्लोझोल हा क्रियाशील घटक ७५ % व/व असतो आणि उर्वरित भाग अन्य घटक असतात. भात पिकाची नासाडी करणाऱ्या करचा रोगाचा ते प्रभावीपणे बंदोबस्त करते. लोंबीवरील करचा रोगाचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्याचा उपयोग प्रथम बियाण्याला पूट देण्यासाठी आणि नंतर पातीवर करावा. (पोयीच्या अखेरच्या अवस्थेत परंतु लोंबी फुटण्याआधी) किंवा पातीवरील करचाच्या बंदोबस्त करता रोगाची प्राथमिक चिन्ह दिसू लागताच करावा.

वापराबाबत शिफारशी :

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	दर हेक्टरी प्रमाण			शेवटची फवारणी व कापणी या मध्ये अंतर (दिवस)
		सक्रिय घटक (ग्रॅम)	औषध (ग्रॅम)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लीटर)	
भात	करचा लोंबीवरील व पातीवरील (पातीवरील फवारणीसाठी) करचा (बियाण्याला पूट देण्यासाठी)	२२५–३००	३००–४००	५००	३०दिवस
		२२.५ ग्रॅम प्रति १०कि. बियाण्या साठी	३० ग्रॅम प्रति१० कि. बियाण्या साठी	१ लि. प्रति १० किलो बियाण्यासाठी	
		२२.५/१० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टर	३०/१० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टर	१ लि./१० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टर	

पीक संरक्षण उपकरणे : बियाण्याला पूट देण्यासाठी पिंप किंवा फिरता ड्रम वापरावा. बुरशीनाशकाच्या फवारणीसाठी हॉली कोन नॉझल बसवलेला नॅपसॅक स्प्रेयर वापरावा. **सावधगिरी :** बुरशीनाशकाचे द्रावण तयार करताना हुंगू नका आणि अंगाला लागू देऊ नका. नुसत्या हातांनी मिश्रण करू नका. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका किंवा तंबाखू चघळू नका. **विषबाधेची लक्षणे :** डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळ आणि आकडी ही लक्षणे हे बुरशीनाशक पोटात गेले असता उद्भवतात.

प्रथमोपचार : अंगाला लागले असेल तर त्वचा भरपूर साबण लावून पाण्याने धुवावी. डोळ्यात गेले असेल तर स्वच्छ पाण्याचे हबके मारून डोळे निट धुवावे. **विषनिवारण :** लक्षणानुरूप उपचार. गिळले गेले असल्यास उलटी करवावी. ॲक्टिव्हेटेड चारकोलने गॅस्ट्रिक लॅव्हेज द्यावे. त्या नंतर सलाईन कॅथोर्टिक आणि साह्यकारक उपचार करावे.

साठवण : १) ह्या बुरशीनाशकाचे खोके, इतर वस्तू तेथव्यासाठी असलेल्या खोल्या वा जागा यापासून दुर अशा खोल्यात किंवा जागेत किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण व स्वरूप यानूरूप कपाटात, कडी कुलपात ठेवावे. २) हे बुरशीनाशक ठेवण्याचा खोल्या वा जागा उत्तम बांधणीच्या, कोरड्या, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा मोठ्या असाव्यात. म्हणजे त्याच्या वापरेने प्रदुषण होणार नही. **खोक्यांची विल्हेवाट :** १) त्याचे खोके मोडून तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरावेत. २) वापरलेले खोके पुन वापरता येऊ नयेत म्हणून ते उघडयावर टाकू नयेत. ३) उरलेल साहित्य तसेच उपकरणी वगैरे धुतलेले पाणी, पर्यावरण किंवा जलसाठे प्रदूषित होणार नाहीत याची काळजी घेऊन त्याची विल्हे वाट लावावी

उत्पादक आणि विपणनकर्ता : **इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
रजि. ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४था माळा, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९ Marathi

ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜ਼ੋਲ ੭੫% ਡਬਲਯੂਪੀ
ਇੰਡੋਫਿਲ ਦਾ ਬਾਨ
ਸਿਸਟੇਮਿਕ (ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ) ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ

ਇੰਡੋਫਿਲ ਦਾ ਬਾਨ ਇਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜ਼ੋਲ ਏ.ਆਈ. ੭੫% ਵ/ਵ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੂਜੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਨੇ ਦੇ ਝੁਲਸਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਉ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ (ਪਨੀਰੀ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਫੁੱਟ ਚੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਝੁਲਸੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਉ :

ਫਸਲ	ਰੋਗਾ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ				ਆਖਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਉਤੀਰ ਦੇ ਦਿਨ
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫ਼ਾਰਮੂ-ਲੇਸ਼ਨ	ਘੋਲ ਲਈ ਪਾਣੀ (ਲਿ.)		
ਝੋਨਾ	ਝੁੰਡਰ ਦਾ ਝੁਲਸਾ ਅਤੇ ਪੋਰੇ ਦਾ ਝੁਲਸਾ ਪੋਰਿਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ (ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ)	੨੨੫-੩੦੦	੩੦੦-੪੦੦	੫੦੦	੩੦	
		੨੨.੫/੧੦ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ	੩੦/੧੦ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ	੧ ਲਿ./੧੦ ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਬੀਜ		

ਪੋਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਾਮਾਨ : ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਬੀਜ ਢੋਲ/ਘੁੰਮਦਾ ਡ੍ਰਮ ਵਰਤੋ। ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਸਮੇ ਹਾਲੋਕੈਨੋ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗਾ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਤੋ। **ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :** ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਿਚੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਛੋਹਣ ਦਿਓ। **ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ :** ਆਰੰਭਕ, ਨਿਸਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ- ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੋਕਰ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਏਂਠਨ। **ਫ਼ਸਟ ਏਡ :** ਚਮੜੀ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਅੰਖਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। **ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਨ :** ਇਲਾਮਤੀ। ਜੇ ਨਿਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਗੈਸਟਰਿਕ ਲੈਵੇਜ ਵਰਤੋ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਲੀਨ ਕੈਥਾਰਟਿਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿਓ। **ਸਟੋਰੇਜ :** ੧. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਜਾਂਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ, ਖ਼ੁਸ਼ਕ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲੇ। **ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ :** ੧. ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿਓ। ੨. ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩. ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਧੋਣ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂਮੁੰਡਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ : **ਇੰਡੋਫਿਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ**
ਰਜਿ. ਆਫ਼ਿਸ : ਕਲਪਤਰੂ ਸਕਵੇਅਰ, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 PUNJABI

ত্ৰাইচাইক্লেজ'ল ৭৫% ডব্লিউপি
ইণ্ডোফিলেৰ বান
সৰ্ববাঙ্গবাহী ভেঁকুৰনাশক

ইণ্ডোফিলেৰ বান হ'ল এবিধ সৰ্ববাঙ্গবাহী ভেকুঁৰনাশক য'ত ত্ৰাইচাইক্লেজ'ল এ.আই. ৭৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ। থাকে, আন বাকীখিনি আনুসঙ্গিক উপাদান। ধানখেতিত যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰা ব্লাষ্টবোগ এই দৰবে ফলপ্ৰদ ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এই দৰবে পেণিক'ল বালষ্ট অৰ্থাৎ ফুলৰ আগ ওলোৱাৰ আগে আগে, শাতৰ ব্লাষ্টৰ প্ৰথম লক্ষণ দেখা দিয়াৰ আগতে আৰু বীজ সোধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

ব্যৱহাৰৰ অনুমোদন

শস্য	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	হেক্টৰে প্ৰতি মাত্ৰা			শেষ স্প্ৰে আৰু চপোৱাৰ ব্যৱধান (দিন)
		এ.আই. (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশন (গ্ৰাম)	পানীত চৰলীকৰণ (লিটাৰ)	
ধান	ব্লাষ্ট পেনিক্‌ল আৰু লিফ স্প্ৰে (স্প্ৰে) (স্প্ৰে) ব্লাষ্ট বীজত প্ৰয়োগ	২২৫-৩০০ ২২.৫/ ১০ কেজি বীজ	৩০০-৪০০ ৩০/১০ কেজি বীজ	৫০০ ১ লিটাৰ ১০ কেজি বীজৰ বাবে	৩০

শস্য সুৰক্ষাৰ সঁজুলি : বীজত প্ৰয়োগৰ বাবে ছীড ড্ৰাম/ৰটেটিং ড্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰক । হ'ল ক'ন নজল যুক্ত নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ স্প্ৰে কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত ।

সতৰ্কতা: উশাহত যাবলৈ আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব, বিশেষকৈ পানীত মিহলাওঁতে । খালী হাতেৰে মিহিললাব । প্ৰয়োগৰ সময়ত ধূমপান কৰা বা ধপাত খোৱা নিষিদ্ধ ।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ : বিষক্ৰিয়াৰ প্ৰথম লক্ষনবৰ ভিতৰৰত মুখৰ বিষ, মূৰ ঘূৰণি, ওকালি আৰু পেটলৈ গ'লে কনভালচনৰ হ'ব পাৰে ।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা : যদি ছালৰ সংস্পৰ্শত আহে, লগে লগে চাবোন আৰু প্ৰচুৰ পানীৰে ধোৱক । চকুত লাগিলে পৰিষ্কাৰ পানীৰে ভালদৰৰ চকু ধোৱক ।

প্ৰতিকাৰ : লক্ষণভিত্তিক । পেটলৈ গৈছে যদি, বমি কৰাবাওক । এক্টিভেটেড চাৰকোলৰ লগত গেস্ট্ৰিক লেভেজ দিয়ক । তাৰ পাছত চেলাইন কেথাৰ্টিক আৰু আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দিয়ক ।

মজুতকৰণ : ১. এই দৰবৰ পেকেট সমূহ আন বস্তু ৰখা কোঠা বা চৌহদৰ আতৰত অন্য কোনো কোঠাত মজুত কৰিব । দৰবৰ পৰিমাণ আৰু ওজনগুনৰ ভিত্তিত দৰকাৰ হলে আলমাৰীত তলামাৰি ৰাখিব । ২. ভেঁকুৰনাশক মজুত কৰা কোঠাৰা চৌহদ মজবুত পোহৰ পৰা, শুকান, বতাহ চলাচল কৰা আৰু যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত যাতে বাষ্পৰ দ্বাৰা দূষিত ন হয় ।

পাত্ৰ নষ্টকৰণ: ১. পেকেটবোৰ ভাঙি বসতিস্থলৰ আতৰত পুতি পেলাব । ২. পুনৰ ব্যৱহাৰ যাতে নহয় তাৰ বাবে ব্যৱহৃত পেকেট বাহিৰত পেলাই নাহিব । ৩. বাহি হোৱা সামগ্ৰীৰ পেকেট আৰু ধোৱা পথলাৰ পাছৰ পেলনীয়া খিনি এনেদৰে নিবাপদে নষ্ট কৰা উচিত যাতে পানী বা পৰিবেশ দূষিত নহয় ।

উৎপাদনকৰ্তা আৰু বিপণনকৰ্তা : **ইণ্ডোফিল ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেড**
ৰেজি. অফিচ : কল্পতৰু স্কুয়াৰ, ৪ৰ্থ মহলা, কণ্ডিভিটা ৰোড, অফ আন্ধেৰী-কুৰ্লা ৰোড, আন্ধেৰী (পূৰ্ব), মুম্বাই- ৪০০ ০৬৯ Assamese

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९

Factory : Unit G - Plot No. 2201, 2202, 2336, 2337, G.I.D.C. Panoli, Tal. - Ankleshwar, Dist.- Bharuch, Gujarat - 394116
Unit SS - C/o S.S.Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P) - 462023

फैक्टरी : युनिट जी – प्लॉट नं. २२०१, २२०२, २३३६, २३३७, जी.आय.डी.सी. पानोली, ता. – अंकलेश्वर, जि.– भरूच, गुजरात – ३९४११६
युनिट एस एस– C/o एस.एस.क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. –१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

For any complaint contact Customer Care Cell at
Indofil Industries Limited, Kalpataru Square,
4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road,
Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.
फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

उत्पादक व विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड
रजि. ऑफ़िस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९
03.22.V1

TRICYCLAZOLE 75% WP
Systemic fungicide

INDOFIL'S BAAN®

® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

Manufactured & Marketed by :
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

TRICYCLAZOLE 75% WP
Indofil's Baan®
Systemic Fungicide

Indofil's Baan is a systemic fungicide containing Tricyclazole a.i 75% w/w, Balance other ingredients. It effectively controls paddy blast disease which is of economic importance. It should be used for seed treatment and for foliar spray for the control of panicle blast (at late booting but before panicle emergence) or leaf blast when first symptoms appear.

Use Recommendations :

Crop	Common Name of Disease	Dosage per hectare			Interval between final spray & harvest in days
		ai. (gms)	formulation (gms)	Dilution in water (Lts)	
Paddy	Blast Panicle & Leaf (Foliar spray) Blast (seed Treat-ment)	225-300	300-400	500	30
		22.5/10 kg seed	30/10 kg seed	For 1L/10 kg seed	

Plant Protection : For seed treatment use seed drum/rotating drum. **Equipment:** Knapsack sprayer fitted with a hollow cone nozzle Is to be used while spraying the fungicide. **Precautions :** Avoid inhalation and skin contact while diluting the Fungicide. Do not mix with bare hands. Do not smoke and chew tobacco During application. **Poisoning Symptoms :** Early symptoms may be any combination of headache, giddiness, nausea and convulsions if swallowed. **First Aid :** If skin is contaminated, wash with soap and plenty of water. If eyes are contaminated flush well with clean water. **Antidote :** Symptomatic. If swallowed, induce vomiting, gastric. Lavage with activated charcoal followed by saline cathartic and supportive treatment. **Storage :** 1. The packages containing the fungicide shall be Stored in separate rooms or premises, away from the Room or Premises used for storing other articles or shall be kept in Separate almirahs under lock and key depending upon the Quantity and nature of fungicide. 2. The room or premises for storing the fungicide shall be well built, well-lit, dry and well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour. **Disposal of Containers :** 1. The packages shall be broken and Burried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Package of surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Manufactured & Marketed by : **Indofil Industries Limited**
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 English

ट्रायसायक्लोजोल ७५% डब्ल्यू पी
इंडोफिलची बान
आंतरप्रवाही बुरशीनाशक

इंडोफिलची बान हे एक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे त्यामध्ये ट्रायसायक्लोजोल हा क्रियाशील घटक ७५ % व/व असतो आणि उर्वरित भाग अन्य घटक असतात. भात पिकाची नासाडी करणाऱ्या करचा रोगाचा ते प्रभावीपणे बंदोबस्त करते. लोंबीवरील करचा रोगाचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्याचा उपयोग प्रथम बियाण्याला पूट देण्यासाठी आणि नंतर पातीवर करावा. (पोयीच्या अखेरच्या अवस्थेत परंतु लोंबी फुटण्याआधी) किंवा पातीवरील करचाच्या बंदोबस्त करता रोगाची प्राथमिक चिन्ह दिसू लागताच करावा.

वापराबाबत शिफारशी :

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	दर हेक्टरी प्रमाण			शेवटची फवारणी व कापणी या मध्ये अंतर (दिवस)
		सक्रिय घटक (ग्रॅम)	औषध (ग्रॅम)	सौम्य करण्यासाठी पाणी (लीटर)	
भात	करचा लोंबीवरील व पातीवरील (पातीवरील फवारणीसाठी) करचा (बियाण्याला पूट देण्यासाठी)	२२५–३००	३००–४००	५००	३०दिवस
		२२.५ ग्रॅम प्रति १०कि. बियाण्या साठी	३० ग्रॅम प्रति१० कि. बियाण्या साठी	१ लि. प्रति १० किलो बियाण्यासाठी	
		२२.५/१० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टर	३०/१० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टर	१ लि./१० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टर	

पीक संरक्षण उपकरणे : बियाण्याला पूट देण्यासाठी पिंप किंवा फिरता ड्रम वापरावा. बुरशीनाशकाच्या फवारणीसाठी हॉली कोन नॉझल बसवलेला नॅपसॅक स्प्रेयर वापरावा. **सावधगिरी :** बुरशीनाशकाचे द्रावण तयार करताना हुंगू नका आणि अंगाला लागू देऊ नका. नुसत्या हातांनी मिश्रण करू नका. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका किंवा तंबाखू चघळू नका. **विषबाधेची लक्षणे :** डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळ आणि आकडी ही लक्षणे हे बुरशीनाशक पोटात गेले असता उद्भवतात.

प्रथमोपचार : अंगाला लागले असेल तर त्वचा भरपूर साबण लावून पाण्याने धुवावी. डोळ्यात गेले असेल तर स्वच्छ पाण्याचे हबके मारून डोळे निट धुवावे. **विषनिवारण :** लक्षणानुरूप उपचार. गिळले गेले असल्यास उलटी करवावी. ॲक्टिव्हेटेड चारकोलने गॅस्ट्रिक लॅव्हेज द्यावे. त्या नंतर सलाईन कॅथोर्टिक आणि साह्यकारक उपचार करावे.

साठवण : १) ह्या बुरशीनाशकाचे खोके, इतर वस्तू तेथव्यासाठी असलेल्या खोल्या वा जागा यापासून दुर अशा खोल्यात किंवा जागेत किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण व स्वरूप यानूरूप कपाटात, कडी कुलपात ठेवावे. २) हे बुरशीनाशक ठेवण्याचा खोल्या वा जागा उत्तम बांधणीच्या, कोरड्या, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा मोठ्या असाव्यात. म्हणजे त्याच्या वापरेने प्रदुषण होणार नही. **खोक्यांची विल्हेवाट :** १) त्याचे खोके मोडून तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरावेत. २) वापरलेले खोके पुन वापरता येऊ नयेत म्हणून ते उघडयावर टाकू नयेत. ३) उरलेल साहित्य तसेच उपकरणी वगैरे धुतलेले पाणी, पर्यावरण किंवा जलसाठे प्रदूषित होणार नाहीत याची काळजी घेऊन त्याची विल्हे वाट लावावी

उत्पादक आणि विपणनकर्ता : **इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
रजि. ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४था माळा, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०५९ Marathi

ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యూపి
ఇండోఫిల్ వారి బాన్
అంతర్వాహిత శిలీంధ్రనాశిని

ఇండోఫిల్ వారి బాన్ ట్రైసైక్లోజోల్ 75% డబ్ల్యూపి మూల పదార్థము కలిగి మరియు మిగిలినది ఇతర పదార్థములు కలిగి యున్న ఒక అంతర్వాహిత శిలీంధ్రనాశిని. ఆర్థికరంగా గుర్తించదగిన వరి తెగులు అయిన వరి నెమలువు ప్రధాన నివారణంలోగా అరికట్టును. ఇది వరి విత్తన శుద్ధికి మరియు కంకిపై నల్లని లర్జి తెగులు (పోటాకు చివరి దశలో మరియు కంకి వచ్చే తరుణములో) లేక ఆకుపై నల్లని లర్జి తెగులు లక్షణాలు కనిపించగానే పిచికారి చేయుచుము.

వాడువిధి సిఫారసులు:

పైరు	తెగులు పేరు	పరిశోధన మోతాదు			చివరి స్ప్రేకు కోతకు మధ్య ఉండవలసిన వ్యవధి (రోజులలో)
		మూల పదార్థము (గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా.)	సిలికోన్ జిగురునీరు మోతాదు (లీటర్లలో)	
వరి	లర్జి తెగులు కంకి మరియు ఆకు (పైచివర ప్రే) లర్జి తెగులు (విత్తన శుద్ధి)	225-300	300-400	500	30
		22.5/ 10 కి.గ్రా. విత్తనాలకు	30/ 10 కి.గ్రా. విత్తనాలకు	ఒక లీటరు/ 10 కి.గ్రా. విత్తనాలకు	

నివారణ పద్ధతులు: విత్తన శుద్ధికి విత్తనములు ప్రమ్మువాగి/రోల్లువాడికి అనువుగా యుండే ప్రమ్మువాగి వుపయోగించండి. ఈ సందర్భము సీడింగు చేయుటకు హోలోకోన్ నాజిల్ బిగించిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయరును ఉపయోగించండి. **మందు బాగుగా పిచికారి:** శిలీంధ్రనాశిని సీటిలో కలుపునప్పుడు మందును సీల్చడమునకు లేదా చర్మానికి మందు తగులకుండా మాదిరిగాను. నట్టి చేతులతో మందు కలుపరాదు. మందు చల్లునప్పుడు పొగాకు నమలడమును, పొగ త్రాగడమును నిషేధించుట. **విషప్రభావాలు:** మందు కడుపు లోపలి పోయినప్పుడు తలదిమ్మతో బాధించబడుట వికారము మరియు అసహ్యము కలుగుట తలకి తిరి లక్షణాలు కనిపించును. **ప్రథమ చికిత్స:** ఒకవేళ మందు చర్మమునకు సోకిన ఎడల సబ్బుతో ఎక్కువ నీరు ఉపయోగించి కడగండి. కళ్లలో పడినట్లైతే కళ్లను మంచి నీటితో మంచి కడగండి. **విషనివారణ:** లక్షణానుసరించి చికిత్స చేయుట. మందు తాగినట్లైతే, కడుపు కాళీ చేయించుటకై యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అతడునకి సెలైన్ కాథర్టిక్ యాడ్సు మరియు అనుసరిస్తూ చికిత్స చేయుచుము. **నిల్వ:** 1. ఈ శిలీంధ్రనాశినగల ప్యాకేజీలను నిల్వ చేయుటకు ఒక ప్రత్యేకంబంబను గదిలోగాని, సరియారలోగాని కాని నిల్వ చేయుటకు న