Thiamethoxam 25% WG

क्लिक

थायामेथोक्साम २५ प्रतिशत डब्ल्यू जी

(बहुउपयोगी अंतप्रर्वाही कीटनाशक)

Broad Spectrum Insecticide

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

Factory :
Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2,
Dist. - Panchmahal - 389 350, Gujarat

फैक्टरी :
प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल२,
जि.- पंचमहाल ३८९ ३५०, गुजरात

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

CLICK® Thiamethoxam 25% WG (Broad spectrum Insecticide)

Thiamethoxam 25% WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended for its use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White Backed Plant Hopper (WBPH), Green Leaf Hopper (GLH), Thrips in rice; jassids, aphids and whiteflies in cotton; hoppers in mango; aphids in Wheat; aphids, Jassids and Whiteflies in Okra; aphids in Mustard; Whiteflies in Tomato; Whiteflies, Jassids in Brinjal; mosquito bug in Tea, aphids in Potato and Psylla in citrus. It contains 250g Thiamethoxam as an active in ingradient in a kg of the product (w/w).

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / Ha A.I (gm)	Formulation (gm)	Dilution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Rice	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White backed Plant Hopper (WBPH), Green leaf-hopper, Thrips (One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests such as Stem Borer, Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for the control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.)	25	100	500-750	14
Cotton	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21
	White flies	50	200	500-750	21
	(Apply first spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)				
Okra	Jassids, Aphids (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)	25	100	500-1000	5
Mango	Hoppers (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)	25	100	1000	30
Wheat	Aphids (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)	12.5	50	500	21
Mustard	Aphid Rapeseed (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)	12.5-25.0	50-100	500-1000	21
Tomato Foliar-application	Whiteflies (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)	50	200	500	5
Brinjal Foliar-application	Whiteflies, Jassids (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)	50	200	500	3
Tea	Mosquito bug, Helopeltis theivora (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity)	25	100	400-500	7
Potato Foliar-application	Aphids, (Myzus persicae) (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 1-2 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)	25	100	500	77
Soil-drench Citrus	Aphids (Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season) Psylla	50	200	400-500	77
		25	100	1000	20

उपयोग के लिए निर्देश : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. **P.P. Equipment :** Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated kpower sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. **Precaution:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Decrease spontaneous movement, tonic convulsion, ptosis may occur. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal of Used Container:** 1. Packages or surplus materials and washing from machines and containers should be dispose off in a safe manner as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation. **Storage Conditions:** 1. The package containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition : Thiamethoxam a.i. - 25.000% w/w, Dispersing Agent- sodium Lignosulphate - 5.000% w/w, Weting Agent Sodium Lauryl Sulphate - 3.750% w/w, Plasticiser - Butylated - polyvinyl pyrrolidine 1.250% w/w, Carrier Diatomaceous earth - 5.000% w/w, Binder corn starch - 60.000% w/w, **Total : 100.000% w/w.**

Tamil

क्लिक (थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी) (विस्तृत परिणाम करणारे किटनाशक)

थायामेथोक्सॅम २५% डब्ल्यू जी हे एक पोट आणि स्पर्श यांवर त्वरीत परिणाम करणारे विस्तृत प्रभावशाली आतून कार्य करणारे किटकनाशक आहे आणि भातावरील खोडकिडा, गादमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा, हिरवा तुडतुडा, फुलतिडे कपाशीवरील तुडतुडे, माव, पांढरी माशी, आंब्यावरील टोळ, गव्हावील माव, ओकरावरील माव, तुडतुडा आणि पांढऱ्या माशा, मीरचीवरील माव, टोमॅटोवरील पांढऱ्या माशा, वांग्यावरील पांढऱ्या माशा, तुडतुडे, चहावरील मॉस्क्युटो बग, बटाट्यावरील माव आणि लिंबावरील सायला यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी त्याची शिफारस करण्यात येत आहे. त्यामधील एक किलो उत्पादनामध्ये २५०ग्रॅ. (वा/वा) थायमेथोक्सॅम सक्रीय घटक म्हणून असते.

शिफारशी :

पीके	किटकाचे सर्वसामान्य नाव	मात्रा प्रती हेक्टरी स. घ. (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटची फवारणी ते पीक तयार होईपर्यंत प्रतीक्षाकाळ (दिवसांमध्ये)
तांदूळ	भातावरील खोडकिडा, गादमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा, हिरवा तुडतुडा, फुलतिडे (तांदळावरील किटकांच्या खोडकिडा गादमाशी अशासारख्या भातावरील किटकांच्या विकारांवर मुलस्थानीच्या टप्प्यावरील नियंत्रणासाठी २५-३० लागवडी नंतर एका फवारणी आणि हिरवा तुडतुडा, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा अशासारख्या भातावरील नंतर येणाऱ्या किटकांच्या नियंत्रणासाठी ५० ते ५५ लागवडी नंतर या दराने पानतुटीच्या काळात दुसरी फवारणी)	२५	१००	५००-७५०	१४
कापूस (कपाशी)	तुडतुडे, माव, पांढरीमाशी (किटक पहिल्यांदा दिसून आल्यावर २५-३० डिएस दराने पहिली फवारणी करा आणि किटकाच्या किंवा रोगाच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा)	२५	१००	५००-७५०	२१
	बोंडअळी	५०	२००	५००-७५०	२१
	(पहिली किडकाच दृश्यमान झाल्यावर पहिली फवारणी करा आणि गरजेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा)				
भेंडी	तुडतुडे, माव (किटक पहिल्यांदा दिसून आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि गरजेच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा)	२५	१००	५००	५
आंबा	टोळ (किटक पहिल्यांदा दिसून आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि गरजेच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा)	२५	१०००	१०००	३०
	माव (किटक पहिल्यांदा दिसून आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि गरजेच्या तीव्रतेच्या पातळीनुसार १५ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारण्या करा)	१२.५	५०	५००	२१
सरसो	माव	१२.५-२५	५०-१००	५००-१०००	२१
टमाटर	मका मक्खी	५०	२००	५००	५
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर।)				
बैंगन	मक्का मक्खी, तेला	५०	२००	५००	३
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद १०-१५ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर।)				
चाय	चाय का मच्छर कीट (हेलोपेल्टिस थिवोरा)	२५	१००	४००-५००	७
	(पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद १५-२१ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर।)				
आलू	माही (मैज़स पेर्सिक)	२५	१००	५००	७७
पत्ते पर छिड़काव	(पहली छिड़काव पहली बार कीटों के नजर आने पर और उसके बाद १५-२१ दिनों के अंतर से २-३ छिड़काव कीटों की मौजूदगी के आधार पर।)				
मिट्टी को बीमारी का तरीका	माही (कीटों के नजर आने से पहले, पौधों की जड़ की क्षेत्र को कीटनाशक से भीगो दें)	५०	२००	४००-५००	७७
नींबू	सिल्ला	२५	१००	१०००	२०

उपयोग के लिए निर्देश : कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को मापा कर पहले थोड़े से पानी में मिलाए। उसके बाद पानी निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल तैं तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पो फसल पर छिड़काव करें। **उपयोग में आने वाले यंत्र :** नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर, बैटरी से चलने वाला पावर स्प्रेयर और एस. पी. ई. - एच. टी. पी. पावर स्प्रेयर। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया :** १. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखे। २. मुंह, त्वचा और आंखो के संपर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूरी सुरक्षात्मक कपडे पहने। **विष के लक्षण** : शरीर में हीनतापन, झटके (मिर्गी), पूटोसिस हो सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बो का निपटारा :** १. पर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण बचाने कि लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पदार्थ मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटारा सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजो को बहार न छोडे देना चाहिए इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेजो/डिब्बो को तोड-मोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। **संग्रहण की शर्ते:** कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशेषकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबंद आलमारियों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिए। २. कीटनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारते बन्दकुड़े, सूखी, मोती भांति प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए ताकि वाष्प न हो सके।

रासायनिक संरचना : थायामेथोक्सॅम सा.त. - २५.०००% w/w, Dispersing Agent- सोडियम लिग्नोसल्फेट - ५.०००% w/w, Weting Agent सोडियम लॉरील सल्फेट - ३.७५०% w/w, Plasticiser - Butylated - polyvinyl pyrrolidine 1.२५०% w/w, Carrier डायाटोमेशियस अर्थ - ५.०००% w/w, Binder कॉर्न स्टार्च - ६०.०००% w/w, **एकूण: १००.०००% w/w**

Hindi

క్లిక్ (థయామెథోక్సామ్ 25% డబ్ల్యు జి) (విస్తృత పరిధిలో పనిచేసే పురుగుమందు)

థియామెథోక్సామ్ 25% డబ్ల్యుజి అనేది పొట్టపై మరియు స్పర్శ ద్వారా పురుగుల మీద పనిచేసే వ్యవస్థాగత పురుగుమందు మరియు దీని వినియోగం కొరకు సిఫారసు చేయబడింది. ఇది వరి కాండం తొలుచు పురుగు, గాల్‌మిడ్జ్, ఆకుముడత, బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్ (బిపిహెచ్), వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్ (డబ్ల్యుబిపిహెచ్), లీఫ్ రోల్ హాపర్ (జిఎల్‌హెచ్), థ్రిప్స్ (రాయండ తొలుచు పురుగు, గాల్‌మిడ్జ్ రాయి సరిలో ప్రారంభంలో ఒంటి పిచికారీ 25-30 డిఎఎస్ ఒక సిరికారి నుండు ప్రారంభంలో ఒంటి పిచికారీ మరియు ఆలస్యంగా వరి పురుగులను నియంత్రించడానికి 50 నుండి 55 డిఎఎస్ వద్దకు బూట్‌లో ఆకు దశలో పిచికారీ.

పత్తి: నల్లరసు, పేనుబంక, తెల్లదోమ - ఒక్క పిచికారీ 25 గ్రా/ఎకరానికి (25-30 క్రిటికల్ స్టేజ్‌లో పిచికారీ చేయండి) మరియు తెల్లదోమ కోసం 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి.

మామిడి: జాస్సిడ్స్ - ఒక్క పిచికారీ 25 గ్రా/ఎకరానికి (పిల్లల దశలో ఒక్క పిచికారీ మరియు తెల్లదోమ కోసం 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి.

వరి: రైస్ స్టెమ్ బోరర్, గాల్ మిడ్జ్, లీఫ్ రోలర్, బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్, గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్, థ్రిప్స్ - ఒక్క పిచికారీ 25 గ్రా/ఎకరానికి (పిల్లల దశలో ఒక్క పిచికారీ మరియు బూట్ లీఫ్ స్టేజ్ (@ 50 నుండి 55 డిఎఎ) వద్ద మరొకటి.

పత్తి: జాస్సిడ్స్, అఫిడ్స్, వైట్‌ఫ్లైస్ - ఒక్క పిచికారీ 25 గ్రా/ఎకరానికి (మొదటి పిచికారీ 25-30 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

బెండకాయ: జాస్సిడ్స్, వైట్‌ఫ్లైస్ (మొదటి పిచికారీ 25-30 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

మామిడి: హాప్పర్స్ (మొదటి పిచికారీ 25-30 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

గోధుమ: వైట్‌ఫ్లైస్ (మొదటి పిచికారీ 12.5 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

ఆవాలు: వైట్‌ఫ్లైస్ (మొదటి పిచికారీ 12.5-25.0 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

టమాటో: వైట్‌ఫ్లైస్ (మొదటి పిచికారీ 50 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 10-15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

వంగ: వైట్‌ఫ్లైస్, జాస్సిడ్స్ (మొదటి పిచికారీ 50 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 10-15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

టీ: దోమపిట్ట, హెలోపెల్టిస్ థెయివోరా (మొదటి పిచికారీ 25 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 2-3 పిచికారీలు 15-21 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

బంగాళాదుంప: నల్లరసు (మైజస్ పెర్సికేలు) (మొదటి పిచికారీ 25 డిఎఎస్ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం ప్రారంభంలో మరియు 1-2 పిచికారీలు 10-15 రోజుల వ్యవధి తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది)

సిట్రస్: పేనుబంక (రూట్ జోన్ ముందు సీజన్‌కు ముందు ఒక్కసారి మట్టి డ్రెంచ్), సిట్రస్ సైలిడ్ (ఒక్కసారి పంట సీజన్‌లో ఒక్కసారి)

మోతాదు సూచన: అవసరమైన పరిమాణంలో ఉత్పత్తిని కొలవండి మరియు కొద్ది మొత్తంలో నీటితో బాగా కలపండి. మిగిలిన నీటిని పేర్కొన్నట్లుగా పూర్తి కవరేజ్ కోసం పూర్తిగా కదిలించడం ద్వారా పంటకు తగిన స్ప్రేయర్‌తో వర్తించండి. **పి.పి. పరికరాలు:** నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ కిపవర్ స్ప్రేయర్ మరియు ASPEE-HTP పవర్ స్ప్రేయర్. **జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కాన్ని నివారించండి. 3. స్ప్రే పొగమంచును పీల్చడం నివారించండి. గాలి దిశలో పిచికారీ చేయండి. 4. కలుషితమైన దుస్తులను మరియు స్ప్రే చేసిన తర్వాత శరీరం యొక్క భాగాలను బాగా కడగండి. 5. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగాకు, త్రాగడం, తినడం మరియు నమలడం మానుకోండి. 6. పిచికారీ మరియు కలపడం సమయంలో పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. **విషం యొక్క లక్షణాలు:** తగ్గిన స్పృహ, టానిక్ మూర్ఛలు, పటోసిస్ సంభవించవచ్చు. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. మింగినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగాన్ని గుచ్చడం ద్వారా వాంతిని ప్రేరేపించండి. క్లియర్ అయ్యే వరకు పునరావృతం చేయండి. అపస్మారక స్థితిలో వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. బట్టలు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలను తీసివేసి, కలుషితమైన చర్మాన్ని పుష్కలంగా సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు సెలైన్/క్లీన్ వాటర్‌తో పుష్కలంగా ఫ్లష్ చేయండి. 4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి తరలించండి. **విరుగుడు:** ఏదీ తెలియదు. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స. **ఉపయోగించిన కంటైనర్ యొక్క పారవేయడం:** 1. పర్యావరణ కాలుష్యం మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి సురక్షితమైన పద్ధతిలో కంటైనర్లు మరియు కంటైనర్ల నుండి వాషింగ్ మరియు మిగిలిన పదార్థాలను పారవేయాలి. 2. ఉపయోగించిన కంటైనర్లు మళ్లీ వాడకుండా నిరోధించడానికి బయట వదిలివేయకూడదు. 3. కంటైనర్లు విరిగిపోయి నివాసానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. **నిల్వ పరిస్థితులు:** 1. పురుగుమందు కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర పదార్థాలు లేదా ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ప్రాంగణాల నుండి వేరు గదులు లేదా ప్రాంగణాలలో అసలు కంటైనర్లలో నిల్వ చేయాలి లేదా ఆహార పదార్థాలను ప్రత్యేక అల్మారాలలో లాక్ మరియు కీతో నిల్వ చేయాలి. 2. పురుగుమందులను నిల్వ చేసే గదులు లేదా ప్రాంగణాలు పొడి, బాగా వెలుతురు మరియు హవాదారులుగా ఉండాలి మరియు ఆవిరి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి. **రసాయన కూర్పు:** థియామెథోక్సామ్ సా.త. - 25.000% w/w, చెదరగొట్టే ఏజెంట్ - సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్ - 5.000% w/w, తడి ఏజెంట్ సోడియం లౌరిల్ సల్ఫేట్ - 3.750% w/w, ప్లాస్టిసైజర్ - బ్యూటిలేటెడ్ - పాలివినైల్ పైరోలిడోన్ 1.250% w/w, వాహక డయాటోమాసియస్ భూమి - 5.000% w/w, బైండర్ మొక్కజొన్న పిండి - 60.000% w/w, **మొత్తం: 100.000% w/w.**

Telugu

ക്ലിക്ക് (തയാമെതോക്സാം 25% WG) (വിസ്തൃതിയുള്ള കീടനാശിനി)

തയാമെതോക്സാം 25% WG ഉയരത്തിലുള്ളതും സ്വീകരണം വഴിയും അതിവേഗം പ്രവർത്തനമുള്ളതും വ്യവസ്ഥാപരമായ കീടനാശിനിയാണ് നെൽകൃഷിയെ ബാധിക്കുന്ന തണ്ടു തുരപ്പൻ, ഗാളീച്ച, ഇലചുരുട്ടി, തവിട്ടുനിറമുള്ള ചെടിച്ചാടി (BPH), വെള്ളത്താട പുറമുള്ള ചെടിച്ചാടി, (WBPH), പച്ച ഇലച്ചാടി (GLH), ത്രിപ്സ്; പരുത്തി കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന ജാസിഡിസ്, ഏഫിഡിസ്, മാവ് കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന ചാഫർകിൾ, ഗോതമ്പ് കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഏഫിഡിസ്; തക്കാളിയെ ബാധിക്കുന്ന വൈറ്റ്ഫ്ലൈ; വഴുതനയെ ബാധിക്കുന്ന ഏഫിഡിസ്, ജാസിഡിസ്, വെള്ളീച്ച; കടുക് കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഏഫിഡിസ്; തേയിലച്ചെടി കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന വെള്ളീച്ച; വഴുതന കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന വെള്ളീച്ച, ജാസിഡിസ്; തെയില കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന മസ്കിറ്റോ ബഗ്സ്; ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഏഫിഡിസ്; സിട്രസ് കുമിഷയെ ബാധിക്കുന്ന സില്ല തുരപ്പൻ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു കിലോ തൂക്കത്തിൽ നമ്മിഗ ഘടകമായി 250 ഗ്രാം തയാമെതോക്സാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (w/w).

ശുപാർശകൾ:

വിളകൾ	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ് ഹെക്ടറിന് സ.ഘ. (ഗ്രാം)	സംയോഗം (ഏകദേശം)	നേർപ്പിക്കൽ വെള്ളം (ലി)	വിളവെടുപ്പിനും അവസാന തളിക്കുമിടയ്ക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ദൈർഘ്യമുള്ള കാലം (ദിവസം)
നെല്ല്	തണ്ടു തുരപ്പൻ, ഗാളീച്ച, ഇലചുരുട്ടി, തവിട്ട് ചെടിച്ചാടി (BPH), വെള്ളത്താട പുറമുള്ള ചെടിച്ചാടി, (WBPH), പച്ച ഇലച്ചാടി, ത്രിപ്സ് (വിളയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നെൽ കുഞ്ഞിഷയെ ബാധിക്കുന്ന തണ്ടു തുരപ്പൻ, ഗാളീച്ച, തുടങ്ങിയ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാമിന് ഒരു തളി 25-30 ഉത്തര യിൽ മുതലു ആരംഭവും, കതിരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ (@ 50 - 55 DAT) വിളയെ വൈകി ബാധിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാമിന് രണ്ടാമത്തെ തളി GLH, BPH, WBPH തുടങ്ങിയ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാമിന് രണ്ടാമത്തെ തളി)	25	100	500-750	14
പരുത്തി	ജാസിഡിസ്, എഫിഡിസ്	25	100	500-750	21
	വെള്ളീച്ച	50	200	500-750	21
	(25-30 ഉത്തര തലമുള്ളതിൽ കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 2-3 തളികൾ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക)				
വെണ്ട	ജാസിഡിസ്, എഫിഡിസ് (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് 1-2 തളികൾ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക)	25	100	500-1000	5
മാവ്	ചാഫർകിൾ (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 1-2 തളികൾ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക).	25	100	1000	30
ഗോതമ്പ്	ഏഫിഡിസ് (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 1-2 തളികൾ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക).	12.5	50	500	21
കടുക്	ഏഫിഡിസ് വൈറ്റ്ഫ്ലൈ (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 1-2 തളികൾ 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക).	12.5-25.0	50-100	500-750	21
തക്കാളി (ഇലപ്രതി പ്രതി തളിക്കുക)	വെള്ളീച്ച (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 2-3 തളികൾ 10-15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക)	50	200	500	5
വഴുതന (ഇലപ്രതി പ്രതി തളിക്കുക)	വെള്ളീച്ച , ജാസിഡിസ് (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 2-3 തളികൾ 10-15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക)	50	200	500	3
തേയില	ജാസിഡിസ് (ഡൈസോട്ട പെർനിഷേ) (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീടബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 2-3 തളികൾ 15-21 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക).	25	100	400-500	7
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	ഏഫിഡിസ് (മൈസസ് പെർസിക്കേ) (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യ തളി നടത്തുക. തുടർന്ന് കീട ബാധയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് 1-2 തളികൾ 10-15 ദിവസം ഇടവിട്ട് ആവർത്തിക്കുക)	25	100	500	77
മണ്ണ് കുതിർക്കാൻ	ഏഫിഡിസ് (കീടങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നിർക്കാൻ മുമ്പേ വേരുകൾ പാലയുന്ന സമയങ്ങളിൽ മണ്ണ് കുതിർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക).	50	200