Thiamethoxam 25% WG

क्लिक

क्लिक

ક્લિક

ವಲಿಕ

क्लिक

ക്ലിക്ക്

ક્લીક્ક

Broad Spectrum Insecticide

क्लिक

थायामेथोक्साम २५ प्रतिशत डब्ल्यू जी

(बहुउपयोगी कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
रजि. ऑफ़िस: कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५९

Factory :
Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2,
Dist. - Panchmahal - 389 350, Gujarat

फैक्टरी :
प्लॉट नं. १०४–१–ए, जीआयडीसी हालोल–२,
जि.– पंचमहाल – ३८९ ३५०, गुजरात

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Manufactured & Marketed by:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

12.22.(PR)

CLICK® Thiamethoxam 25% WG (Broad spectrum Insecticide)

Thiamethoxam 25% WG is broad spectrum systemic insecticide having quick stomach and contact activity and is recommended for its use to control Stem Borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), white backed Plant Hopper (WBPH), Green Leaf Hopper (GLH), Thrips in rice; jassids, aphids and whiteflies in cotton; hoppers in mango; aphids in Wheat; aphids, Jassids and Whiteflies in Okra; aphids in Mustard; Whiteflies in Tomato; Whiteflies, Jassids in Brinjal; mosquito bug in Tea, aphids in Potato and Psylla in citrus. It contains 250g Thiamethoxam as an active in ingredient in a kg of the product (w/w).

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / Ha A.I (gm)	Formulation (gm)	Dilution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Rice	Stem borer, Gall Midge, Leaf Folder, Brown Plant Hopper (BPH), White backed Plant Hopper (WBPH), Green leaf-hopper, Thrips (One spray at 25-30 DAT in the early stage of crop for control of early rice pests; such as Stem Borer, Gall Midge and the other spray at the booting leaf stage (@ 50 to 55 DAT) for the control of late rice pests such as GLH, BPH, WBPH etc.)	25	100	500-750	14
Cotton	Jassids, Aphids	25	100	500-750	21
	White flies (Apply first spray at 25-30 DAS or at the time of first pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)	50	200	500-750	21
Okra	Jassids, Aphids (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the pest intensity)	25	100	500-1000	5
Mango	Hoppers (Apply first spray during initial pest appearance and repeat one or two sprays at 15 days interval depending on the level of pest intensity)	25	100	1000	30
Tomato Foliar-application	Whiteflies (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)	50	200	500	5
Brinjal Foliar-application	Whiteflies, Jassids (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)	50	200	500	3
Tea	Mosquito bug, Helopeltis theivora (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 2-3 sprays at 15-21 days interval depending on the level of pest intensity)	25	100	400-500	7
Potato Foliar-application	Aphids, (Myzus persicae) (Apply first spray during initial pest appearance and repeat 1-2 sprays at 10-15 days interval depending on the level of pest intensity)	25	100	500	77
Soil-drench	Aphids (Apply root zone before appearance of pest as soil drench, once during the crop season)	50	200	400-500	77
Citrus	Psylla	25	100	1000	20

Direction of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. **P.P. Equipment :** Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer, Battery operated kpower sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. **Precaution:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning: Decrease spontaneous movement, tonic convulsion, ptosis may occur. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal of Used Container:** 1. Packages or surplus materials and washing from machines and containers should be dispose off in a safe manner as to prevent environment and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and burried away from habitation. **Storage Conditions:** 1. The package containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition : Thiamethoxam a.i. - 25.000% w/w, Dispersing Agent-sodium Lignosulphate - 5.000% w/w, Wetting Agent Sodium Lauryl Sulphate - 3.750% w/w, Plasticiser - Butylated - polyvinyl pyrrolidine 1.250% w/w, Carrier Diatomaceous earth - 5.000% w/w, Binder corn starch - 60.000% w/w, **Total : 100.000% w/w.**

Tamil

క్లిక్ థియామెథోక్సామ్ 25% డబ్ల్యు జి (దీర్ఘకాల జర్మినుతో పోరాడే పురుగుమందు)

థియామెథోక్సామ్ 25% డబ్ల్యు జి దీర్ఘకాల జర్మినుతో పోరాడే పురుగుమందు. ఇది కడుపులో విషం మరియు కాంటాక్ట్ చర్యను కలిగి ఉంటుంది మరియు వరి కాండం తొలుచు పురుగు, గాల్ మిడ్జ్, ఆకుముడత పురుగు, తెల్ల వెన్నుపోటు పురుగు (బిపిహెచ్), తెల్ల వెన్నుపోటు పురుగు (డబ్ల్యుబిపిహెచ్), ఎర్ర పేనుబంక (జిఎల్హెచ్), థ్రిప్స్ నియంత్రణకు సిఫారసు చేయబడింది. పత్తిలో జాస్సిడ్స్, అఫిడ్స్ మరియు వైట్‌ఫ్లైస్; మామిడిలో హాప్పర్స్; గోధుమలో అఫిడ్స్; ఓక్రాలో జాస్సిడ్స్, అఫిడ్స్ మరియు వైట్‌ఫ్లైస్; ఆవాలలో అఫిడ్స్; టమోటాలో వైట్‌ఫ్లైస్; వంకాయలో వైట్‌ఫ్లైస్, జాస్సిడ్స్; టీలో దోమ బగ్; బంగాళదుంపలో అఫిడ్స్ మరియు సిట్రస్‌లో సైల్లా. ఇందులో థియామెథోక్సామ్ 250 గ్రాం క్రియాశీల పదార్థంగా ఉంటుంది (w/w).

సిఫార్సులు:

పంటలు	తెగుళ్ల పేర్లు	మోతాదు/హెక్టారు ఎ.ఐ. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (గ్రా.)	నీటిలో కలపాల్సిన మోతాదు (లీ.)	ఆఖరి స్ప్రే మరియు కోత మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు)
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు, గాల్‌మిడ్జ్, ఆకుముడత, బ్రౌన్ プ్లాంట్ హాప్పర్ (బిపిహెచ్), వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాప్పర్ (డబ్ల్యుబిపిహెచ్), గ్రీన్ లీఫ్ హాప్పర్ (జిఎల్హెచ్), థ్రిప్స్ (ప్రారంభ తొలుచు పురుగు, గాల్‌మిడ్జ్ లాంటి మొదటి దశలో ప్రారంభ దశలో 25-30 డిఎఎ వద్ద ఒక స్ప్రే మరియు తరువాత పిలకలు వేసే దశలో (@ 50 - 55 డిఎటి) చివరి దశలో తెగుళ్ల నియంత్రణ కొరకు జిఎల్హెచ్, బిపిహెచ్, డబ్ల్యుబిపిహెచ్ మొదలైనవి)	25	1000	500-750	14
పత్తి	జాస్సిడ్స్, అఫిడ్స్	25	100	500-750	21
	వైట్‌ఫ్లైస్ (మొదటి స్ప్రే 25-30 డిఎఎ లేదా మొదటి తెగుళ్ల సంభవం వద్ద పునరావృతం 2-3 స్ప్రేలు తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి 15 రోజుల వ్యవధి)	50	200	500-750	21
బెండకాయ	జాస్సిడ్స్, అఫిడ్స్ (ప్రారంభ తెగుళ్ల సంభవం వద్ద మొదటి స్ప్రే మరియు తరువాత రెండు స్ప్రేలు తెగుళ్ల తీవ్రతపై ఆధారపడి 15 రోజుల వ్యవధి)	25	100	500-1000	5
మామిడి	హాప్పర్స్ (ప్రారంభ తెగుళ్ల సంభవం వద్ద మొదటి స్ప్రే మరియు తరువాత రెండు స్ప్రేలు తెగుళ్ల స్థాయిపై ఆధారపడి 15 రోజుల వ్యవధి)	25	100	1000	30
టమాట	వైట్‌ఫ్లైస్ (ప్రారంభ తెగుళ్ల సంభవం వద్ద మొదటి స్ప్రే మరియు తరువాత 2-3 స్ప్రేలు తెగుళ్ల స్థాయిపై ఆధారపడి 10-15 రోజుల వ్యవధి)	50	200	500	5
వంకాయ	వైట్‌ఫ్లైస్, జాస్సిడ్స్ (ప్రారంభ తెగుళ్ల సంభవం వద్ద మొదటి స్ప్రే మరియు తరువాత 2-3 స్ప్రేలు తెగుళ్ల స్థాయిపై ఆధారపడి 10-15 రోజుల వ్యవధి)	50	200	500	3
టీ	దోమ బగ్, హెలోపెల్టిస్ థెయివోరా (ప్రారంభ తెగుళ్ల సంభవం వద్ద మొదటి స్ప్రే మరియు తరువాత 2-3 స్ప్రేలు తెగుళ్ల స్థాయిపై ఆధారపడి 15-21 రోజుల వ్యవధి)	25	100	400-500	7
బంగాళదుంప	అఫిడ్స్ (మైజస్ పెర్సికే) (ప్రారంభ తెగుళ్ల సంభవం వద్ద మొదటి స్ప్రే మరియు తరువాత 1-2 స్ప్రేలు తెగుళ్ల స్థాయిపై ఆధారపడి 10-15 రోజుల వ్యవధి)	25	100	500	77
	అఫిడ్స్ (ఎగువ మూలానికి ముందు తెగుళ్ల సంభవం వద్ద నేల డ్రెంచ్‌గా ఒకసారి)	50	200	400-500	77
సిట్రస్	సైల్లా	25	100	1000	20

వినియోగ సూచనలు: అవసరమైన పరిమాణంలో కొలవండి మరియు కొంచెం నీటితో కలపండి. మిగిలిన నీటిని పేర్కొన్నట్లుగా పూర్తి కవరేజ్ కోసం పంట మొత్తం సరిగ్గా కలపండి. **పి.పి. పరికరాలు:** నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, బ్యాటరీతో నడిచే kpower స్ప్రేయర్ మరియు ASPEE-HTP పవర్ స్ప్రేయర్. **జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటి, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కం నివారించండి. 3. స్ప్రే మిస్ట్ ఊపిరి పీల్చుకోవడం నివారించండి. గాలి దిశలో స్ప్రే చేయండి. 4. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా కడగాలి. 5. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగాకు తాగడం, త్రాగడం, ఏదైనా తినడం మరియు నమలడం మానుకోండి. 6. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించండి.

విషం యొక్క లక్షణాలు: ఇష్టపడని కదలిక తగ్గుదల, టానిక్ మూర్ఛలు, పటోసిస్ సంభవించవచ్చు. **ప్రాథమిక చికిత్స:** 1. మీరు మింగినట్లయితే, గొంతు వెనుక భాగాన్ని చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతిని ప్రేరేపించండి. వాంతి స్పష్టమయ్యే వరకు పునరావృతం చేయండి. రోగి స్పృహలో లేకపోతే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, దుస్తులను తొలగించి, కలుషితమైన చర్మాన్ని పుష్కలంగా సబ్బు మరియు నీటితో కడగండి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు తగిన పరిమాణంలో ఉప్పు/శుభ్రమైన నీటితో ఫ్లష్ చేయండి. 4. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి తరలించండి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలకు చికిత్స చేయండి. **వినియోగించిన కంటైనర్ నిర్మూలన:** 1. ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు మరియు యంత్రాల నుండి కడగడం పర్యావరణ కాలుష్యం మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించే విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయబడాలి. 2. వినియోగించిన ప్యాకేజీలు వాటి పునర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి బయట వదిలివేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు విరిగిపోయి నివాసానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. **నిల్వ పరిస్థితులు:** 1. క్రిమిసంహారిణిని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీ అసలు కంటైనర్లలో గదులు లేదా ప్రాంగణాలలో నిల్వ చేయాలి లేదా ఇతర వస్తువులు ముఖ్యంగా ఆహార వస్తువులు నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాల నుండి వేరుగా లాక్ మరియు కీతో అల్మారాలు. 2. క్రిమిసంహారిణిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు నిర్మించబడాలి, పొడి, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు ఆవిరి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి తగినంత పరిమాణం.

రసాయన కూర్పు: థియామెథోక్సామ్ a.i. - 25.000% w/w, డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్-సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్ - 5.000% w/w, తడి ఏజెంట్-లౌరిల్ సోడియం సల్ఫేట్ - 3.750% w/w, ప్లాస్టిసైజర్-బ్యూటిలేటెడ్-పాలివినైల్ పైరోలిడోన్ - 1.250% w/w, క్యారియర్ డయాటోమాసియస్ భూమి - 5.000% w/w, బైండర్ మొక్కజొన్న పిండి - 60.000% w/w, **మొత్తం: 100.000 % w/w.**

Telugu

क्लिक थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी (विस्तृत परिणाम करणारे किटनाशक)

थायामेथोक्साम २५% डब्ल्यू जी एक चांगला आणि स्पर्श यासह त्वरीत परिणाम करणारे विस्तृत स्पेक्ट्रमचे प्रणालीचे आहे आणि कार्य करणारे किटकनाशक आहे आणि भात पिकावरील खोडकीड, गाललमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा, हिरवा तुडतुडा, कुरतोडे कथापतिंग्ज तुडतुडे, मावा, पांढरी माशी; कापसावरील जास्सिड्स, मावा, पांढरी माशी; आंब्यावरील हॉपर्स, गव्हावरील मावा; तुडतुडे आणि पांढऱ्या माशा; भेंडीवरील मावा, टोमॅटोवरील पांढऱ्या माशा, वांग्यावरील पांढऱ्या माशा; तुडतुडे, चहावरील गॉस्पुट्टो बग आणि लिंबाच्या साइलावर पांढऱ्या माशा. निरोगी थायामेथोक्सामचे २५० ग्रॅम सक्रिय घटक असतात. (w/w).

शिफारशी:

पीके	किटकाचे सर्वसामान्य नाव	मात्रा प्रती हेक्टरी स. घ. (ग्रॅम)	स्वरूपण (ग्रॅम)	पाण्यामधे प्रमाण (लिटर)	संपादणी फवारणी ते पीक तयार होईपर्यंतचा प्रतीक्षाकाळ (दिवसांमध्ये)
तांदूळ	खोडकीड, गाललमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा, हिरवा तुडतुडा, कुरतोडे कथापतिंग्ज तुडतुडे (लवकर किटकांच्या खोडकिडा गाललमाशी अशासारख्या भातावरील किटकांच्या विरूद्धच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरील नियंत्रणासाठी २५-३० लागवडी नंतर दाने एक फवारणी आणि हिरवा तुडतुडा, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा अशासारख्या भातावरील नंतर येणाऱ्या किटकांच्या नियंत्रणासाठी ५० ते ५५ दिवसांनी नंतर या दाने पुनमुटीच्या काळात दुसरी फवारणी)	२५	१००	१००-१५०	२१
कापूस (कपाशी)	तिहेरू अळ्या २५-३० दिवस दाने पोहोचे फवारणी करा आणि किटकाच्या विरुध्द संरक्षण तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने	५०	२००	१००-१५०	२१
भेंडी	तुडतुडे, मावा, पांढरीमाशी (किटकाच्या तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	२५	१००	१००-१०००	५
आंबा	तुडतुडे, मावा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	२५	१००	१००-१०००	३०
गहू	मावा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	१२.५	५०	५००	२१
मोहरी	मावा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	१२.५	५०	५००	२१
टोमॅटोवर	पांढरी माशी (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १०-१४ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा)	१२.५-२५	५०-१००	५००-१०००	२१
वांग्यावर पांढऱ्या माशा/तुडतुडे (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १०-१४ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा)	५०	२००	५००	५
चहावर गॉस्पुट्टो बग, हेलोपेल्टिस थेयीवोरा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १५-२१ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा)	२५	१००	४००-५००	७
बटाट्यावर पांढऱ्या माशा (गावठाणातील) (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करा)	२५	१००	५००	७७
वनीय मावा (वनीय निजीवीची वाढ असताना तीव्र कुरतोड येण्यापूर्वीच पुनरावृत्ती पतांतील आणि पानांतील किंवा शाखांच्या टोकावर)	५०	२००	४००-५००	७७
लिंबू सिल्ला	२५	१००	१०००	२०

उपयोग व नियंत्रित प्रमाण: कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को मापन कर पहले थोडे से पानी में मिलाए। जमके बाद पानी निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल ले तथा किसी उपयुक्त दाब की मदद से पूरी फसल पर छिडकाव करें। **उपयोग में आने वाले यंत्र :** नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर, बैटरी से चलने वाला पावर स्प्रेयर और एस. पी. ई. - एच. टी. पी. पावर स्प्रेयर। **प्रयोगकर्ता को के लिये सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली कंटेनर और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वायप को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने। **विष के लक्षण :** शरीर में हीनतान, झटके (मिर्गी), पूतलिका से सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि बाँध बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को कोपी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो जमके कपडी मात्रा में सिंचाइ/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो तो शुद्ध हवा में ले जायें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बो का निपटान :** १. पर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण बचाने कि लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पानी मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटाना सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों/ पैकेजों को बाहर न छोडे तेरा चाहिए इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेजों/डिब्बों को तोडमोड़कर आबादी से दूर कोनि में गाड देना चाहिए। **संग्रहण की शर्तें :** कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशिष्टकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबन्द अलमारीयों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिए। २. कीटनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें बलकुल, सूखी, भरी मात्रा प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त मात्रा होना चाहिए ताकि वाष्प न हो सके।

रासायनिक संरचना :
थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व : २५.०००% भार/भार, छितरानेवाले तत्व सोडियम लिग्नोसल्फोनेट- ५.०००% भार/भार, गीले होने वाले तत्व सोडियम लारील सल्फेट - ३.७५०% भार/भार, प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पैनिवाल्व पायरोलिडोन- १.२५०% भार/भार, सहायक डायअॅटोमैशियस अर्थ : ५.०००% भार/भार, बाईन्डर कॉर्न स्टार्च : ६०.०००% भार/भार। **योग: १००.००० % भार/भार।**

Hindi

क्लिक थायमेथोक्सॉम २५% डब्ल्यू जी (विस्तृत परिणाम करणारे किटनाळक)

थायमेथोक्सॉम २५% डब्ल्यू जी हे एक चांगले आणि स्पर्श यासह त्वरीत परिणाम करणारे विस्तृत स्पेक्ट्रमचे प्रणालीचे आहे आणि कार्य करणारे किटकनाशक आहे आणि भात पिकावरील खोडकीड, गाललमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा, हिरवा तुडतुडा, कुरतोडे कथापतिंग्ज तुडतुडे, मावा, पांढरी माशी; कापसावरील जास्सिड्स, मावा, पांढरी माशी; आंब्यावरील हॉपर्स, गव्हावरील मावा; तुडतुडे आणि पांढऱ्या माशा; भेंडीवरील मावा, टोमॅटोवरील पांढऱ्या माशा, वांग्यावरील पांढऱ्या माशा; तुडतुडे, चहावरील गॉस्पुट्टो बग आणि लिंबाच्या साइलावर पांढऱ्या माशा. निरोगी थायामेथोक्सॉमचे २५० ग्रॅम सक्रिय घटक असतात. (w/w).

शिफारशी:

पीके	किटकाचे सर्वसामान्य नाव	मात्रा प्रती हेक्टरी स. घ. (ग्रॅम)	स्वरूपण (ग्रॅम)	पाण्यामधे प्रमाण (लिटर)	संपादणी फवारणी ते पीक तयार होईपर्यंतचा प्रतीक्षाकाळ (दिवसांमध्ये)
भात	खोडकीड, गाललमाशी, पाने गुंडाळणारी अळी, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा, हिरवा तुडतुडा, कुरतोडे कथापतिंग्ज तुडतुडे (लवकर किटकांच्या खोडकिडा गाललमाशी अशासारख्या भातावरील किटकांच्या विरूद्धच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावरील नियंत्रणासाठी २५-३० लागवडी नंतर दाने एक फवारणी आणि हिरवा तुडतुडा, तपकिरी तुडतुडा, पांढऱ्या पाठीचा तुडतुडा अशासारख्या भातावरील नंतर येणाऱ्या किटकांच्या नियंत्रणासाठी ५० ते ५५ दिवसांनी नंतर या दाने पुनमुटीच्या काळात दुसरी फवारणी)	२५	१००	१००-१५०	२१
कापूस (कपाशी)	तिहेरू अळ्या २५-३० दिवस दाने पोहोचे फवारणी करा आणि किटकाच्या विरुध्द संरक्षण तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने	५०	२००	१००-१५०	२१
भेंडी	तुडतुडे, मावा, पांढरीमाशी (किटकाच्या तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	२५	१००	१००-१०००	५
आंबा	तुडतुडे, मावा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	२५	१००	१००-१०००	३०
गहू	मावा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	१२.५	५०	५००	२१
कडक्र	मावा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १४ दिवसांच्या अंतराने एक किंवा दोन फवारणी करा)	१२.५	५०	५००	२१
कलिंगड/ दुधाचे ढोबळी मिरची	पांढरी माशी (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १०-१४ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा)	१२.५-२५	५०-१००	५००-१०००	२१
वांग्यावर पांढऱ्या माशा/तुडतुडे (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १०-१४ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा)	५०	२००	५००	५
चहावर	गॉस्पुट्टो बग, हेलोपेल्टिस थेयीवोरा (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १५-२१ दिवसांच्या अंतराने २-३ फवारण्या करा)	२५	१००	४००-५००	७
बटाट्यावर पांढऱ्या माशा (गावठाणातील) (किटक परिस्थितीत तिहेरू आल्यावर पहिली फवारणी करा आणि संपादणी तीव्रतेनुसार १०-१५ दिवसांच्या अंतराने १-२ फवारण्या करा)	२५	१००	५००	७७
वनीय मावा (वनीय निजीवीची वाढ असताना तीव्र कुरतोड येण्यापूर्वीच पुनरावृत्ती पतांतील आणि पानांतील किंवा शाखांच्या टोकावर)	५०	२००	४००-५००	७७
लिंबू	सिल्ला	२५	१००	१०००	२०

उपयोग करावे प्रमाण : कीटनाशक की आवश्यक मात्रा को मापन कर पहले थोडे से पानी में मिलाए। जमके बाद पानी निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल ले तथा किसी उपयुक्त दाब की मदद से पूरी फसल पर छिडकाव करें। **उपयोग में आने वाले यंत्र :** नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर, बैटरी से चलने वाला पावर स्प्रेयर और एस. पी. ई. - एच. टी. पी. पावर स्प्रेयर। **प्रयोगकर्ता को के लिये सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली कंटेनर और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वायप को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने। **विष के लक्षण :** शरीर में हीनतान, झटके (मिर्गी), पूतलिका से सकते है। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि बाँध बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और दूषित त्वचा को कोपी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो जमके कपडी मात्रा में सिंचाइ/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो तो शुद्ध हवा में ले जायें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बो का निपटान :** १. पर्यावरण तथा पानी का प्रदूषण बचाने कि लिए डिब्बे, बचा हुआ घोल/पानी मशीनों की धोवन और खाली डिब्बों का निपटाना सुरक्षित स्थान पर करें। २. उपयोग किए गए डिब्बों/ पैकेजों को बाहर न छोडे तेरा चाहिए इस प्रकार उनका दुबारा उपयोग बचाया जा सकता है। ३. पैकेजों/डिब्बों को तोडमोड़कर आबादी से दूर कोनि में गाड देना चाहिए। **संग्रहण की शर्तें :** कीटनाशक के डिब्बों को अन्य सामग्री विशिष्टकर खाने के सामान के संग्रहण के लिए उपयोग किए जा रहे कमरों या इमारतों से दूर अलग कमरों या इमारतों में अथवा अलग से तालाबन्द अलमारीयों में कीटनाशक की प्रकृति और मात्रा के आधार पर रखना चाहिए। २. कीटनाशकों के संग्रहण हेतु उपयोग किये जाने वाले कमरे या इमारतें बलकुल, सूखी, भरी मात्रा प्रकाशित तथा हवादार होनी चाहिए तथा उनमें पर्याप्त मात्रा होना चाहिए ताकि वाष्प न हो सके।

रासायनिक संरचना :
थायामेथोक्साम सक्रिय तत्व : २५.०००% भार/भार, छितरानेवाले तत्व सोडियम लिग्नोसल्फोनेट- ५.०००% भार/भार, गीले होने वाले तत्व सोडियम लारील सल्फेट - ३.७५०% भार/भार, प्लास्टिसायजर ब्यूटीलेटेड पैनिवाल्व पायरोलिडोन- १.२५०% भार/भार, सहायक डायअॅटोमैशियस अर्थ : ५.०००% भार/भार, बाईन्डर कॉर्न स्टार्च : ६०.०००% भार/भार। **योग: १००.००० % भार/भार।**

Marathi