Decor®

Difenoconazole 4.8% + Mancozeb 64% WP

(Fungicide) For Agricultural use.

Used for control target pest : Grapes-Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew, Onion-Purple blotch, Downy mildew.

Chemical Compostion:

Difenoconazole a.i.	4.80% w/w
Mancozeb a.i	64.00% w/w
Kraft lignin polymer	6.00% w/w
Sodium dioctyl sulfosuccinate	2.00 w/w
Dextrose	2.00% w/w
Silica	Q.S% w/w.
Total	**100.00% w/w**

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of the Pest	Dosage / HA		Dilution in water (Liter)	Waiting Period from last spray to harvest (in Days)
		AI (gm)	Formulation (gm)		
Onion	Purple blotch, Downy mildew	84+1120-96+1280 gm per ha	1750-2000 gm per ha	500	20
Grapes	Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew	0.012+0.16-0.014+0.19 percent or 0.12+1.6-0.14+1.9 gm per Lit	0.25-0.30 percent or 2.5-3.0 gm per Lit	500-750 Depending on crop canopy	10

Directions for Use: Take the measured quantity of fungicide as per recommendation and add to it small quantity of water. Stir thoroughly using a wooden stick and then add the remaining quantity of water stir well to form final spray solution. **Weather conditions(in general):** Do not apply fungicide just before rain and avoid spray during windy days. **Soil and water (where ever applicable):** There should be sufficient moisture in the soil while spraying of fungicide. Clean water to be used for spray. **Crop stage for application - days after sowing:** Vegetative and Productive. **Application Techniques :** Application to be done during morning or evening time. It should be applied in crops, crop stage and with dosage as mentioned in recommendation. Maintain the frequency of application, pre-harvest interval and re-entry period as specify in recommendation.The mixing of fungicide to be done as mentioned in direction of uses. **Equipment type:** Application should be done by using high volume spray fitted with low drift nozzle as per the recommended dose viz. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. **Nozzle type:** High volume spray fitted with low drift hollow cone nozzle. **Dosage:** Grapes 2.50-3.00 g/L (0.25-0.30%), Onion 1750-2000 g/ha. **Instruction for mixing:- Re-entry period**: 24 hours. **Pre harvest interval (PHI)** : Grapes 10 days, Onion 20 days. **Manner and Time of application**: Application should be done on appearance of disease symptoms on the crop by using high volume spray fitted with low drift hollow cone nozzle viz. Knapsack sprayer, foot sprayer etc. as per recommended dose. **Application timings**: Application to be done during morning or evening time. **Frequency including maximum number of sprays:** 1-3 sprays depending on disease intensity. **Stages during which pesticides should not be applied on any crop / Stages during**: Not applicable. **Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests / Precautions**: The product is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies aquaculture or pisciculture area. **Symptoms of poisoning**: Poisoning may cause symptoms of sedation, dyspnea, hunched posture, itching, reduces nasal congestion, tightness in chest, palpitation and hypotension, ingestion may produce nausea, vomiting and diarrhea. Hypothermia and ataxia are characteristic. **First aid: 1.If ingested**: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **2.If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing Consult physician. **3.In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4.In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation redness or photophobia persist then consult eye specialist. **Antidote Statement:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Safety Precautions: 1**. Keep away from food stuffs empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 5. Wear protective clothing while mixing and spraying. 6. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. **Instructions for storage:** 1. The packages containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing foodstuff and animals feed. It shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises shall be well built, well lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor. The conditions of the store should be dry and cool. **Cautionary Statement :** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. It is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. 4. Dangerous to re-use empty container. **Disposal of used containers, Washing from equipment and surplus material: Disposal of used containers:** 1. It shall be the duty of manufacturer, formulators of fungicides and operators to dispose off the washings and surplus materials in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall be left outside to prevent their re-use. 3. The package shall be broken and buried away from habitation.

Caution : Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/ Leaflet

English

डेकॉर

डायफेनकोनेझोल ४.८% + मॅन्कोझेब ६४% डब्ल्यू.पी.

(फफूंदीनाशक) कृषि उपयोग के लिए ।

लक्ष्य कीट नियंत्रण उपयोग के लिए : अंगूर–रुक्ष रोग, मृदुरोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता, प्याज–पत्तियों के अंगमारी रोग और मृदुरोमिल आसिता।

रासायनिक संरचना:

डायफेनकोनेझोल स.त.:	४.८०% भार/भार
मॅन्कोझेब स.त.:	६४.००% भार/भार
क्राफ्ट लिग्निन पॉलीमर	६.००% भार/भार
सोडियम डीओक्टील सल्फोसक्सिनेट	२.००% भार/भार
डेक्सट्रोज	२.००% भार/भार
सिलिका	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
कुल	**१००.००% भार/भार**

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)		
प्याज	पत्तियों के अंगमारी रोग और मृदुरोमिल आसिता	८४+११२०-९६+१२८० ग्राम प्रति हेक्टेयर	१७५०-२००० ग्राम प्रति हेक्टेयर	५००	२०
अंगूर	रुक्ष रोग, मृदुरोमिल आसिता और चूर्णिल आसिता	०.०१२%+०.१६-०.०१४+०.१९ प्रतिशत अथवा ०.१२+१.६-०.१४+१.९ ग्राम प्रति लिटर	०.२५-०.३० प्रतिशत अथवा २.५-३.० ग्राम प्रति लिटर	५००-७५० वेली के आकार पर निर्भर	१०

इस्तेमाल के लिए निर्देश: सिफारिश के अनुसार फफूंदीनाशक की मात्रा मापकर ले और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी मिलाएं। एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग कर अच्छी तरह से हिलाएं और फिर अन्तिम छिड़काव घोल बनाने के लिए पानी की शेष मात्रा को अच्छी तरह से मिलाएं। **मौसम की स्थिति (सामान्य रूप में):** बारिश से ठीक पहले फफूंदीनाशक का छिड़काव न करें और हवा चलने वाले दिनों में भी छिड़काव करने से बचें। **मिट्टी और पानी (जहां भी लागू हो):** फफूंदीनाशक का छिड़काव करते समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। छिड़काव के लिए साफ पानी का उपयोग करें। **आवेदन के लिए फसल चरण – दिखाने के बाद के दिन:** शाखीय एवं फल धारणा। **आवेदन तकनीक :** फफूंदीनाशक का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। इसे फसलों, फसल की अवस्था और खुराक के साथ सिफारिश के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। सिफारिश में निर्दिष्ट अनुसार उपयोग की आवृत्ति, अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल और पुन: प्रवेश की अवधि बनाए रखें। फफूंदीनाशक का मिश्रण उपयोग के निर्देश में उल्लिखित के अनुसार होना चाहिए। **उपकरण के प्रकार:** सिफारिश की गई खुराक के अनुसार कम बहाव वाले नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे जैसे नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई–एच.टी.पी.पावर स्प्रेयर का उपयोग करना चाहिए। **नोजल प्रकार:** कम बहाव वाले होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे। **मात्रा बनाने की विधि:** अंगूर २.५–३.०० ग्रा/लि (०.२५–०.३०%), प्याज १७५०–२००० ग्रा/हैक्टेयर। **मिलाने का निर्देश: पुन:प्रवेश अवधि:** २४ घंटे। **फसल पूर्व अंतराल (PHI):** अंगूर १० दिन, प्याज २० दिन। **आवेदन का तरीका और समय:** रोग के लक्षण दिखते ही उत्पाद का तुरंत सिफारिश के अनुसार कम बहाव वाले होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे जैसे नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कंप्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर आणि अस्पी–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर पावरफन कराव. **वापराच्या वेळा :** वापर सकाळी किंवा संध्याकाळी करावा. **वारंवारता आणि फवारण्यांची कमाल संख्या :** रोगाच्या प्रादुर्भावानुसार १ ते ३ फवारण्या. **कोणत्याही पिकावर कीटनाशके फवारू नयेत अशा अवस्था :** गैरलागू. **मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू असणाऱ्या लाभदायक कीटकांना इजा होणे टाळण्यासाठी घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या :** उत्पादन जलचरांसाठी विषारी आहे म्हणून जलाशयांजवळ किंवा मत्स्यपालनजवळ वापरू नये. **विषबाधेची लक्षणे :** विषबाधेमुळे सुस्ती, कष्टश्वसन, पाठीला बाक, खाज, नाक चोंदणे कमी होणे, छातीत घट्टपणा, धडधड आणि अल्परक्तदाब. गिळल्याने मळमळ, उलटी आणि अतिसार होऊ शकतो. हायपोथर्मिया आणि एटॅक्सिया ही विशिष्ट लक्षणे आहेत. **प्रथमोपचार : १. पोटात गेल्यास :** माणूस शुद्धीत असेल आणि सावध असेल तर पाण्याने चूळ टाका आणि १–२ पेले पाणी प्यायला द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. इलाज करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय आणि सांगेपर्यंत उलटी काढू नका. **२. हुंगल्यास :** रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या आणि शरीराचे तापमान जपा. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्याला त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडावाटे तोंडामधून. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **३. त्वचेवर सांडल्यास :** बाधित अवयव साबणाने आणि मुबलक पाण्याने धुवून काढा, अगदी केस आणि नखांखालीसुद्धा. वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून पुन्हा वापरण्यापूर्वी साबणाने आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. **४. डोळ्यांत गेल्यास :** भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे हबके मारत राहा. जर वेदना, लालसरपणा आणि जळजळ कायम राहिली आणि प्रकाशसंवेदनशीलता होत राहिली, तर नेत्रचिकित्सकाचा सल्ला घ्या. **उतारा :** विशिष्ट उतारा नाही, लक्षणानुसार उपचार करा. **खबरदारी : १.**अन्नपदार्थापासून, अन्नाच्या रिकाम्या डब्यांपासून आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा.२.तोंडाशी, डोळ्यांशी आणि त्वचेशी संपर्क होऊ देणे टाळा.३.दूषित कपडे आणि अवयव फवारणीनंतर स्वच्छ धुवून काढा.४.फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काहीही खाऊ, पिऊ आणि तंबाखू चघळू नका.५.मिसळताना आणि फवारताना संरक्षक वस्त्रे घाला.६.फवारणीचे धुके हुंगणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. **साठवणीसाठीच्या सूचना :** १. बुरशीनाशक असणारी पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्य साठवायच्या खोल्यांपासून किंवा वास्तूंपासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा वास्तूंमध्ये साठवावीत किंवा बुरशीनाशकाच्या स्वरूपानुसार आणि प्रमाणानुसार वेगळ्या कुलूपबंद कपाटामध्ये ठेवावीत.२. खोल्या किंवा वास्तू सुबद्ध, सुप्रकाशित आणि हवेशीर असाव्यात व पाण्याचे बाष्प दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात. साठवणीची परिस्थिती कोरडी आणि गार असावी. **खबरदारीचे विधान : १.** या लेबलवर / पत्रकात निर्दिष्ट पिकांखेरीज इतर कुठेही वापर करू नये. २. वापरानंतर पत्रकात दिलेल्या सूचनेनुसार कंटेनर नष्ट करा. ३. हे उत्पादन जलचरांसाठी विषारी आहे आणि म्हणूनच हे जलाशयजवळ, जलीय संवर्धाच्या किंवा मत्स्यपालनाच्या जागेजवळ वापरू नये.४. रिकामा कंटेनर पुन्हा वापरणे धोक्याचे असते. **वापरलेल्या कंटेनरची, उपकरणातील युवणाची आणि उर्वरित पदार्थाची विल्हेवाट :** १.पॅकेजेस किंवा उर्वरित पदार्थ आणि धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीने, पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादकांचे, बुरशीनाशकांच्या सूत्रीकर्त्यांचे आणि वापरकर्त्यांचे कर्तव्य असेल.२. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नये.पॅकेज मोडून मानवी वस्तीपासून दूर नेऊन पुरावे.

खबरदारी : या लेबलवर / पत्रकात निर्दिष्ट पिकांखेरीज इतर कुठेही वापर करू नये

Hindi

डेकॉर

डायफेनोकोनेझोल ४.८% + मॅंकोझेब ६४% डब्ल्युपी

(बुरशीनाशक) शेतीच्या वापरासाठी.

हे कीटक नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी वापर : द्राक्ष – कवडी रोग, तंतूमुरी, चूर्णमुरी. कांदा – जांभळा ठिपका, तंतूमुरी.

रासायनिक संघटन :

डायफेनकोनेझोल क्रि.घ.	४.८०% व/व
मॅंकोझेब क्रि.घ.	६४.००% व/व
क्राफ्ट लिग्निन पॉलिमर	६.००% व/व
सोडियम डायऑक्टाइल सल्फोसक्सिनेट	२.००% व/व
डेक्सट्रोज	२.००% व/व
सिलिका	पर्याप्त मात्रा% व/व
वाळू	पुरेशा प्रमाणात% व/व
एकूण	**१००.००% व/व**

शिफारस :

पीक (पिके)	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा / हेक्टर		पाण्यामधील विरलन (लीटर)	अखेरची फवारणी ते काप्णीदरम्यानचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		क्रि.घ. (ग्रॅम)	सूत्रीकरण (ग्रॅम)		
कांदा	जांभळा ठिपका/ तंतूमुरी	८४+११२०-९६+१२८० ग्राम प्रति हेक्टर	१७५०-२००० ग्रॅम प्रति हेक्टर	५००	२०
द्राक्ष	कवडी रोग, तंतूमुरी, चूर्णमुरी.	०.०१२+०.१६-०.०१४+०.१९ टक्के अथवा ०.१२+१.६-०.१४+१.९ ग्राम प्रति लिटर	०.२५-०.३० टक्के किंवा २.५-३.० ग्रॅम प्रति लीटर	५००-७५० पिकाच्या आच्छादनानुसार	१०

वापरासाठीचे निर्देश : बुरशीनाशक शिफारसीनुसार मोजून घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घाला. लाकडी काठीने नीट ढवळा आणि मग उरलेले पाणी घालून अंतिम फवारणीचे द्रावण तयार करायला नीट ढवळा. **हवामानाची परिस्थिती (सर्वसाधारण) :** बुरशीनाशक पावसापूर्वी वापरू नका आणि वादळी दिवसांत फवारणे टाळा. **माती आणि पाणी (लागू असेल तिथे) :** बुरशीनाशक फवारतेवेळी मातीमध्ये पुरेसा ओलावा असायला हवा. फवारणीसाठी स्वच्छ पाणी वापरा. **वापरासाठीची पीकावस्था – पेरणीनंतरचे दिवस :** शाकीय आणि उत्पादक. **वापराची तंत्रे :** वापर सकाळी किंवा संध्याकाळी करावा. पिकांवर फवारावे. पीकावस्था आणि मात्रा शिफारसीत दिल्याप्रमाणे. वापराची वारंवारता, कापणीपूर्व कालांतर आणि पुन:प्रवेश कालावधी शिफारसीनुसार पाळा. बुरशीनाशकाचे मिश्रण वापराच्या निर्देशात दिल्यानुसार करा. **उपकरणाचा प्रकार :** वापर सुचवलेल्या मात्रेमध्ये लो ड्रिफ्ट नोझल बसवलेले उच्च आकारमानाचे स्प्रेयर म्हणजे नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कंप्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर आणि अस्पी–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर वापरून करावा. **नोझलचा प्रकार :** लो ड्रिफ्ट पोकळ कोनाचे नोझल बसवलेला उच्च आकारमानाचा स्प्रेयर. **मात्रा :** द्राक्षे २.५० – ३.०० ग्रॅम / ली (०.२५ – ०.३०%), कांदा १७५० – २००० ग्रॅम / हेक्टर. **मिश्रणासाठी सूचना – पुन:प्रवेश कालावधी :** २४ तास. **कापणीपूर्व कालांतर (पीएचआय) :** द्राक्षे १० दिवस, कांदे २० दिवस. **वापराची पद्धत आणि वेळ :** वापर रोगाची लक्षणे पिकावर दिसून आली की करावा. वापर सुचवलेल्या मात्रेमध्ये लो ड्रिफ्ट नोझल बसवलेले उच्च आकारमानाचे स्प्रेयर म्हणजे नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कंप्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर आणि अस्पी–एचटीपी पॉवर स्प्रेयर वापरून करावा. **वापराची वेळा :** वापर सकाळी किंवा संध्याकाळी करावा. **वारंवारता आणि फवारण्यांची कमाल संख्या :** रोगाच्या प्रादुर्भावानुसार १ ते ३ फवारण्या. **कोणत्याही पिकावर कीटनाशके फवारू नयेत अशा अवस्था :** गैरलागू. **मधमाश्या आणि कीटकांचे नैसर्गिक शत्रू असणाऱ्या लाभदायक कीटकांना इजा होणे टाळण्यासाठी घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या :** उत्पादन जलचरांसाठी विषारी आहे म्हणून जलाशयांजवळ किंवा मत्स्यपालनाच्या जागेजवळ वापरू नये. **विषबाधेची लक्षणे :** विषबाधेमुळे सुस्ती, कष्टश्वसन, पाठीला बाक, खाज, नाक चोंदणे कमी होणे, छातीत घट्टपणा, धडधड आणि अल्परक्तदाब. गिळल्याने मळमळ, उलटी आणि अतिसार होऊ शकतो. हायपोथर्मिया आणि एटॅक्सिया ही विशिष्ट लक्षणे आहेत. **प्रथमोपचार : १. पोटात गेल्यास :** माणूस शुद्धीत असेल आणि सावध असेल तर पाण्याने चूळ टाका आणि १–२ पेले पाणी प्यायला द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. इलाज करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय आणि सांगेपर्यंत उलटी काढू नका. **२. हुंगल्यास :** रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या आणि शरीराचे तापमान जपा. जर रुग्ण श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्याला त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडावाटे तोंडामधून. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **३. त्वचेवर सांडल्यास :** बाधित अवयव साबणाने आणि मुबलक पाण्याने धुवून काढा, अगदी केस आणि नखांखालीसुद्धा. वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे करून पुन्हा वापरण्यापूर्वी साबणाने आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. **४. डोळ्यांत गेल्यास :** भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे हबके मारत राहा. जर वेदना, लालसरपणा आणि जळजळ कायम राहिली आणि प्रकाशसंवेदनशीलता होत राहिली, तर नेत्रचिकित्सकाचा सल्ला घ्या. **उतारा :** विशिष्ट उतारा नाही, लक्षणानुसार उपचार करा. **खबरदारी : १.**अन्नपदार्थापासून, अन्नाच्या रिकाम्या डब्यांपासून आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा.२.तोंडाशी, डोळ्यांशी आणि त्वचेशी संपर्क होऊ देणे टाळा.३.दूषित कपडे आणि अवयव फवारणीनंतर स्वच्छ धुवून काढा.४.फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काहीही खाऊ, पिऊ आणि तंबाखू चघळू नका.५.मिसळताना आणि फवारताना संरक्षक वस्त्रे घाला.६.फवारणीचे धुके हुंगणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. **साठवणीसाठीच्या सूचना : १.** बुरशीनाशक असणारी पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषत: अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्य साठवायच्या खोल्यांपासून किंवा वास्तूंपासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा वास्तूंमध्ये साठवावीत किंवा बुरशीनाशकाच्या स्वरूपानुसार आणि प्रमाणानुसार वेगळ्या कुलूपबंद कपाटामध्ये ठेवावीत.२. खोल्या किंवा वास्तू सुबद्ध, सुप्रकाशित आणि हवेशीर असाव्यात व पाण्याचे बाष्प दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा मोजमापाच्या असाव्यात. साठवणीची परिस्थिती कोरडी आणि गार असावी. **खबरदारीचे विधान : १.** या लेबलवर / पत्रकात निर्दिष्ट पिकांखेरीज इतर कुठेही वापर करू नये. २. वापरानंतर पत्रकात दिलेल्या सूचनेनुसार कंटेनर नष्ट करा. ३. हे उत्पादन जलचरांसाठी विषारी आहे आणि म्हणूनच हे जलाशयजवळ, जलीय संवर्धाच्या किंवा मत्स्यपालनाच्या जागेजवळ वापरू नये.४. रिकामा कंटेनर पुन्हा वापरणे धोक्याचे असते. **वापरलेल्या कंटेनरची, उपकरणातील युवणाची आणि उर्वरित पदार्थाची विल्हेवाट :** १.पॅकेजेस किंवा उर्वरित पदार्थ आणि धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीने, पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादकांचे, बुरशीनाशकांच्या सूत्रीकर्त्यांचे आणि वापरकर्त्यांचे कर्तव्य असेल.२. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नये.पॅकेज मोडून मानवी वस्तीपासून दूर नेऊन पुरावे.

चेतावणी: पत्रिका व लेबल में दिये हुए फसलों के अलावा अन्य के लिए उपयोगित नहीं है ।

Marathi

ડેકોર

ડાઇફેનોકોનેઝોલ ૪.૮%+ મેનકોઝેબ ૬૪% ડબ્લ્યુપી

(ફૂગનાશક) કૃષિ સંબંધિત ઉપયોગ માટે.

લક્ષિત કીટકોને નિયંત્રિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે: દ્રાક્ષ–એન્થ્રીકનોઝ, ડાઉની માઇલ્ડ્યૂ, પાઉડરી માઇલ્ડ્યૂ, ડુંગળી–પર્પલ બ્લોચ, ડાઉની માઇલ્ડ્યૂ.

રાસાયણિક સંયોજન:

ડાઇફેનોકોનેઝોલ સ.ત.	૪.૮%ભાર/ભાર
મેનકોઝેબ સ.ત.	૬૪.૦૦%ભાર/ભાર
ક્રાફ્ટ લિગ્નિન પોલિમર	૬.૦૦%ભાર/ભાર
સોડિયમ ડાઇઓક્ટીલ સલ્ફોસક્સિનેટ	૨.૦૦ભાર/ભાર
ડેક્સટ્રોઝ	૨.૦૦%ભાર/ભાર
સિલિકા	પૂરતી માત્રામાં%ભાર/ભાર
કુલ	**૧૦૦.૦૦%ભાર/ભાર**

ભલામણ:

પાક(કો)	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		પાણીનું પ્રમાણ (લિટર)	છેલ્લાં છંટકાવથી લણણી વચ્ચે રાહ જોવાનો સમયગાળો (દિવસોમાં)
		સ.ત. (ગ્રામ)	સંયોજન (ગ્રામ)		
ડુંગળી	પર્પલ બ્લોચ, ડાઉની માઇલ્ડ્યૂ	૮૪+૧૧૨૦-૯૬+૧૨૮૦ ગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર	૧૭૫૦-૨૦૦૦ ગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર	૫૦૦	૨૦
દ્રાક્ષ	એન્થ્રીકનોઝ ડાઉની માઇલ્ડ્યૂ પાઉડરી માઇલ્ડ્યૂ	૦.૦૧૨+૦.૧૬-૦.૦૧૪+૦.૧૯ ટકા અથવા ૦.૧૨+૧.૬-૦.૧૪+૧.૯ ગ્રામ પ્રતિ લિટર	૦.૨૫-૦.૩૦ ટકા અથવા ૨.૫-૩.૦ ગ્રામ પ્રતિ લિટર	૫૦૦-૭૫૦ પાકના વેંટરૂપ પર આધાર રાખીને	૧૦

વાપરવાની રીત : માપેલી માત્રા મુજબ ફૂગનાશકની માત્રાને માપીને લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો. લાકડી વડે તેને બરોબર હલાવો અને ત્યારબાદ બાકી બચેલા પાણીને ઉમેરીને છંટકાવ માટેનું અંતિમ દ્રાવણ બનાવવા માટે તેને બરોબર હલાવો. **હવામાનની સ્થિતિ (સામાન્ય):** વરસાદ પહેલાં અને જે દિવસોએ ખૂબ વધારે પવન ફૂંકાયો હોય ત્યારે આ ફૂગનાશકોનો છંટકાવ કરશો નહીં. **માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ થતું હોય):** ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરતી વખતે માટીમાં પૂરતી માત્રામાં ભેજ હોવો જોઇએ. છંટકાવ માટે ચોખ્ખા પાણીનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. **પાકનો તબક્કો - વાવણી પછીના દિવસો:** વનસ્પતિ અને ઉત્પાદક. **છંટકાવની ટેકનિક:** તેનો ઉપયોગ સવારના સમયે અથવા સાંજે કરવો જોઇએ. ભલામણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલા પાક, પાકના તબક્કા અને માત્રા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરો. ભલામણમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યાં મુજબ, છંટકાવની ફ્રીક્વન્સી, લણણી પહેલાંનાં અંતરાલ તથા ફરીથી પ્રવેશના સમયગાળાને જાળવો. ફૂગનાશકનું મિશ્રણ ઉપયોગના દિશાનિર્દેશમાં ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ કરવું જોઇએ. **ઉપકરણોના પ્રકાર:** ભલામણ કરવામાં આવેલી માત્રા મુજબ લો ડ્રિફ્ટ નોઝલ ફિટ કરેલા હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરવો જોઇએ, જેમ કે, નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર અને એએસપીઇઈ–એચટીપી પાવર સ્પ્રેયર. **નોઝલ પ્રકાર:** લો ડ્રિફ્ટ પોલું શંકુ આકારનું નાળચું ફિટ કરેલા સ્પ્રેયર વડે હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રે. **માત્રા:** દ્રાક્ષ ૨.૫૦–૩.૦૦ ગ્રામ/લિટર (૦.૨૫–૦.૩૦%), ડુંગળી ૧૭૫૦–૨૦૦૦ ગ્રામ/હેક્ટર. **મિશ્રણ માટેની સૂચના:** ફરીથી પ્રવેશવાનો સમયગાળો: ૨૪ કલાક. **લણણી પૂર્વેનો અંતરાલ (પીએચઆઇ):** દ્રાક્ષ ૧૦ દિવસ, ડુંગળી ૨૦ દિવસ. **પદ્ધતિ અને ઉપયોગનો સમય:** પાક પર બીમારીના લક્ષણો જણાતાં જ લો ડ્રિફ્ટ પોલું શંકુ આકારનું નાળચું ધરાવતા હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રે એટલે કે નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર વગેરે વડે ભલામણ કરવામાં આવેલી માત્રામાં તેનો છંટકાવ કરવો જોઇએ. **છંટકાવનો સમય:** તેનો છંટકાવ સવારે અથવા સાંજે કરવો જોઇએ. **છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત ફીડવિજ્ઞી:** રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખીને ૧–૩ છંટકાવ. **એવા તબક્કો કે જ્યારે ફૂગનાશકનો છંટકાવ કોઇ પાક પર ન કરવો જોઇએ નહીં:** લાગુ થતું નથી. **મધમાખી અને કીટકોના ફુદરતી શત્રુઓ જેવા લાભદાયી કીટકોને નુકશાન ન પહોંચે તે માટે લેવાની સાવચેતીઓ/સાવચેતીઓ:** આ ઉત્પાદન જળચર જીવો માટે ઝેરી છે, આથી જળાશયો, જ્યાં જળચરોનો ઉછેર થતો હોય કે મત્સ્યપાલન થતું હોય તેની નજીક તેનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહીં. **ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણો:** ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોમાં બેભાન થઇ જવું, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, શરીર ઝુકી જવું, ખંજવાળ, નાક બરાઇ જવું, છાતી ભીંસાતી હોય તેમ લાગવું, ગભરામણ અને રક્તચાપ ઘટી જવાનો સમાવેશ થાય છે, જો ગળી જવામાં આવે તો ઉબકા ઊલટી અને ઝાડા થઇ શકે છે. શરીર ઠંડુ પડી જવું અને લથડાતા ચાલવું પણ તેના લક્ષણો છે. **પ્રાથમિક ઉપચારઃ ૧.જો ગળી જવામાં આવે તો:** જો દર્દી ભાનમાં હોય અને સચેત હોય તો, પાણી વડે તેમના મોંને પીંછળો, તેમને એકાદ–બે ગ્લાસ પાણી પીપડાવો. ડૉક્ટરને બોલાવો. જ્યાં સુધી સારવાર કરી રહેલા ફીઝિશિયન દ્વારા સૂચવવામાં ના આવે ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવશો નહીં. **૨. જો શ્વાસમાં જાય તો:** દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને તાપમાન પર નજર રાખો. જો દર્દી શ્વાસ લઈ રહ્યાં ના હોય કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય તો, કૃત્રિમ શ્વસન આપો, જે મોં વડે આપવામાં આવે તે શ્રેષ્ઠનીય છે, ફીઝિશિયનની સલાહ લો. **૩. ચામડીના સંપર્કમાં આવે તો:** વાળ અને નખના નીચેના ભાગ સહિત શરીરના પ્રભાવિત થયેલા હિસ્સાને ખૂબ વધારે માત્રામાં સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાખો. જો દુઃખાવો, લાલાશ અને બળતરા ચાલું રહે તો, ડૉક્ટરની સલાહ લો. દૂષિત થયેલાં તમામ કપડાંને અલગ પાડી દેવા જોઇએ તથા સાબુ અને પાણી વડે બરોબર રીતે ધોયા પછી જ ફરીથી ઉપયોગમાં લેવા જોઇએ. **૪. જો આંખોના સંપર્કમાં આવે તો:** ખૂબ વધારે માત્રામાં પાણી વડે આંખોને ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી ધોઈ લો. જો આંખોમાં દુઃખાવો, લાલાશ અને ફોટોફોબિયા ચાલું રહે તો આંખોના નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ લો. **ઝેરના મારણનું નિવેદન:** કોઈ ચોક્કસ ઝેરનું મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો. **સાવચેતીના સૂચનો:** ૧. ખાદ્યચીજો, ખાદ્યચીજોના ખાલી ડબ્બા અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ચામડીના સંપર્કમાં આવવું અટકાવો. ૩. છંટકાવ બાદ દૂષિત થયેલા કપડાં અને શરીરના અંગોને સારી રીતે ધોઈ નાંખો. ૪. જંતુનાશકનો છંટકાવ કરતી વખતે કંઈ