ଧନ ପ୍ରପିକୋନାଜଲ୍ ୨୫% ଇସି
(ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଫିମିଗାଣ୍ଡ)

ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକାରୀ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଫିମିଗାଣ୍ଡରେ ବହୁତ୍ୱ ଆଜାରରେ ପ୍ରପିକୋନାଜଲ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ୨୫% ଓ ବାକି ସହାୟକ ଉପାଦାନ ଥାଏ।

ସିଫାରିଶ:

ଫସଲ	ରୋଗ'ର ଇଣାଶୁଣା ନାମ	ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାତ୍ରା			ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ୍)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମିଲି.)	ମିଶାଇବା ପାଣି (ଲିଟର)	ସଠାରୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର (ଦିନ)
ଗହମ	କର୍ଣାଲ ବଣ୍ଟ	୧୨୫	୫୦୦	୭୫୦	୩୦
	ପତ୍ର କବଳି/ ବ୍ରାଉନ୍ ଚକ୍ତ	୧୨୫	୫୦୦	୭୫୦	୩୦
	ଷ୍ଟେମ୍ ରଷ୍ଟ/ ବ୍ଲାକ୍ ରଷ୍ଟ	୧୨୫	୫୦୦	୭୫୦	୩୦
	ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ରଷ୍ଟ/ ଯେଲୋ ରଷ୍ଟ	୧୨୫	୫୦୦	୭୫୦	୩୦
ଧାନ	ଆଲୁଅ ଅଙ୍ଗାରୀ (ଶିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍)	୧୨୫	୫୦୦	୫୦୦	୩୦
ଚିନା-ବାଦାମ	ସବଜିଆ ପତ୍ର ଦାଗ	୧୨୫	୫୦୦	୫୦୦	୧୫
	ଚକ୍ରୁଲ ପତ୍ର ଦାଗ	୧୨୫	୫୦୦	୫୦୦	୧୫
	ଚକଚି	୧୨୫	୫୦୦	୫୦୦	୧୫

ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ: ମାପ୍ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, କମ୍ପ୍ରେଶନ୍ ମାପ୍ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, କମ୍ପ୍ରେଶନ୍ ମାପ୍ସାକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେୟର ଆଉ ଅସ୍ପେ-ଏଚଟିପି ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ଆଶଙ୍କିତ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବିଥା, ଅଜ୍ଞ ଉଠିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ନିଦ ଲାଗିବା, ବିଷଳୋଇଆ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶରୀର ଆଙ୍କୁଡି ଓ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲୋମ ଦେଖାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମୋପଚାର: ୧) ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚଟ୍ଟି ସାର୍ଜିକାଲ ବାନ୍ତି କରାଯୁ। ୨) ସଂକ୍ରମିତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଲୁଗାପଟାକୁ ଜଳବରି ଧୋଇ ସାରି ଜଳକୁ ଏବଂ ଆଖିକୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ୩) ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ।

ଔଷଧ ଉପଯୋଗ: ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଉପଯୋଗ କରାଯୁ।

ଫିମିଗାଣ୍ଡର ମାତ୍ରବୁଝି କରିବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସିଡି: ୧) ଫିମିଗାଣ୍ଡକୁ ମୂଳ ପ୍ୟାକେଜ୍‌ରେ ରଖି ଅନ୍ୟମାନ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ଜାଳ ବା ଢୋକାରେ ମାତ୍ରବୁଝି କରିବା ଦରକାର ଯିସା ଏହାର ପରିମାଣ ଓ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ରାଖା ପାଇବ ରଖିବା ଦରକାର। ୨) ମାତ୍ରବୁଝି କରାଯିବା ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ରବୁଝ, ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ, ଯଥାରୀତି ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇବା ଦରକାର।

ରିକ୍ତ ପାତ୍ର, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଫିମିଗାଣ୍ଡ ଧୁଆଧୁଇ ପାଣିର ବିଧୁଂସିବାକଣ: ୧) ଜିନିଷ ପାତ୍ର, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଧୁଆଧୁଇ ପାଣି ଆଦିକୁ ନିରାପଦରେ ମାତ୍ରବୁଝ କରିବେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ପାଦକ, ଫିମିଗାଣ୍ଡର ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ ଓ ଉପଯୋଗକାରୀଙ୍କର। ୨) ଫିମିଗାଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ୩) ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗିଭୁଙ୍ଗି ଲୋକବସ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତିହେବା ଦରକାର।

ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କତା: ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଓ ଚେହେରେ ଲାଗିବା ଏଡାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଖାନ-ପାନ, ଧୂମ୍ରପାନ ମନା। ରିକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ଧିଂସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି, ଗରିଡା ଓ ଜଳଚରାରେ ପାଣିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଓ ଶୀତଳ ସ୍ଥାନରେ, ଭଲାପ ଓ ଖୋଲା ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ମାତ୍ରବୁଝ କରାଯୁ।

ରାସାୟନିକ ସଂଗଠନ :

ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ୍ ସ.ଉ.
(୮୮% ଓଜନ/ଓଜନ ଆଧାରିତ) : ୨୫% ଓଜନ/ଓଜନ
ଅତଦୃବକାରୀ ଘଟକ - ଇପୋକ୍ସିଲେଟେଡ
ଲେକିଟେଥଲ୍ ଅଏଲ୍ : ୧୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ସଫ୍ଟଟାଣ୍ଟାଣ୍ଟ/ଓଡ଼ିଟେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ: ଅଲ୍ଯାକାଲଣ୍ଟ ଏରିଲ୍ ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍ ଅଫ୍ Ca/Na/mg ସଲ୍ଟ
କିମ୍ବା ବଦ୍‌ସମାନ : ୩% ଓଜନ/ଓଜନ
ସାଇକ୍ଲୋହେକ୍ସାନୋନ : ୨୫% ଓଜନ/ଓଜନ
ଦ୍ରାବକ : C-IX : ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
୧୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ

ORIYA

ধন প্ৰ'পিক'নাজ'ল ২৫% ইচি
(সৰ্বাঙ্গবাহী ভেকু বনাশক)

ই এবিধ কাৰ্যকৰী, সৰ্বাঙ্গবাহী ভেকুবনাশক য'ত আছে সক্ৰিয় উপাদানৰূপে প্ৰ'পিক'নাজ'ল তৰ ইচাপত ২৫% আৰু বাকীখিনি এডজুভেণ্ট।

প্ৰয়োগৰ অনুমোদন :

শস্য	বোগৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ			শেষ স্প্ৰে আৰু চপোৱাৰ মাজত বখ লগা সময় (দিন)
		স. উ. (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশান (মিঃলিঃ)	দ্ৰৱণৰ বাবে পানী (লিটাৰ)	
ঘেঁহু	কাৰ্নাল বাণ্ট	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
	পাত বৰমোহা/ মুগা বৰমোহা	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
	গাগছ বৰমোহা/ ক'লা বৰমোহা	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
	আঁচ আঁচ বৰমোহা/ হালধিয়া বৰমোহা	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
ধান	গা-গছৰ আহৰণ	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
চিনা-বাদাম	জঁইশৰা বোগ	১২৫	৫০০	৫০০	৩০
	আগৰিয়া পাতত দাগশৰা	১২৫	৫০০	৫০০	১৫
	পাছৰিয়া পাতত দাগশৰা	১২৫	৫০০	৫০০	১৫
	বৰমোহা	১২৫	৫০০	৫০০	১৫

প্ৰয়োগৰ বাবে ব্যৱহৃত সঁজুলি : নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশান নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশান নেপচেক বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ, অস্পী-এইচটিপি পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ আদি।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ: আশঙ্কিত হোৱা, মুণ্ড বিথা, অজ্ঞ উঠিবা, বান্তি হোৱা, নিদ লাগিবা, বিষলোঁইআ, অস্বাভাৱিক শৰীৰ আঙুড়ি ও অস্তব্যস্ত লোম দেখাওঁৱাজাই।

প্ৰথমোপচাৰ: ১) পেটকু যাইপইলে, ৰুকী সাৰ্জিকাল বান্তি কৰাযু। ২) বাস্তুগত প্ৰভাৱপ্ৰাপ্ত ও ঘুলাপাটকু জলৰিই ধোৱা আৰু পানী কৰাযু এবং আখিকু প্ৰচুৰ পানীৰে ধুইদিয়া। ৩) শ্বাসৰে যাইপইলে, ৰোগীকু খোলা পবনকু নেই যাআযু।

ঔষধ উপযোগ : লক্ষণ দেখি উপযোগ কৰাযু।

ফৰ্মুলেশান কিছুমান কৰিবাৰ ধাৰ্য্য চিডি : ১) ফৰ্মুলেশানকু মূল পেকেজ্‌ৰে ৰখি অন্যমান জিনিষ ঠাকু অলগা এক জাল বা ঢোকাৰোত সাম্ভুদ কৰিবা দৰকাৰ কিয় এহাৰ পৰিমাণ ও গুণ উপৰে নিৰ্ভৰ কৰি এক অলগা আলমাৰাৰোত ৰাখা যাব পাৰে ৰখিবা দৰকাৰ। ২) সম্ভুদ কৰাযিবা স্থানটি সাম্ভুদু, শুখিলা, আলোকিত, পৰিয়াপ্ত আৰু প্ৰশস্ত হোৱাজাই দৰকাৰ।

ৰিক্ত পাত্ৰ, বচকা দ্ৰৱ্য ও ফিমিগাণ্ড ধুআধুই পানীৰ বিধুংবিকৰণ : ১) জিনিষ পাত্ৰ, বচকা দ্ৰৱ্য আৰু ধুআধুই পানী আদিকু নিৰাপদৰে নষ্ট কৰিবেবাৰ দায়িত্ব উত্পাদক, ফিমিগাণ্ডৰ ফৰ্মুলেশনকু ও প্ৰয়োগকাৰীমানৰ। ২) ফিমিগাণ্ড প্যাকেজকু কেবল যেন অন্যমানে কৰাজাই নাই বৰং ফাৰ্মলে নাই। ৩) প্যাকেজকু ভাঙ্গিভুঙ্গি লোকবস্তি ঠাকু দূৰতে পোতিহেবা দৰকাৰ।

ব্যৱহাৰকাৰীমানৰ দ্বাৰা সতৰ্কতা : শ্বাসৰে যিবা ও চেহেৰে লাগিবা এড়াযু। বাৰহাৰ কৰা সময়ত কোনো খাবৰ খোৱা-বোৱা বা ধূমপান কৰিবা নাই।

ব্যৱহাৰৰ শেষত খালী পেকেজ নষ্ট কৰি পেলাব। ইয়াৰ দ্বাৰা পুখুৰী, বিল, জান-জুৰি আদি দূষিত কৰিবা যাব সাম্ভুদী আৰু পশু-খাদ্যৰ শষ্য আদিৰ ওচৰত, এটুকুৰা ঠাণ্ডা, শুকান ঠাইত তাপ আৰু জুইৰ পৰা আঁতৰাই মজুত ৰাখিব।

ৰাসায়নিক গঠন :

প্ৰ'পিক'নাজ'ল স.উ.
(৮৮% ৰ/ও-এ ওপৰত আধাৰিত) : ২৫% ওজন/ওজন
ইমালচিফাইইং এজেণ্ট-ইথক্সিলেটেড
বনস্পতি তেল : ১০% ওজন/ওজন
চাৰ্কেক্টেণ্ট/বেটিং এজেণ্ট : কেলচিয়াম/ চাঁচয়াম/মেগনেচিয়াম চলীব এলকিল এৰিল
চালক'নেট বা সমতুল্য : ৩% ওজন/ওজন
চাইক্ল'হেক্সানন : ২৫% ওজন/ওজন
চলভেণ্ট-C-IX : পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ
১০০% ওজন/ওজন

ASSAMESE

धान् प्रपिकोनाजोल २५% ईसी
(अन्तर्वाही ह्यूक्रानाशक)

इहा একটি প্রভাবনয়ক অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক, যাহ্‌তে সক্রিয় পদার্থ হিসেবে আছে ২৫% প্রপিকোনাজোল, বাদবাকী সংবাহক।

सुपारिश:-

फसल	रोगेरव चलति नाम	मात्रा/हेक्टेर			शेष स्प्रे थेकि फसल तोला पर्यन्त अपेक्षाकाल (दिवसांमध्ये)
		सः उः (ग्राम)	फ्रमूलेशन (मिःलिःते)	मेशीनारे जल (लिटार)	
गम	दाना पोड़ा पात्तार मरछे/ वादामी मरछे	१२५	५००	৭৫০	৩০
	पानांवरीत तांबेरा/ तपकिरी तांबेरा	१२५	५००	৭৫০	৩০
	खोडावरीत तांबेरा/ काला तांबेरा	१२५	५००	৭৫০	৩০
	पाताराे किनारास मरछे/ हलदे मरछे	१२५	५००	৭৫০	৩০
धान	थोलाणाछा	१२५	५००	৭৫০	৩০
चिनेन-बादाम	जलदि पात्तास दाग	१२५	५००	৭৫০	१५
	नाबि पाताछ दाग	१२५	५००	৭৫০	१५
	टीडा	१२५	५००	৭৫০	१५
	गेरु	१२५	५००	৭৫০	१५
	मरछे	१२५	५००	৭৫০	१५

प्रयोगेर जन्ये व्यवहृत सरञ्जाम:- न्यापस्याक स्प्रेयार, फुट स्प्रेयार, कम्प्रेशन न्यापस्याक स्प्रेयार, कमप्रेशन न्यापस्याक ब्याटारी स्प्रेयार, आस्पी-एइचटिपि पाওয়ार स्प्रेयार।

विषाक्ततार उपसर्ग ও लक्षण:-उत्करणा, माथाबरा, वमिताव, वमि करा, অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, অস্বাভাবিক দেহাবস্থা এবং উসকোখুসকো লোম পরিলক্ষিত হয়।

प्राथमिक चिकित्सा:-১. গিলে ফেললে, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করান। ২. সংক্রামিত ত্বক, পোশাক ও চোখে প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে দিন। ৩. শ্বাসে গেলে, রোগীকে মুক্তবায়ুতে নিয়ে যান।

ঔষধিক চিকিৎসা:-লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।

ছত্রাকনাশক মজুতকরণের জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি:- ১. ছত্রাকনাশক সমূহিল শাফ অন্যান্য সামগ্রী থেকে আলাদা করে জমা রাখতে হবে এবং তাপ ও সূর্যের কিরণ থেকে দূরে রাখতে হবে। ২. ছত্রাকনাশক মজুতকরণ জন্যে বাতাহীত ও ভাল পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

ব্যবহৃত প্যাক, উদ্ভব পদার্থ এবং ছত্রাকনাশক ধোয়ানির বিনষ্টিকরণ:- ১. ছত্রাকনাশক নির্মাতা, ফর্মুলাকারী এবং অপারেটরের এটা আবশ্যিক কর্তব্য যে প্যাক, বা উদ্ভব পদার্থ এবং ধোয়ানি তরলাদি প্রমন নিরাপদ উপায়ে নিনষ্ট করা যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনঃব্যবহার রোধ করতে উহা যন্ত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. পাত্রক ভেঙ্গে জনবসতী থেকে দূরে পুঁতে ফেলবেন।

ব্যবহারকারীর সতর্কতা:- শ্বাসে নেওয়া ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়াবেন। ব্যবহারকালে খাবার খাওয়া, পান করা এবং ধূমপান করা নিষেধ। ব্যবহারের পর খালি প্যাক বিনষ্ট করুন। পুকুর, বিল ও খাল সংক্রামিত করবেন না। খাদ্য বস্তু ও পশুখাদ্য তথা উদ্ভাপ ও উষ্মুক্ত অগ্নিশিখা থেকে দূরে একটি ঠাণ্ডা, শুকনো স্থানে রাখবেন।

রাসায়নিক সংশ্লিপ্ত:-

প্রপিকোনাজোল সঃ উঃ
(৮৮% ওজন/ওজন ভিত্তিতে) : ২৫% ওজন/ওজন
অদ্রবী পদার্থ-ইথক্সিলেটেড বনস্পতি তেল : ১০% ওজন/ওজন
সার্ফাক্ট্যান্ট/আর্দ্রকারী পদার্থ: ক্যালসিয়াম/ সোডিয়াম/মাঙ্গনিজ অ্যালকাইল আরীল সালফোনেট অথবা সমতুল্য : ৩% ওজন/ওজন
সাইক্লোহেক্সানন : ২৫% ওজন/ওজন
দ্রাবক-C-IX : যথেষ্ট পরিমাণ
১০০% ওজন/ওজন

BENGALI

ধন্ প্রপিকোনাজোল 25% ইসি
(অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক)

ইহা একটি প্রভাবনয়ক অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক, যাহ্‌তে সক্রিয় পদার্থ হিসেবে আছে ২৫% প্রপিকোনাজোল, বাদবাকী সংবাহক।

সুপারিশ:-

ফসল	রোগের চলতি নাম	মাত্রা/হেক্টর			শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিবসগুলি)
		সঃ উঃ (গ্রাম)	ফ্রমুলেশন (মিঃলিঃ)	মেশানোর জল (লিটার)	
গম	দানা পোড়া পাতার মরচে/ বাদামী মরচে	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
	পানাংবরীত তাঁবেরা/ কাণ্ডে মরচে/ কালো মরচে	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
	পাতার কিনারায় মরচে/ হলদে মরচে	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
ধান	থোলাপাচা	১২৫	৫০০	৫০০	৩০
চিনেন-বাদাম	জলদি পাতায় দাগ	১২৫	৫০০	৫০০	১৫
	নাবি পাতায় দাগ	১২৫	৫০০	৫০০	১৫
	টীডা	১২৫	৫০০	৫০০	১৫
	মরচে	১২৫	৫০০	৫০০	১৫

উপযোগমাঁ পদ্ধতাং সাধন: নেপসেক স্প্রেয়র, ফুট স্প্রেয়র, কম্প্রেশন নেপসেক স্প্রেয়র, কম্প্রেসড নাপ্সাক ব্যাটরী স্প্রেয়র, আস্পী-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়র।

বিষাক্ততার লক্ষণ: উত্করণা, মাথাবরা, বমিভাব, বমি করা, অবসাদ, শ্বাসকষ্ট, অস্বাভাবিক দেহাবস্থা এবং উসকোখুসকো লোম পরিলক্ষিত হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা:-১. গিলে ফেললে, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করান। ২. সংক্রামিত ত্বক, পোশাক ও চোখে প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে দিন। ৩. শ্বাসে গেলে, রোগীকে মুক্তবায়ুতে নিয়ে যান।

ঔষধিক চিকিৎসা:-লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করান।

ছত্রাকনাশক মজুতকরণের জন্যে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি:- ১. ছত্রাকনাশক সমূহিল শাফ অন্যান্য সামগ্রী থেকে আলাদা করে জমা রাখতে হবে এবং তাপ ও সূর্যের কিরণ থেকে দূরে রাখতে হবে। ২. ছত্রাকনাশক মজুতকরণ জন্যে বাতাহীত ও ভাল পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

ব্যবহৃত প্যাক, উদ্ভব পদার্থ এবং ছত্রাকনাশক ধোয়ানির বিনষ্টিকরণ:- ১. ছত্রাকনাশক নির্মাতা, ফর্মুলাকারী এবং অপারেটরের এটা আবশ্যিক কর্তব্য যে প্যাক, বা উদ্ভব পদার্থ এবং ধোয়ানি তরলাদি প্রমন নিরাপদ উপায়ে নিনষ্ট করা যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনঃব্যবহার রোধ করতে উহা যন্ত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. পাত্রক ভেঙ্গে জনবসতী থেকে দূরে পুঁতে ফেলবেন।

ব্যবহারকারীর সতর্কতা:- শ্বাসে নেওয়া ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়াবেন। ব্যবহারকালে খাবার খাওয়া, পান করা এবং ধূমপান করা নিষেধ। ব্যবহারের পর খালি প্যাক বিনষ্ট করুন। পুকুর, বিল ও খাল সংক্রামিত করবেন না। খাদ্য বস্তু ও পশুখাদ্য তথা উদ্ভাপ ও উষ্মুক্ত অগ্নিশিখা থেকে দূরে একটি ঠাণ্ডা, শুকনো স্থানে রাখবেন।

রাসায়নিক সংশ্লিপ্ত:-

প্রপিকোনাজোল সঃ উঃ
(৮৮% ওজন/ওজন ভিত্তিতে) : ২৫% ওজন/ওজন
অদ্রবী পদার্থ-ইথক্সিলেটেড বনস্পতি তেল : ১০% ওজন/ওজন
সার্ফাক্ট্যান্ট/আর্দ্রকারী পদার্থ: ক্যালসিয়াম/ সোডিয়াম/মাঙ্গনিজ অ্যালকাইল আরীল সালফোনেট অথবা সমতুল্য : ৩% ওজন/ওজন
সাইক্লোহেক্সানন : ২৫% ওজন/ওজন
দ্রাবক-C-IX : যথেষ্ট পরিমাণ
১০০% ওজন/ওজন

BENGALI

ধন্ প্রপিকোনাজোল 25% ইসি
(অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক)

ইহা একটি প্রভাবনয়ক অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক, যাহ্‌তে সক্রিয় পদার্থ হিসেবে আছে ২৫% প্রপিকোনাজোল, বাদবাকী সংবাহক।

সিফারিশ:

পাকো	রোগেনু সামান্য নাম	প্রমাণ/হেক্টর			ছেত্তা ছেত্তাথেকী বগলী পয়ে প্রতীক্ষা গাণ্ডো (দিবসো)
		স. উ. (গ্রাম)	ফ্রুলাশক (মি.লী.)	মঁৎ রুপা মাঁহে পাণী (লী.)	
ঘউঁ	কড়াসলোনো রোন পানো ঝৈ/ ভূপরা ঝৈ	১২৫	৫০০	৩৭৫০	৩০
	গাঁমো ঝৈ/ কাণ্ডো ঝৈ	১২৫	৫০০	৩৭৫০	৩০
	পট্টীনো ঝৈ/ পীণো ঝৈ	১২৫	৫০০	৩৭৫০	৩০
ঝোঁয়া মকড়ুণী	ছোটরোনা সুড়ারো শিড়ুআতনা	১২৫	৫০০	৭৫০	৩০
	পানাদা টীক্কা মোড়ো পানাদা	১২৫	৫০০	৭৫০	১৫
	টীক্কা	১২৫	৫০০	৭৫০	১৫
	গেরু	১২৫	৫০০	৭৫০	১৫

উপযোগমাঁ পদ্ধতাং সাধন: নেপসেক স্প্রেয়র, ফুট স্প্রেয়র, কম্প্রেশন নেপসেক স্প্রেয়র, কম্প্রেসড নাপ্সাক ব্যাটরী স্প্রেয়র, আস্পী-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়র।

ঔর বচয়ানাং চিহ্নো অর্থ লক্ষণো: চিন্তা, মাথানো দুঃখাও, উঁবরা, উত্তটী, ঘৈন, ডায়রুসোনিয়া, অসামান্য শরীরনী স্থিতিনো, অর্থ অস্তব্যস্তে ইপাটী ঝৈবাঁ লক্ষণো ঝৈথামাং আব্যাং হোনা।

প্রাথমিক সারবারাংনা পগবাঁ: ১. ঝৈ নাগবারাংনা আবৈ, তো নগামা আংগনা আংখী উত্তটী হরাবনা প্রয়াস করো. ২. দূষিত ত্বয়্যা অর্থ কপড়া তথা দূষিত আংখী ঘুৎকন পাণীহী ধোই নাংখী. ৩. জো শ্বাসমাং ঝৈবা পাম্বে, তো দরদীনা তাজী হবামাং খসেতী.

ঔষধ উপযোগ : লক্ষণো অনুসার সারবার আপো.

ফুঙ্গনাশকনা সংগ্রহ মাটে সুচিত হরবানী শরতো: ১. ফুঙ্গনাশক ঘরবাবাং পঁতৈগস বীজ বীজবস্তুওনা সংগ্রহনা মাটে পবরানা ঔতরঅনী অথবা ঝৈবাথী হুত্ত অলগ ঔতরঅনী অথবা ঝৈবাথী ঝৈবাথী ফুঙ্গনাশকনা ঘৃহৈ অনী প্রকার উপর আধার রাখীনা অলগ ফলাটমাং তাণাংঝামী বন্ধ করী রাখণা. ২. ফুঙ্গৈনাশক রঁৎকৈ বগৈ অনী অথবা