INDOLIZER®
Liquid

Biostimultant Based on Seaweed Extracts

Indolizer® Liquid is a microbiology research product derived from Seaweed Extracts through unique process. An advanced technology formulation to stimulate various plant processes and maximize plant growth and yield.

Composition:

Total Solid Containing : Seaweed Extracts, Hydrolyzed proteins, Amino acids : 20.00% Min., Aqueous diluents, stabilizers and preservatives : 80.00%Max., **Total:100.00%**

Specification

Colour : Blackish Brown Liquid, Odour : Marine, Total solids : > 20.0%, pH : > 4.00, Specific gravity : > 1.0 gm/cc

Direction & Method of Application

For Agriculture use only. Shake the bottle well before use. Make dilution of Indolizer® liquid at 500-750 ml per hectare by adding recommended quantity in water.

Crop	Application	Time
Wheat	1st Application	30 days after sowing
Paddy	1st Application	At Tillering stage (25-30 DAT-Days after transplanting)
	2nd Application	At Panicle initiation stage (45-60 DAT)
	3rd Application	At Milking stage (70-85 DAT)
Cotton	1st Application	After square formation
	2nd Application	15 days after first application (Pre Bloom)
	3rd Application	15 days after second application (Boll formation)
Soybean	1st Application	Pre flowering Stage
	2nd Application	At the time of pod setting
Sugarcane	1st Application	45 to 70 days after planting
	2nd Application	6 Weeks after first application
	3rd Application	8 Weeks after second Application
Banana	1st Application	75 days after planting
	2nd Application	125 days after fruit setting
Vegetables, Chilli, Cauliflower, Tomato, Brinjal Carrot, Coriander, Cabbage,	1st Application	30 days after planting
	2nd Application	60 days after planting
Onion	1st Application	Vegetative stage (15-20 DAT)
	2nd Application	Bulb formation stage (30-35 DAT)
	3rd Application	Bulb development stage (65-75 DAT)
Garlic	1st Application	6 — 8 leaf stage
	2nd Application	2 to 3 weeks after first application
Potato	1st Application	6 — 8 leaf stage
	2nd Application	At 40 To 45 days after first application
Grapes	1st Application	Pre flowering stage
	2nd Application	At the time of fruit setting
	3rd Application	20 days after fruit setting
Apple/ Plum/ Peach/ Cherry	1st Application	At the time of intensive growth
	2nd Application	At the time of fruit setting
Tea	1st Application	At first rapid leaf expansion
	2nd Application	After Each picking

Dosage: 500-750 ml per hectare

Compatibility: Indolizer® Liquid is compatible with most agriculturally used pesticides. It is always recommended to check the compatibility before use.

Storage conditions : Keep in original container tightly closed at safe place. Avoid storing in direct sun light and freezing temperature.

Caution: Keep out of reach of children.

First Aid Measures: There are no specific hazards known to be associated with this product, although precautions should be taken to avoid unnecessary contact with skin, eyes and mouth. Eyes: Irrigate thoroughly with water at least 10 minutes. If discomfort persists obtain medical attention. Skin: Wash skin thoroughly with water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. In severe cases obtain medical attention. Ingestion: Wash out mouth thoroughly with water, obtain medical attention. Inhalation: Remove from exposure in open air. In severe cases obtain medical attention.

Disclaimer : As use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than uniform quality of the product.

इन्डोलाईजर
द्रव

समुद्री वनस्पतीच्या अर्कावर आधारित जैवउत्प्रेरक

इन्डोलाईजर द्रव हे एका अद्वितीय प्रक्रियेद्वारे समुद्री वनस्पतीच्या अर्कापासून काढलेले एक सूक्ष्मजीवशास्त्रीय संशोधन उत्पादन आहे. रोपाच्या विविध प्रक्रियाना उत्प्रेरित करण्यासाठी रोपाची वाढ आणि पीक जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी एक प्रगतिशील तंत्रज्ञान आहे.

संरचना:

एकूण घन सामग्रीः समुद्री वनस्पतीचा अर्क, हायड्रोलाइझ्ड प्रथीने, अंमिनो एसिड्सः २०.००% किमान, एक्विअस डीयल्यूएन्ट्स, स्टॅबीलायझर्स आणि संवर्धकेः ८०% कमाल. **एकूण:१००%**

तपशील:

रंग काळसर तपकिरी द्रव, गंधः मरीन, एकूण घन पदार्थः >२०.०%, pH : >४.००,

विशिष्ट गुरुत्वः >१.० ग्रा/सीसी.

निर्देश व वापरण्याची पद्धत :

केवळ शेतीविषयक वापरासाठी. वापरण्यापूर्वी बाटली चांगली हलवा. इन्डोलाईजर शिफारस केलेल्या प्रमाणात प्रति हेक्टरी ५०० ते ७५० मिली वापरा.

पीक	वापर	वेळ
गहू	१ ला वापर	पेरणीनंतर ३० दिवसांनी
भात	१ ला वापर	कल्ले फुटायच्या टप्प्यावर (लावणी केल्यानंतर २५-३० दिवस)
	२ रा वापर	लोम्ब्या येण्याचा टप्पा (लावणी केल्यानंतर ४५-६० दिवस)
	३ रा वापर	लावणी केल्यानंतर ७०-८५ दिवस
कपाशी	१ ला वापर	चौफुली तयार झाल्यानंतर
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर १५ दिवसांनी (प्री ब्लूम)
	३ रा वापर	दुसऱ्या वापरानंतर १५ दिवसांनी (बोंड तयार होणे)
सोयबीन	१ ला वापर	फुलोरा पूर्व टप्पा
	२ रा वापर	शेंगा सेटिंगच्या वेळी
ऊस	१ ला वापर	लावणीनंतर ४५ ते ७० दिवसांनी
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर ६ आठवड्यांनी
	३ रा वापर	दुसऱ्या वापरानंतर ८ आठवड्यांनी
केळी	१ ला वापर	लावणीनंतर ७५ दिवसांनी
	२ रा वापर	फळ सेटिंगनंतर १२५ दिवसांनी
भाज्या, मिरची, फुलकोबी, टोमॅटे, वांगी, गाजर, कोथिंबीर, पानकोबी	१ ला वापर	लावणीनंतर ३० दिवसांनी
	२ रा वापर	लावणीनंतर ६० दिवसांनी
कांदा	१ ला वापर	शाकीय वाढीचा टप्पा लावणी नंतर १५ ते २० दिवस
	२ रा वापर	कांदा तयार होण्याचा टप्पा (लावणी नंतर ३० ते ३५ दिवस)
	३ रा वापर	कांदा विकसित होण्याचा टप्पा (लावणी नंतर ६० ते ७५ दिवस)
लसूण	१ ला वापर	६ -८ पानांचा टप्पा
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर २ ते ३ आठवडे
बटाटे	१ ला वापर	६ ते ८ पानांचा टप्पा
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर ४० ते ४५ दिवशी
द्राक्षे	१ ला वापर	फुलोऱ्याच्या टप्प्यावर
	२ रा वापर	फळ सेटिंगच्या वेळी
	३ रा वापर	फळ सेटिंगनंतर २० दिवसांनी
सफरचंद/प्लम/ पीच/चेरी	१ ला वापर	तीव्रतर वाढीच्या वेळी
	२ रा वापर	फळ सेटिंगच्या वेळी
चहा	१ ला वापर	पाने प्रथम वेगाने विस्तारताना
	२ रा वापर	प्रत्येक खुडणीनंतर

मात्राः प्रति हेक्टर ५००-७५० मिली

अनुकूलताः इन्डोलाईजर द्रव शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक सर्व कीटकनाशकांना अनुकूल आहे. वापरण्यापूर्वी नेहमीच अनुकूलता तपासण्याची शिफारस केली जाते.

साठवण्याच्या अटीः मूळ कंटेनर घट्ट बंद करून सुरक्षित जागी ठेवा. थेट सूर्यप्रकाश किंवा गोठवण्याऱ्या तापमानात ठेवणे टाळा.

सावधानः मुलांच्या हाती लागण्यापासून दूर ठेवा.

प्रथमोपचारः या उत्पादनाशी संबंधित विशिष्ट ज्ञात धोके नाहीत, थथापि त्वचा, डोळे आणि तोंडाशी अवश्यक संपर्क येणे टाळण्याची काळजी घयावी. डोळेः किमान १० मिनीटे भरपूर पाण्याने हबके मारा. अस्वस्थता चालू राहिली तर वैद्यकीय मदत मिळवा. त्वचाः संपूर्णपणे पाण्याने धुवा. दूषीत कपडे काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय मदत मिळवा. पोटात जाणेः तोंड पाण्याने धुवा, वैद्यकीय मदत मिळवा. श्वासातून आत जाणेः रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा. गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय मदत मिळवा.

अस्वीकारः या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे, उत्पादनाच्या एकसमान दर्जाव्यतिरिक्त आम्ही कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.

Marathi

इन्डोलाईजर
लिक्विड

समुद्री शैवाल के अर्क पर आधारित बायोस्टिमुलेंट

इन्डोलाईजर लिक्विड सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान उत्पाद है जो अद्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से समुद्री शैवाल के अर्क से प्राप्त होता है। विभिन्न पौधों की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और पौधों की वृद्धि और उपज को अधिकतम करने के लिए यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण है।

संरचना:

कुल ठोस में शामिल: समुद्री शैवाल का अर्क, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, अमीनो एसिड: २०.००% न्यूनतम, घुला देनेवाला द्रव्य, स्टेबलाइजर्स और संरक्षक: ८०.००% अधिकतम, **कुल: १००.००%**

स्पेसिफ़िकेशन

रंग: काला भूरा तरल, गंध: समुद्री, कुल ठोस: >२०.०%, पीएच: >४.००, विशिष्ट गुरुत्व: >१.० ग्राम / सीसी

उपयोग के दिशा निर्देश व तरीका

केवल कृषि उपयोग के लिए। उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। पानी में सुझाई गयी मात्रा मिलाकर ५००-७५० मिली प्रति हेक्टेयर की दर से इन्डोलाईजर लिक्विड को मिलाएं।

फसल	उपयोग	समय
गेहूं	पहला उपयोग	बुवाई के ३० दिन बाद
धान	पहला उपयोग	जुताई के चरण में पहला आवेदन (रोपाई के २५ से ३० दिन बाद)
	दूसरा उपयोग	बाली निकलने की अवस्था में (रोपाई के ४५ से ६० दिन बाद)
	तीसरा उपयोग	दाने भरने की अवस्था में (रोपाई के ७० से ८५ दिन बाद)
कपास	पहला उपयोग	स्केयर बनाने के बाद
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के १५ दिन बाद (फूल आने से पहले)
	तीसरा उपयोग	दूसरे उपयोग के १५ दिन बाद (कपास बनने से पहले)
सोयाबीन	पहला उपयोग	फूल आने से पहले की अवस्था
	दूसरा उपयोग	फली आने के समय
गन्ना	पहला उपयोग	रोपण के ४५ से ७० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग पहले उपयोग के ६ सप्ताह बाद
	तीसरा उपयोग	तीसरा उपयोग दूसरे उपयोग के ८ सप्ताह बाद
केला	पहला उपयोग	पहला उपयोग रोपण के ७५ दिन बाद
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग फल लगने के १२५ दिन बाद
सब्जियां, मिर्च, फूलगोभी, टमाटर, बैंगन गाजर, धनिया, पत्ता गोभी	पहला उपयोग	रोपण के ३० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	रोपण के ६० दिन बाद
प्याज	पहला उपयोग	वानस्पतिक विकास की अवस्था (रोपाई के १५ से २० दिन बाद)
	दूसरा उपयोग	बल्ब गठन चरण (रोपाई के ३० से ३५ दिन बाद)
	तीसरा उपयोग	तीसरा उपयोग बल्ब विकास चरण (रोपाई के ६० से ६५ दिन बाद)
लहसुन	पहला उपयोग	६ - ८ पत्ती का चरण
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के २ से ३ सप्ताह बाद
आलू	पहला उपयोग	६ - ८ पत्ती का चरण
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के ४० से ४५ दिनों के बाद
अंगूर	पहला उपयोग	फूल आने से पहले का चरण
	दूसरा उपयोग	फल लगने के समय
	तीसरा उपयोग	फल लगने के २० दिन बाद
सेब / प्लम / आडू / चेरी	पहला उपयोग	गहन विकास के समय
	दूसरा उपयोग	फल आने के समय
चाय	पहला उपयोग	पहले तेजी से पत्ती विस्तार पर
	दूसरा उपयोग	प्रत्येक तुड़ाई के बाद

खुराक: ५००-७५० मिली प्रति हेक्टेयर

अनुकूलता: इन्डोलाईजर लिक्विड कृषि उपयोग के अधिकांश कीटनाशी के साथ सुसंगत है। उपयोग से पहले संगतता की जांच की हमेशा अनुशंसा की जाती है।

भंडारण की स्थिति: मूल कंटेनर में सुरक्षित स्थान पर कसकर बंद रखें। सीधी धूप और ठंडे तापमान में भंडारण से बचें।

सावधानी: बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

प्राथमिक उपचार के उपाय: इस उत्पाद से जुड़े कोई विशिष्ट खतरे ज्ञात नहीं हैं, हालांकि त्वचा, आंखों और मुंह के अनावश्यक संपर्क से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आंखें: कम से कम १० मिनट पानी से अच्छी तरह से धोएं। यदि असुविधा बनी रहती है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। त्वचा: को पानी से अच्छी तरह धोएं। सभी संक्रमित कपड़ें हटा दें और दुबारा उपयोग से पहले धो लें। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। निगल लेने पर: पानी से अच्छी तरह से मुंह धोएं, चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। साँस द्वारा अंदर लेना: दूषित जगह से खुली हवा में ले जाएं। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

अस्वीकरण: चूंकि इस उत्पाद का उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है, हम उत्पाद की समान गुणवत्ता के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

Hindi

ઇન્ડોલાઇઝર
પ્રવાહી

સમુદ્રી સેવાળ અર્ક પર આધારિત બાયોસ્ટિમ્યુલન્ટ

ઇન્ડોલાઇઝર પ્રવાહી એક માઇક્રોબાયોલૉજી રિસર્ચ ઉત્પાદન છે જેને અનોખી પ્રક્રિયા દ્વારા સમુદ્રી સેવાળ અર્કમાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ એક આધુનિક ટેક્નોલૉજી ધરાવતી સંરચના છે જે વિવિધ પ્લાન્ટ પ્રોસેસીસને ઉત્તેજીત કરે છે અને છોડના વિકાસ અને ઉપજને વધારે છે.

ઘટકઃ

કુલ નક્કર સમાવિષ્ટ : સમુદ્રી સેવાળ અર્ક, હાઇડ્રોલાઇઝ્ડ પ્રોટિન્સ, ઍમિનો ઍસિડ્સઃ ૨૦.૦૦% ન્યૂન., જલીય સ્પષ્ટીકરણ, સ્ટેબિલાઇઝર્સ અને પ્રીઝર્વેટિવ્સઃ ૮૦.૦૦ અધિકતમ, **કુલઃ 100.00%**

વિવરણ

રંગઃ કાળાશ પડતું કથ્થઇ પ્રવાહી, ગંધઃ મરીન, કુલ ઘન : > ૨૦.૦%, pH : ૪.૦૦, સ્પેસિફિક ગ્રૅવિટી : ૧.૦ ગ્રામ/સીસી.

છંટકાવ માટેનું માર્ગદર્શન અને રીત

ફક્ત કૃષિ વપરાશ માટે જ છે. વાપરતાં પહેલાં બૉટલને સારી રીતે હલાવો. પાણીની ભલામણ કરેલી માત્રા ઉમેરીને હૅક્ટર દીઠ ૫૦૦-૭૫૦ મિલી. લેખે ઇન્ડોલાઇઝર પ્રવાહીને મંદ કરો.

પાક	છંટકાવ	સમય
ઘઉં	૧લો છંટકાવ	વાવણીના 30 દિવસો પછી
ડાંગર	૧લો છંટકાવ	ખેડાણ કરતી વખતે (ફેરરોપણી કર્યાના ૨૫-30 દિવસો પછી)
	૨જો છંટકાવ	પુષ્પગુચ્છો ફૂટવાના તબક્કે (ફેરરોપણી કર્યાના ૪૫-૬૦ દિવસો પછી)
	૩જો છંટકાવ	ચાપખા તબક્કે (ફેરરોપણી કર્યાના ૭૦-૮૫ દિવસો પછી)
કપાસ	૧લો છંટકાવ	સ્ક્વેર બન્યા પછી
	૨જો છંટકાવ	પ્રથમ છંટકાવના ૧૫ દિવસ પછી (મોર બેસે એ પહેલાં)
	૩જો છંટકાવ	બીજા છંટકાવના ૧૫ દિવસ પછી (જીંડવાં બને ત્યારે)
સોયાબીન	૧લો છંટકાવ	ફૂલ બેસે એ પહેલાંના તબક્કે
	૨જો છંટકાવ	ફલી બનવાના સમયે
શેરડી	૧લો છંટકાવ	રોપણીના ૪૫થી ૭૦ દિવસો પછી
	૨જો છંટકાવ	પ્રથમ છંટકાવના ૬ અઠવાડિયાઓ પછી
	૩જો છંટકાવ	બીજા છંટકાવના ૮ અઠવાડિયાઓ પછી
કેળાં	૧લો છંટકાવ	રોપણીના ૭૫ દિવસો પછી
	૨જો છંટકાવ	ફળ બેઠાં પછી ૧૨૫ દિવસે
શાકભાજી, મરચાં, ફ્લાવર, ટામેટાં, રીંગણાં, ગાજર, કોથમીર, કોબી	૧લો છંટકાવ	રોપણીના 30 દિવસો પછી
	૨જો છંટકાવ	રોપણીના ૬0 દિવસો પછી
ડુંગળી	૧લો છંટકાવ	વેજીટેટિવ તબક્કે (ફેરરોપણીના ૧૫-૨૦ દિવસો પછી)
	૨જો છંટકાવ	દડા બનવાના તબક્કે (ફેરરોપણીના 30-૩૫ દિવસો પછી)
	૩જો છંટકાવ	દડાના વિકાસના તબક્કે (ફેરરોપણીના ૬૫-૭૫ દિવસો પછી)
લસણ	૧લો છંટકાવ	૬-૮ પાન ફૂટે એ તબક્કે
	૨જો છંટકાવ	પ્રથમ છંટકાવના ૨ થી 3 અઠવાડિયાઓ પછી
બટાકાં	૧લો છંટકાવ	૬-૮ પાન ફૂટે એ તબક્કે
	૨જો છંટકાવ	પ્રથમ છંટકાવના ૪૦થી ૪૫ દિવસો પછી
દ્રાક્ષ	૧લો છંટકાવ	ફૂલો બેસે એ પહેલાંના તબક્કે
	૨જો છંટકાવ	ફળ બેસવાના સમયે
	૩જો છંટકાવ	ફળ બેસી ગયા પછી ૨૦ દિવસે
સફરજન/પ્લમ/ પીચ/ચૅરી	૧લો છંટકાવ	પ્રચંડ વિકાસના સમયે
	૨જો છંટકાવ	ફળ બેસવાના સમયે
ચા	૧લો છંટકાવ	પ્રથમ ઝડપથી પાન વિસ્તરે ત્યારે
	૨જો છંટકાવ	ચૂંટવાના પ્રત્યેક સમયે

માત્રાઃ પ્રતિ હૅક્ટર ૫૦૦-૭૫૦ મિલી

સુસંગતતાઃ ઇન્ડોલાઇઝર પ્રવાહી કૃષિમાં વપરાતાં મોટાભાગનાં કીટકનાશકો સાથે સુસંગત છે. હંમેશાં ભલામણ કરવામાં આવે છે કે વાપરતાં પહેલાં સુસંગતતા તપાસી લો.

સંગ્રહ કરવાની શરતોઃ આને અસલ ડબ્બામાં સલામત જગ્યાએ ઢાંકણાને ચુસ્તપણે બંધ કરીને રાખો. સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં અને થીજી જતાં તાપમાનમાં સંગ્રહ કરવાનું ટાળો.

સાવચેતીઃ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

પ્રાથમિક ઉપચારનાં પગલાંઃ આ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા કોઇ ચોક્કસ ખતરાઓ નથી, આમ છતાં, ત્વચા, આંખો અને મોં સાથેનો બિનઆવશ્યક સંસર્ગ ટાળો. આંખોઃ ઓછામાં ઓછી ૧૦ મિનિટ સુધી આંખોમાં પાણીની છાલક મારો. જો બેચેની ચાલુ રહે તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. ત્વચાઃ ત્વચાને પાણી વડે સારી રીતે ધોઇ નાંખો. દુષિત થયેલાં કપડાંને કાઢી નાંખો અને ફરી વાર પહેરતાં પહેલાં ધોઇ નાંખો. ઉગ્ર કિસ્સાઓમાં ડૉક્ટરી સલાહ લો. પેટમાં જાય તોઃ પાણી વડે સારી રીતે કોગળા કરીને મોં ધોઇ નાંખો. ડૉક્ટરની સલાહ લો. શ્વાસમાં જાય તોઃ દુષિત જગ્યામાંથી ખુલી હવામાં ખસેડો. ઉગ્ર કિસ્સાઓમાં ડૉક્ટરની સલાહ લો.

અસ્વીકૃતિઃ આ ઉત્પાદનનો વપરાશ અમારા નિયંત્રણની બહાર થતો હોવાથી અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તાને છોડીને કોઇ અન્ય જવાબદારી લેતાં નથી.

Gujarati

ਇੰਡੋਲਾਇਜ਼ਰ
ਲਿਕ੍ਵਿਡ

ਬਾਯੋਸਟਿਮੁਲੈਂਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਰਕ ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਇੰਡੋਲਾਇਜ਼ਰ ਲਿਕ੍ਵਿਡ ਇੱਕ ਮਾਇਕ੍ਰੋਬਾਯੋਲੋਜੀ ਰੀਸਰਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਟੇਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਤਮ ਪੌਦ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਕੁੱਲ ਠੋਸ ਯੁਕਤ : ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਰਕ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਇਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ : ੨੦% ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਲਮਈ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ, ਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਰੱਖਿਅਕ : ੮੦% ਅਧਿਕਤਮ, **ਕੁੱਲ : ੧੦੦.੦੦%**

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਰੰਗ : ਕਾਲਾ ਭੂਰਾ ਤਰਲ, ਸੁਗੰਧ : ਸਮੁੰਦਰੀ (ਮਰੀਨ), ਕੁੱਲ ਠੋਸ : > ੨੦.੦%, ਪੀਐਚ > ੪.੦੦,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਤਾ > ੧.੦ ਗ੍ਰਾਮ/ਸੀਸੀ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੀ :

ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ । ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ । ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡੋਲਾਇਜ਼ਰ ਲਿਕ੍ਵਿਡ ੫੦੦-੭੫੦ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟਰ ਨੂੰ ਘੋਲੋ ।

ਫਸਲ	ਇਸਤੇਮਾਲ	ਸਮਾਂ
ਕਣਕ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਬਿਜਾਈ ਦੇ ੩੦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਧਾਨ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਜੁਤਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ (੨੫-੩੦ ਡੀਏਟੀ-ਪ੍ਰਤਿਰੋਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ)
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਪੈਨਿਕਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ (੪੫-੬੦ ਡੀਏਟੀ)
	ਤਿਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ (੭੦-੮੫ ਡੀਏਟੀ)
ਕਪਾਹ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਗੋਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ੧੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ (ਖਿਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ)
	ਤਿਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਦੂਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ੧੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ (ਡੋਡੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ)
ਸੋਈਆਬੀਨ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫ਼ਲ ਆਉਣਾ
ਗੰਨਾ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਰੋਪਣ ਦੇ ੪੫ ਤੋਂ ੭੦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ੬ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
	ਤਿਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਦੂਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ੮ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਕੇਲਾ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਰੋਪਣ ਦੇ ੭੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫ਼ਲ ਆਉਣਾ ਦੇ ੧੨੫ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਿਰਚ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ, ਵਤਾਊਂ, ਗਾਜਰ, ਧਨੀਆ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਰੋਪਣ ਦੇ ੩੦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਰੋਪਣ ਦੇ ੬੦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਪਿਆਜ਼	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਬਨਸਪਤੀ ਅਵਸਥਾ (੧੫-੨੦ ਡੀਏਟੀ)
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਬਲਬ ਗਠਨ ਅਵਸਥਾ (੩੦-੩੫ ਡੀਏਟੀ)
	ਤਿਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਬਲਬ ਵਿਕਾਸ ਅਵਸਥਾ (੬੫-੭੫ ਡੀਏਟੀ)
ਲਸਣ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	੬ ਤੋਂ ੮ ਪੱਤਿ ਅਵਸਥਾ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ੨ ਤੋਂ ੩ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ
ਆਲੂ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	੬ ਤੋਂ ੮ ਪੱਤਿ ਅਵਸਥਾ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ੪੦ ਤੋਂ ੪੫ ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਅੰਗੂਰ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫ਼ਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
	ਤਿਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫ਼ਲ ਆਉਣ ਦੇ ੨੦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਸੇਬ / ਪਲਮ / ਆੜੂ / ਚੇਰੀ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਤੀਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਫ਼ਲ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਚਾਹ	ਪਹਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਪੱਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ
	ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ	ਹਰੇਕ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ

ਖੁਰਾਕ : ੫੦੦-੭੫੦ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਕਟਰ

ਅਨੁਕੂਲਤਾ : ਇੰਡੋਲਾਇਜ਼ਰ ਲਿਕ੍ਵਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : ਅਸਲ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ । ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ।

ਚੇਤਾਵਨੀ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਮਾਪਦੰਡ : ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤ੍ਵਚਾ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅੱਖਾਂ : ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੦ ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ । ਜੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ । ਤ੍ਵਚਾ : ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤ੍ਵਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ । ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਵੋ । ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ । ਨਿਗਲ ਲੀਤੇ ਜਾਉਣ ਤੇ : ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ । ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣ ਤੇ : ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ।

ਅਸਵੀਕਰਣ : ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ ।

Punjabi

ইণ্ডোলাইজার
তরল

সামুদ্রিক শৈবালের নির্যাস ভিত্তিক জৈবউদ্দিপক

ইণ্ডোলাইজার তরল হলো অনন্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামুদ্রিক শৈবালের নির্যাস থেকে আহরিত মাইক্রোবায়োলজী গবেষণা উৎপাদ। এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ফর্মুলেশন গাছের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলন সর্বাধিক করে।

সংমিশ্রণ :

সম্বলিত মোট সলিডস : সামুদ্রিক শৈবালের নির্যাস, দ্রবীভূত প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিডস : ২০.০০% ন্যূনতম, জলজ দ্রবীভূত, সুস্থিতকারী এবং সংরক্ষণমূলক পদার্থ : ৮০.০০% সর্বাধিক, **মোট : ১০০.০০%**

বৈশিষ্ট্যতা

রঙ : কালচে বাদামী তরল, গন্ধ : মেরিন, মোট সলিডস : > ২০.০%, pH : > ৪.০০, আপেক্ষিক গুরুত্ব : >১.০ গ্রাম/সিসি

প্রয়োগের নির্দেশ এবং পদ্ধতি

কেবলমাত্র কৃষিকার্যে ব্যবহারের জন্যে। ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। সুপারিশকৃত জলের পরিমাণ যুক্ত করার দ্বারা হেক্টর পিছু ৫০০-৭৫০ মিঃলিঃ হারে ইণ্ডোলাইজার লিকুইডের তরল করা বানান।

ফসল	প্রয়োগ	সময়
গম	১ম প্রয়োগ	বপনের ৩০ দিন পর
ধান	১ম প্রয়োগ	পাশকাঠির পর্যায়ে (রোপণের ২৫-৩০ দিন পর)
	২য় প্রয়োগ	শীষ ধরার পর্যায়ে (রোপণের ৪৫-৬০ দিন পর)
	৩য় প্রয়োগ	দুধধানের পর্যায়ে (রোপণের ৭০-৮৫ দিন পর)
তুলো	১ম প্রয়োগ	তুলোর কোষ ধরার পর
	২য় প্রয়োগ	প্রথম প্রয়োগের ১৫ দিন পর (প্রস্ফুটন-পূর্বক)
	৩য় প্রয়োগ	দ্বিতীয় প্রয়োগের ১৫ দিন পর (বোল গঠন)
সোয়াবিন	১ম প্রয়োগ	ফুলধরা-পূর্বক পর্যায়
	২য় প্রয়োগ	শুঁটি ধরার সময়
আখ	১ম প্রয়োগ	গাছ বসানোর ৪৫ থেকে ৭০ দিন পর
	২য় প্রয়োগ	প্রথম প্রয়োগের ৬ সপ্তাহ পর
	৩য় প্রয়োগ	দ্বিতীয় প্রয়োগের ৮ সপ্তাহ পর
কলা	১ম প্রয়োগ	গাছ বসানোর ৭৫ দিন পর
	২য় প্রয়োগ	ফল ধরার ১২৫ দিন পর
শাকসব্জী,লঙ্কা, ফুলকপি, টমেটো, বেগুন,গাজর, ধনিয়া, বাঁধাকপি	১ম প্রয়োগ	গাছ বসানোর ৩০ দিন পর
	২য় প্রয়োগ	গাছ বসানোর ৬০ দিন পর
পেঁয়াজ	১ম প্রয়োগ	বনস্পতির পর্যায়ে (রোপণের ১৫-২০ দিন পর)
	২য় প্রয়োগ	কন্দ ধরার পর্যায়ে (রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর)
	৩য় প্রয়োগ	কন্দের বিকাশের পর্যায়ে (রোপণের ৬৫-৭৫ দিন পর)
রসুন	১ম প্রয়োগ	৬-৮ পাতার পর্যায়ে
	২য় প্রয়োগ	প্রথম প্রয়োগের ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পর
আলু	১ম প্রয়োগ	৬-৮ পাতার পর্যায়ে
	২য় প্রয়োগ	প্রথম প্রয়োগের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর
আঙুর	১ম প্রয়োগ	ফুলধরা-পূর্বক পর্যায়ে
	২য় প্রয়োগ	ফল ধরার সময়ে
	৩য় প্রয়োগ	ফল ধরার ২০ দিন পর
আপেল/পাম/ পীচফল/চেরী	১ম প্রয়োগ	ব্যাপক বৃদ্ধির পর্যায়ে
	২য় প্রয়োগ	ফল ধরার সময়ে
চা-পাতা	১ম প্রয়োগ	প্রথম দ্রুত পাতার প্রসারণে
	২য় প্রয়োগ	প্রতি বার পাতা তোলার পর

মাত্রা : ৫০০-৭৫০ মিঃলিঃ প্রতি হেক্টর

সুসঙ্গততা : ইণ্ডোলাইজার লিকুইড কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বেশীরভাগ কীটনাশকের সঙ্গে সুসঙ্গত। ব্যবহারের পূর্বে সর্বদা সুসঙ্গততা পরীক্ষা করতে সুপারিশ করা হয়।

মজুতকরণের অবস্থাদি : নিরাপদ স্থানে অরিজিনাল কন্টেনারে এঁটে বন্ধ করে রাখবেন। সরাসরি রোদে এবং ফ্রীজিং তাপমাত্রায় মজুত করা এড়াবেন।

সাবধানতা : শিশুদের নাগালের বাইরে রাখবেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা : এই উৎপাদের সঙ্গে কোনও সুনির্দিষ্ট বিপদ জড়িত থাকা জানা নেই, তবুও ত্বক, চোখ এবং মুখের সঙ্গে অযথা সংস্পর্শ এড়ানোর সতর্কতা নিতেই হবে। চোখ : কমপক্ষে ১০ মিনিট ধরে জল দিয়ে ভালোভাবে ধোবেন। অস্বস্তি বজায় থাকলে মেডিক্যাল শরণাপন্ন করবেন। ত্বক : জল দিয়ে ভালোভাবে ত্বক ধোবেন। দূষিত পোশাক খুলে ফেলবেন এবং পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে কাচবেন। মারাত্মক ঘটনাদি ক্ষেত্রে মেডিক্যাল শরণাপন্ন করবেন। গলাধঃকরণ : জল দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধোবেন, মেডিক্যাল শরণাপন্ন করবেন। শ্বাসে যাওয়া : প্রকটতা থেকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নেবেন। মারাত্মক ঘটনাদি মেডিক্যাল শরণাপন্ন হবেন।

দাবিপরিত্যাগ : যেহেতু এই উৎপাদের ব্যবহার আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, সেহেতু উৎপাদের একসমান গুণমান ছাড়া অন্য কোনও দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না।

Bengali

INDOLIZER®
इन्डोलाईजर Liquid

Biostimulant
Based on Seaweed Extracts

Manufactured, Packed & Marketed by:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.

For maximizing crop potential

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Manufactured, Packed & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor,Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059.

Factory:
C/o. M/s. Utsavi AgriTech, Plot No. 3532,
GIDC Industrial Estate, Panoli,
Near Solvay Speciality India Pvt. Ltd.,
Taluka: Ankleshwar, District: Bharuch, Gujarat - 394 116.

उत्पादक, पैक और विपणनकर्ता:
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस
कल्पतरु स्क्वेअर, ४ थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (ईस्ट), मुंबई-४०० ०५९

फॅक्टरी
C/o. मेसर्स उत्सवी ॲग्रिटेक, प्लॉट नं. ३५३२,
जीआयडीसी इंडस्ट्रिअल इस्टेट, पानोली,
निअर सोलवे स्पेशालिटी इंडिया प्रा.लि.
तालुका-अंकलेश्वर • जिल्हा-भरूच, गुजरात-३९४ ११६

01.22

ইণ্ড'লাইজাৰ
লিকুইড

চিউইড নিৰ্য্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বায়'ষ্টিমুলাটেন্ট

ইণ্ড'লাইজাৰ লিকুইড হ'ল এক মাইক্ৰ'বায়'লজী গৱেষণা পণ্য যি সুকীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চিউইড নিৰ্য্যাসৰ পৰা আহিছে । ভিন্ন উদ্ভিদ প্ৰক্ৰিয়াক উত্তেজিত কৰিবলৈ আৰু উদ্ভিদ বিকাশ আৰু যান্ড অধিকতম কৰিবলৈ এক আগৱণুৱা প্ৰযুক্তিবিদ্যা ফৰ্মুলেশ্বন ।

গঠন :

কঠিওৱা মুঠ গোটা বস্তু : চিউইড নিৰ্য্যাস, হাইড্ৰ'লাইজড প্ৰটিনছ, আমিন' এচিডছ : ২০.০০% অতিকমেও, একুৱাছ ডিলুয়েন্টছ, ষ্টেবিলাইজাৰ আৰু প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ : ৮০.০০% অধিকতম, **মুঠ : ১০০.০০%**

বিশেষত্ব

ৰঙ : ব্লেকিশ্ব ব্ৰাউন লিকুইড, অ'ডাৰ : মেৰিন, মুঠ চলিড্ছ : >২০.০%, পিএইচ : > ৪.০০, বিশেষ গ্ৰেভিটী : > ১.০ গ্ৰাম / চিচি

পৰিচালনা আৰু প্ৰয়োগৰ পদ্ধতি

মাথো খেতিত ব্যৱহাৰৰ বাবে । ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে বটলটো ভালদৰে লৰাই লওঁক । পৰামৰ্শিত পানী ব্যৱহাৰ কৰি ৫০০- ৭৫০ মিলি প্ৰতি হেক্টৰত ইণ্ড'লাইজাৰ লিকুইডক তৰলীকৃত কৰক ।

শস্য	প্ৰয়োগ	সময়
ঘেঁহু	১ ম প্ৰয়োগ	সিঁচাৰ ৩০ দিন পিছত
ধান	১ ম প্ৰয়োগ	টিলাৰিং পৰ্য্যায়ত (ট্ৰান্সপ্লান্টিংৰ ২৫-৩০ ডিএটি-দিন পিছত)
	২ য় প্ৰয়োগ	পেনিকল আৰম্ভণি পৰ্য্যায়ত (৪৫- ৬০ ডিএটি)
	৩ য় প্ৰয়োগ	মিল্কিং পৰ্য্যায়ত (৭০- ৮৫ ডিএটি)
কঁপাহ	১ ম প্ৰয়োগ	স্কোৱাৰ তথ্যৰ পিছত
	২ য় প্ৰয়োগ	প্ৰথম প্ৰয়োগৰ ১৫ দিন পিছত (কলি ফুলাৰ আগতে)
	৩ য় প্ৰয়োগ	দ্বিতীয় প্ৰয়োগৰ ১৫ দিন পিছত (ব'ল তথ্য)
চয়াবিন	১ ম প্ৰয়োগ	ফুল ফুলাৰ আগতে
	২ য় প্ৰয়োগ	প'ড চেটিংৰ সময়ত
কুঁহিয়াৰ	১ ম প্ৰয়োগ	প্লান্টিংৰ ৪৫ ৰ পৰা ৭০ দিন পিছত
	২ য় প্ৰয়োগ	প্ৰথম প্ৰয়োগৰ ৬ সপ্তাহ পিছত
	৩ য় প্ৰয়োগ	দ্বিতীয় প্ৰয়োগৰ ৮ সপ্তাহ পিছত
কল	১ ম প্ৰয়োগ	প্লান্টিংৰ ৭৫ দিন পিছত
	২ য় প্ৰয়োগ	ফ্ৰুট চেটিংৰ ১২৫ দিন পিছত
পাচলি, জলকীয়া, ফুলকবি বিলাহী, বেঙেনা, গাজৰ, ধনিয়া, বন্ধাকবি	১ ম প্ৰয়োগ	প্লান্টিংৰ ৩০ দিন পিছত
	২ য় প্ৰয়োগ	প্লান্টিংৰ ৬০ দিন পিছত
পিয়াঁজ	১ ম প্ৰয়োগ	ভেজিটিভ পৰ্য্যায় (১৫-২০ ডিএটি)
	২ য় প্ৰয়োগ	বাল্ব তথ্য পৰ্য্যায় (৩০-৩৫ ডিএটি)
	৩ য় প্ৰয়োগ	বাল্ব উন্নতি পৰ্য্যায় (৬৫-৭৫ ডিএটি)
নহৰু	১ ম প্ৰয়োগ	৬-৮ পাত পৰ্য্যায়
	২ য় প্ৰয়োগ	প্ৰথম প্ৰয়োগৰ পিছত ২ ৰ পৰা ৩ সপ্তাহ
আলু	১ ম প্ৰয়োগ	৬-৮ পাত পৰ্য্যায়
	২ য় প্ৰয়োগ	প্ৰথম প্ৰয়োগৰ পিছত ৪০ ৰ পৰা ৪৫ দিন পিছত
আংগুৰ	১ ম প্ৰয়োগ	ফুল ফুলাৰ আগৰ পৰ্য্যায়
	২ য় প্ৰয়োগ	ফ্ৰুট চেটিংৰ সময়ত
	৩ য় প্ৰয়োগ	ফ্ৰুট চেটিংৰ ২০ দিন পিছত
আপেল / প্লাম / নৰ বগৰী / চেৰী	১ ম প্ৰয়োগ	তীব্ৰ বিকাশৰ সময়ত
	২ য় প্ৰয়োগ	ফ্ৰুট চেটিংৰ সময়ত
চাহ	১ ম প্ৰয়োগ	দ্ৰুতভাৱে পাতৰ প্ৰসাৰণৰ সময়ত
	২ য় প্ৰয়োগ	প্ৰতিবাৰ উঠোৱাৰ পিছত

মাত্ৰা : ৫০০- ৭০০ মিলি প্ৰতি হেক্টৰ

সামঞ্জস্যতা : ইণ্ড'লাইজাৰ লিকুইড অধিক কৃষিগতভাৱে ব্যৱহৃত কীটনাশকৰ লগত সামঞ্জস্য হয় । সদায় ব্যৱহাৰৰ আগতে সামঞ্জস্যতা পৰীক্ষা কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হয় ।

ভাণ্ডাৰিত কৰাৰ চৰ্তসমূহ : আচল কন্টেইনাৰটো ভালদৰে বন্ধ কৰি সুৰক্ষিত ঠাইত ৰাখিব লাগে । সূৰ্য্যৰ পোনপটীয়াকৈ পোহৰ পৰা ঠাই আৰু বৰফযুক্ত তাপমাত্ৰাত ৰাখিব নালাগে ।

সতৰ্কতা : শিশুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক ।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা : এই পণ্যৰ লগত জড়িত কোনো বিশেষ বিপদ নাই, তথাপিও ছাল, চকু আৰু মুখৰ সম্পৰ্কত অহাৰ পৰা বাছি অলাগতিয়াল যোগাযোগ হোৱাৰ পৰা সতৰ্কতাৰে বাছি থকা উচিত । চকু : অতিকমেও ১০ মিনিটৰ বাবে পানীৰে চকুযোৰ পখালি লওঁক । অশান্তি হৈ থাকিলে চিকিৎসাৰ সন্ধান কৰিব । ছাল : পানীৰে পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে ছালখন ধুই লওঁক । প্ৰদূষিত কাপোৰখিনি আঁতৰাওক আৰু ব্যৱহাৰৰ পূৰ্বে ধুই লওঁক । তীব্ৰতৰ ঘটনাত চিকিৎসীয় পৰামৰ্শৰ সন্ধান কৰক । যদি গিলা গৈছে : মুখখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে পানীৰে আখলি দিয়ক, চিকিৎসীয় পৰামৰ্শৰ সন্ধান কৰক । যদি উশাহত গৈছে : বিপদযুক্ত ঠাইৰ পৰা প্ৰভাৱিত ব্যক্তিগৰাকীক আঁতৰাওক আৰু ভালদৰে বায়ু প্ৰবাহিত হোৱা ঠাইলৈ লৈ যাওঁক । তীব্ৰতৰ ঘটনাত চিকিৎসীয় পৰামৰ্শৰ সন্ধান কৰক ।

দাবী পৰিত্যাগ : যিহেতু এই পণ্যৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত, পণ্যৰ ইউনিফৰ্ম গুণগত মানদণ্ডৰ বাহিৰে আমি ইয়াৰ বাবে কোনো দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'ব নোৱাৰো ।

Assameses

ଇଣ୍ଡୋଲାଇଜର
ତରଳ

ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ଆଧାରିତ ବାୟୋଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ

ଇଣ୍ଡୋଲାଇଜର ତରଳ ହେଉଛି ଏକ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକି ସଂରଚନା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ଗଛର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଧିକ ଅମଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ।

ସଂରଚନା

ସମୁଦାୟ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ରହିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ, ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜ୍ଡ ପ୍ରୋଟିନ, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ସ: ୨୦.୦୦% ସର୍ବନିମ୍ନ, ଜଳିୟ ମିଶ୍ରଣ, ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ଏବଂ ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍ : ୮୦.୦୦% ସର୍ବାଧିକ, **ସମୁଦାୟ : ୧୦୦.୦୦%**

ସ୍ପେଶିଫିକେସନ :

ରଙ୍ଗ : କଳା, ବାଦାମୀ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଗନ୍ଧ : ମେରାଇନ୍, ମୋଟ୍ କଠିନ ପଦାର୍ଥ : > ୨୦.୦%, ପିଏଚ୍ : > ୪.୦୦, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାନ୍ଦ୍ରତା : > ୧.୦ ଗ୍ରାମ୍/ ସିସି

ପ୍ରୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ

କେବଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ବୋତଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁପାରିଶକୃତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ଇଣ୍ଡୋଲାଇଜର ତରଳକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦-୭୫୦ ମିଲି ଅନୁସାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ।

ଫସଲ	ପ୍ରୟୋଗ	ସମୟ
ଗହମ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ବୁଣିବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ
ଧାନ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ପିଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ପ୍ରତିରୋପଣର ୨୫-୩୦ ଦିନ ପରେ)
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଶାଖା ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (୪୫-୬୦ ଲଗାଇବା ଦିନ ଠାରୁ)
	୩ୟ ପ୍ରୟୋଗ	କ୍ଷୀର ଢୋକିବା ସମୟରେ (୭୦-୮୫ ଲଗାଇବା ଦିନ ଠାରୁ)
କପା	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ବର୍ଗାକାର ସୃଷ୍ଟି ପରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗର ୧୫ ଦିନ ପରେ (ଫୁଲ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ)
	୩ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗର ୧୫ ଦିନ ପରେ (ବୋଲ୍ ଗଠନରେ)
ସୋୟାବିନ୍	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ଫୁଲ ଧରିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ମୁକୁଳ ଧାରଣ ସମୟରେ
ଆଖୁ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ରୋପଣର ୪୫ ରୁ ୭୦ ଦିନ ପରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗର ୬ ସପ୍ତାହ ପରେ
	୩ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗର ୮ ସପ୍ତାହ ପରେ
କଦଳୀ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ରୋପଣର ୭୫ ଦିନ ପରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଫଳ ଧାରଣର ୧୨୫ ଦିନ ପରେ
ପନିପରିବା, ଲଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଗାଜର, ଧନିଆଁ, ବନ୍ଧା କୋବି	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ରୋପଣର ୩୦ ଦିନ ପରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ରୋପଣର ୬୦ ଦିନ ପରେ
ପିଆଜ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ପତ୍ର ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (୧୫-୨୦ ଲଗାଇବା ଦିନ ଠାରୁ)
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ବଲ୍‌ବ ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (୩୦-୩୫ ଲଗାଇବା ଦିନ ଠାରୁ)
	୩ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ବଲ୍‌ବ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (୬୫-୭୫ ଲଗାଇବା ଦିନ ଠାରୁ)
ରସୁଣ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	୬-୮ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗର ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ
ଆଳୁ	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	୬-୮ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗର ୪୦ ରୁ ୪୫ ଦିନ ପରେ
ଅଙ୍ଗୁର	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ଫୁଲ ଧରିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଫଳ ଧାରଣ ସମୟରେ
	୩ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଫଳ ଧାରଣର ୨୦ ଦିନ ପରେ
ସେଓ/ପ୍ଲମ୍/ ପିଚ୍/ ଚେରି	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ଗଛର ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ଫଳ ଧାରଣ ସମୟରେ
ଚା	୧ମ ପ୍ରୟୋଗ	ପତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ
	୨ୟ ପ୍ରୟୋଗ	ପ୍ରତି ଥର ତୋଳିବା ପରେ

ମାତ୍ରା : ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦-୭୫୦ ମିଲି

ଉପଯୋଗୀତା : ଇଣ୍ଡୋଲାଇଜର ତରଳ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ତେବେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉପଯୋଗୀତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ।

ଭଣ୍ଡାରଣ ସ୍ଥିତି : ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ତାର ମୂଳ ପାତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇଟ୍ କରି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସାବଧାନତା : ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା : ଏହି ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଚର୍ମ, ଆଖି ଓ ପାଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି : ଅତି କମ୍‌ରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଛାଟି ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଚର୍ମ : ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଚର୍ମକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂଷିତ ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ : ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଟିକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ନାକ ବାଟେ ଚାଲିଗଲେ : ରୋଗୀକୁ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ।

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ : ଯେହେତୁ ଏହି ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦର ସମାନ ଗୁଣବତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଉ।

Oriya

ಇಂಡೊಲೈಝರ್
ಲಿಕ್ವಿಡ್

ಬೈಯೊಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸೀವೀಡ್ ಸತ್ವ.

ಇಂಡೊಲೈಝರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸೀವೀಡ್ ಸತ್ವಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಘಟಕಾಂಶ:

ಒಟ್ಟು ಘನವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಸೀವೀಡ್ ಸತ್ವಗಳು, ಹೈಡ್ರೊಲೈಜ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ಸ್‌ಫ಼ಿ, ಅಮಿನೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ : 20:00% ಕನಿಷ್ಟಫ಼ಿ, ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಡೈಲ್ಯುಯೆಂಟ್ಸ್‌ಫ಼ಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲೈಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಜರ್ವೇಟಿವ್ಸ್‌ಫ಼ಿ : 80:00% ಗರಿಷ್ಟಫ಼ಿ, **ಒಟ್ಟುಫ಼ಿ : 100.00%**

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ:

ಬಣ್ಣಫ಼ಿ: ಕಪ್ಪು ಕಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಸನೆ: ಮರಿನ್, ಒಟ್ಟು ಘನವಸ್ತುಫ಼ಿ: > 20.0%, ಪಿಎಚ್: > 4.00, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವಫ಼ಿ: > 1.0 ಗ್ರಾ೦/ಸಿಸಿ

ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ

ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರಫ಼ಿ. ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಟಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ಶಿಫಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೆರ್‌ಗೆ 500-750 ಮಿಲಿ ಇಂಡೊಲೈಝರ್ ದ್ರಾವಣ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಫ಼ಿ.

ಬೆಳೆ	ಬಳಕೆ	ಸಮಯ
ಗೋಽ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಬಿತ್ತನೆಯ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಭತ್ತ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ರೆಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯ ನಂತರದ 25-30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಹೂಗೊಂಚಲು ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯ ನಂತರದ 45-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
	3ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯ ನಂತರದ 70-85 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಹತ್ತಿ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ರೆಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಕಾಯಿ ಮೂಡಿದ ನಂತರ)
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆಯ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ)
	3ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಎರಡನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ)
ಸೋಯಾಬೀನ್	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ.
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕಬ್ಬು	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ನಾಟಿ ನಂತರದ 45 ರಿಂದ 70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆಯ 6 ವಾರಗಳ ನಂತರ
	3ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಎರಡನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯ 8 ವಾರಗಳ ನಂತರ
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ನಾಟಿಯ 75 ದಿನಗಳ ನಂತರ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಕಾಯಿ ಮೂಡಿದ 125 ದಿನಗಳ ನಂತರ
ತರಕಾರಿಗಳು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹೂಕೋಸು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಗಜ್ಜರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ,ಎಲೆಕೋಸು.	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ನಾಟಿಯ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ನಾಟಿಯ 60 ದಿನಗಳ ನಂತರ .
ಈರುಳ್ಳಿ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಎಲೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ).
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಗಡ್ಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯ 30-35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ).
	3ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (ನಾಟಿಯ 65-75 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	6 - 8 ಎಲೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆಯ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ .
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	6 - 8 ಎಲೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆಯ 40 ರಿಂದ 45 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ .
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಕಾಯಿ ಮೂಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ .
	3ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ.
ಸೇಬು/ಪ್ಲಮ್/ ಪೀಚ್/ಚೆರ್ರಿ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ .
ಚಹಾ	1ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಎಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ .
	2ನೇ ಸಿಂಪರಣೆ	ಪ್ರತಿ ಕಾಯಿ ಹರಿದ ನಂತರ.

ಪ್ರಮಾಣ : 500-750 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೆರ್‌ಗೆ

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ : ಇಂಡೊಲೈಝರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶರತ್ತುಗಳು : ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಕಂಟೇನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಇಡಿ.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರದ ಕ್ರಮಗಳು : ಈ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲಫ಼ಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ತ್ವಚೆ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳು: ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಿಫ಼ಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಫ಼ಿ. ತ್ವಚೆ: ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಫ಼ಿ. ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಳಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿ. ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿಫ಼ಿ: ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಫ಼ಿ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿಫ಼ಿ: ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿಫ಼ಿ. ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಘೋಷಣೆ: ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಏಕಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

Kannada

ఇండోలైజర్
లిక్విడ్

సముద్ర నాచు సారంపై ఆధారపడిన బయోస్టిమ్యులంట్

ఇండోలైజర్ లిక్విడ్ అనేది ప్రత్యేక ప్రక్రియ ద్వారా సముద్ర నాచు సారం నుంచి సంగ్రహించబడిన మైక్రోబయాలజీ పరిశోధన ఉత్పాదన. సాంకేతికంగా అధునాతనమైన ఫార్ములేషన్ వివిధ మొక్క ప్రక్రియలను ప్రేరేపిస్తుంది మరియు మొక్క వృద్ధి మరియు దిగుబడిని గరిష్టం చేస్తుంది.

మిశ్రమం:

మొత్తం ఘన పదార్థంలో ఉన్నవి : సముద్ర కలుపు సారం, హైడ్రోలైజ్డ్ ప్రొటీన్‌లు, అమినో యాసిడ్‌లు: 20.00 కనీసం, ఆక్వీయస్ డైల్యూయెంట్స్, స్టెబిలైజర్‌లు మరియు ప్రిజర్వేటివ్‌లు: 80.00% గరిష్టం, **మొత్తం: 100.00%**

స్పెసిఫికేషన్:

రంగు: నల్లని గోధుమరంగు లిక్విడ్, వాసన: సముద్రపు వాసన, మొత్తం ఘనపదార్థాలు: > 20.0%, పిహెచ్: > 4.00, నిర్దిష్ట గ్రావిటీ: > 1.0 గ్రా/సిసి.

వినియోగించే దిశ మరియు పద్ధతి

వ్యవసాయానికి మాత్రమే ఉపయోగించేందుకు. ఉపయోగించడానికి ముందు బాటిల్‌ని బాగా కుదపండి. ఇండోలైజర్ లిక్విడ్‌ని 500-750 మి.లీ/హెక్టారుకు సిఫారసు చేసిన పరిమాణం నీటిలో కలిపి ఉపయోగించండి.

పంట	వినియోగించుట	సమయం
గోధుమ	1వ వినియోగం	విత్తిన తరువాత 30 రోజులకు
వరి	1వ వినియోగం	పిలకల దశలో (నాటువేసిన తరువాత 25-30 రోజులకు)
	2వ వినియోగం	కంకులు ఏర్పడే దశలో (నాటువేసిన తరువాత 45-60 రోజులకు)
	3వ వినియోగం	పాలుపోసుకునే దశలో (నాటువేసిన తరువాత 70-85 రోజులకు)
ప్రత్తి	1వ వినియోగం	గూడ ఏర్పడిన తరువాత
	2వ వినియోగం	మొదటి వినియోగం తరువాత 15 రోజులకు (పూతకు ముందు)
	3వ వినియోగం	రెండవ వినియోగం తరువాత 15 రోజులకు (కాయ ఏర్పడినప్పుడు)
సోయాబీన్	1వ వినియోగం	పూత ముందరి దశలో
	2వ వినియోగం	కాయ సెట్ అయ్యే దశలో
చెరకు	1వ వినియోగం	మొక్కనాటిన తరువాత 45 నుంచి 70 రోజులకు
	2వ వినియోగం	మొదటి వినియోగం తరువాత 6 వారాలకు
	3వ వినియోగం	రెండవ వినియోగం తరువాత 8 వారాలకు
అరటి	1వ వినియోగం	మొక్కనాటిన తరువాత 75 రోజులకు
	2వ వినియోగం	పండు సెట్ అయిన తరువాత 125 రోజులకు
కూరగాయలు, మిరప, క్యాలీఫ్లవర్, టొమాటో, వంగ, క్యారట్, కొత్తిమీర, క్యాబేజ్	1వ వినియోగం	మొక్కనాటిన తరువాత 30 రోజులకు
	2వ వినియోగం	మొక్కనాటిన తరువాత 60 రోజులకు
ఉల్లి	1వ వినియోగం	పైరు దశలో (మొక్కనాటిన తరువాత 15-20 రోజులకు)
	2వ వినియోగం	ఉల్లిగడ్డ ఏర్పడే దశలో (మొక్కనాటిన తరువాత 30-35 రోజులకు)
	3వ వినియోగం	ఉల్లిగడ్డ ఊరే దశలో (మొక్కనాటిన తరువాత 65-75 రోజులకు
వెల్లుల్లి	1వ వినియోగం	6-8 ఆకుల దశలో
	2వ వినియోగం	మొదటి వినియోగం తరువాత 2 నుంచి 3 వారాలకు
బంగాళాదుంప	1వ వినియోగం	6-8 ఆకుల దశలో
	2వ వినియోగం	మొదటి వినియోగం తరువాత 40 నుంచి 45 రోజులకు
ద్రాక్ష	1వ వినియోగం	పూత ముందరి దశలో
	2వ వినియోగం	పండు సెట్ అయ్యే సమయంలో
	3వ వినియోగం	పండు సెట్ అయిన తరువాత 20 రోజులకు
యాపిల్/ప్లమ్/ పీచ్/చెర్రీ	1వ వినియోగం	ఎదుగుదల బాగా ఉన్న సమయంలో
	2వ వినియోగం	పండు సెట్ అయ్యే సమయంలో
తేయాకు	1వ వినియోగం	ఆకులు వేగంగా విస్తరించే ఆరంభంలో
	2వ వినియోగం	ప్రతి పంట కోత తరువాత

మోతాదు: ప్రతి హెక్టారుకు 500-750 మి.లీ

అనుకూలత: ఇండోలైజర్ లిక్విడ్ వ్యవసాయానికి ఉపయోగించే అత్యధిక పురుగుమందులకు అనుగుణ్యమైనది. ఉపయోగించడానికి ముందు అనుకూలతను పరీక్షించవలసిందిగా ఎల్లప్పుడూ సిఫారసు చేయబడుతోంది.

నిల్వ పరిస్థితులు: అసలు డబ్బాలో గట్టిగా మూతపెట్టి సురక్షితమైన చోట ఉంచండి. నేరుగా సూర్యరశ్మి మరియు చల్లని వాతావరణం ఉన్న చోట నిల్వ చేయకండి.

హెచ్చరిక: పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా ఉంచండి.

ప్రాథమిక చికిత్స చర్యలు: చర్మం, కళ్ళు మరియు నోటితో అనవసరంగా కాంటాక్టు అవ్వడాన్ని నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకోవలసి ఉన్నప్పటికీ, ఈ ఉత్పాదనతో ముడిపడివున్నాయని తెలిసిన నిర్దిష్ట ప్రమాదాలు లేవు. కళ్ళకు తగిలితే: కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కళ్ళకు బాగా నీళ్ళు చల్లుకోండి. అసౌకర్యం ఉంటే, డాక్టరును సంప్రదించండి. చర్మానికి తగిలితే: నీటితో శుభ్రంగా చర్మాన్ని కడగండి. మలినపడిన దుస్తులు విప్పేసి మళ్ళీ ధరించడానికి ముందు ఉతకండి. సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి. మింగితే: నీటితో నోరు బాగా కడగండి, డాక్టరును సంప్రదించండి. పీల్చితే: బహిరంగ గాలిలో ఎక్స్‌పోజర్ కాకుండా పక్కకు తీసుకెళ్ళండి. సమస్య తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్‌ని సంప్రదించండి.

డిస్‌క్లెయిమర్: ఈ ఉత్పాదనను ఉపయోగించడం మా నియంత్రణలో ఉండదు కాబట్టి, ఉత్పాదన నాణ్యత ఒకేలా ఉంటుందనడానికి మించి మేము ఇతరత్రా బాధ్యత తీసుకోము.

Telugu

இண்டோலைஸர்
திரவம்

கடற்பாசி சாறுகள் அடிப்படையிலான உயிர் ஊக்கி

இண்டோலைஸர் திரவம் ஒரு நுண்ணுயிரியல் ஆராய்ச்சி தயாரிப்பு ஆகும், இது தனித்துவமான செயல்முறை மூலம் கடற்பாசி சாறுகளிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். இது ஒரு மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப கலவை பலவிதமான தாவர செயல்முறைகளை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் தாவர வளர்ச்சியையும் மகசூலையும் அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

கலவை :

மொத்த திடத்தில் அடங்கிஉள்ளவை : கடற்பாசி சாறுகள், ஹைட்ரோலைஸ்டு புரதங்கள், அமினோ அமிலங்கள் : 20.00% குறைந்தபட்சம், அக்குவஸ் டைலுயன்ட்ஸ், ஸ்டெபிலைஸர்ஸ் மற்றும் பதப்படுத்திகள் : 80.00% அதிகபட்சம், **மொத்தம் : 100.00%**

விவரக்குறிப்புகள்

நிறம் : கருமையான பழுப்பு திரவம், மணம் : கடல் சார்ந்தது, மொத்த திடங்கள் : > 20.0%, pH : > 4.00, குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு : >1.0 gm/cc

பயன்பாட்டின் வழிமுறை மற்றும் விதம்

வேளாண் உபயோகத்திற்காக மட்டும். உபயோகிப்பதற்கு முன்பு பாட்டிலை நன்றாக குலுக்கவும். இண்டோலைஸர் திரவத்தை 500-750 மிலி ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு தண்ணீரை சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நீர்த்துக் கொள்ளவும்.

பயிர்	உபயோகம்	நேரம்
கோதுமை	முதல் தெளிப்பு	விதைத்த பிறகு 30 நாட்கள்
நெல்	முதல் தெளிப்பு	தூர் விட்ட நிலையில் (25-30 DAT - நடவுக்கு பிறகு நாட்கள்
	2வது தெளிப்பு	கதிர்விடும் நிலையில் (45-60 DAT)
	3வது தெளிப்பு	பால் பிடிப்பு நிலையில் (70-85 DAT)
பருத்தி	முதல் தெளிப்பு	மொக்கு உருவான பிறகு
	2வது தெளிப்பு	முதல் தெளிப்பிற்கு பிறகு 15 நாட்கள் (பூப்பதற்கு முன்)
	3வது தெளிப்பு	இரண்டாவது தெளிப்பிற்கு பிறகு 15 நாட்கள் (காய் பிடித்தல்)
சோயாபீன்	முதல் தெளிப்பு	பூ பூக்கும் முன் நிலை
	2வது தெளிப்பு	காய் பிடிக்கும் நேரத்தில்
கரும்பு	முதல் தெளிப்பு	நடவுக்கு பிறகு 45 முதல் 70 நாட்கள்
	2வது தெளிப்பு	முதல் தெளிப்புக்கு பிறகு 6 வாரங்கள்
	3வது தெளிப்பு	இரண்டாவது தெளிப்புக்கு பிறகு 8 வாரங்கள்
வாழை	முதல் தெளிப்பு	நடவுக்கு பிறகு 75 நாட்கள்
	2வது தெளிப்பு	காய் பிடிப்புக்கு பிறகு 125 நாட்கள்
காய்கறிகள், மிளகாய், கால்பிளவர், தக்காளி, கத்தரி, கேரட், கொத்மைமல்லி, முட்டைகோசு	முதல் தெளிப்பு	நடவுக்கு பிறகு 30 நாட்கள்
	2வது தெளிப்பு	நடவுக்கு பிறகு 60 நாட்கள்
வெங்காயம்	முதல் தெளிப்பு	தழை நிலை (15-20 DAT)
	2வது தெளிப்பு	குமிழ் உருவாகும் நிலை (30-35 DAT)
	3வது தெளிப்பு	குமிழ் வளர்ச்சி நிலை (65-75 DAT)
பூண்டு	முதல் தெளிப்பு	6 - 8 இலை நிலை
	2வது தெளிப்பு	முதல் தெளிப்பிற்கு பிறகு 2 முதல் 3 வாரங்கள்
உருளைக் கிழங்கு	முதல் தெளிப்பு	6 - 8 இலை நிலை
	2வது தெளிப்பு	முதல் தெளிப்பிற்கு பிறகு 40 முதல் 45 நாட்களில்
திராட்சை	முதல் தெளிப்பு	பூ பூக்கும் முன் நிலை
	2வது தெளிப்பு	காய் பிடிக்கும் நேரத்தில்
	3வது தெளிப்பு	காய் பிடிப்புக்கு பிறகு 20 நாட்கள்
ஆப்பிள்/பிளம்/ பீச்/செர்ரி	முதல் தெளிப்பு	தீவிர வளர்ச்சி நேரத்தில்
	2வது தெளிப்பு	காய் பிடிக்கும் நேரத்தில்
தேயிலை	முதல் தெளிப்பு	முதல் இலை வேகமாக விரிவடையும் நேரத்தில்
	2வது தெளிப்பு	ஒவ்வொரு பறித்தலுக்கு பிறகு

அளவு : 500-750 மிலி ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு

ஒத்திசையும்தன்மை : இண்டோலைஸர் திரவம் வேளாண்மைக்கு பயன்படும் பெரும்பாலான பூச்சிக்கொல்லிகளுடன் ஒத்திசையக்கூடியது. எப்போதும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு ஒத்திசையும் தன்மையை பரிசோதித்துக் கொள்ளும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் : அசல் கொள்கலனிலேயே இறுக்கமாக மூடி பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். நேரடி சூரிய வெளிச்சத்தில் மற்றும் உறையும் வெப்ப நிலையில் சேமித்து வைப்பதை தவிர்க்கவும்.

எச்சரிக்கை : குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் : தேவையின்றி சருமம், கண்கள் மற்றும் வாயில் படுவதை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாலும், இந்தத் தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய குறிப்பிட்ட தீங்குகள் ஏதும் அறியப்படவில்லை. கண்கள் : குறைந்தது 10 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் தண்ணீர் பாய்ச்சவும்.அசௌகரியம் தொடருமாயின் மருத்துவ உதவியை நாடவும். சருமம் : சருமத்தை தண்ணீர் கொண்டு நன்றாக கழுவவும். மாசுபட்ட ஆடையை நீக்கிவிடவும் மற்றும் மறுபடி உபயோகிக்கும் முன்பு துவைக்கவும். கடுமையான நிலைகளில் மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

உட்கொள்ளப்பட்டிருந்தால் : தண்ணீர் கொண்டு வாயை நன்றாக கழுவவும், மருத்துவ உதவியை நாடவும். உட்சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால் : பாதிக்கப்பட்ட நபரை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும். தீவிரமான நிலைகளில் மருத்துவ உதவியை நாடவும்.

பொறுப்பு துறப்பு : இந்தத் தயாரிப்பை பயன்படுத்துவது எமது கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பால் இருப்பதால், இந்தத் தயாரிப்பின் சீரான தரத்தைத் தவிர நாங்கள் வேறு எதற்கும் பொறுப்பு ஏற்பதில்லை.

Tamil

ഇൻഡോലൈസർ
ലിക്വിഡ്

കടൽപ്പായൽ സത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബയോസ്റ്റിമുലന്റ്

ഇൻഡോലൈസർ ലിക്വിഡ്, സവിശേഷമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടൽപ്പായൽ സത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോബയോളജി ഗവേഷണ ഉൽപ്പന്നമാണ്. വിവിധ സസ്യ പ്രക്രിയകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെടികളുടെ വളർച്ചയും വിളവും പരമാവധിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്.

ഘടന:

മൊത്തം സോളിഡിൽ അടങ്ങിയത്: കടൽപ്പായൽ സത്ത്, ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീനുകൾ, അമിനോ ആസിഡുകൾ: 20.00% മിനിമം., അക്വയസ്ഡൈല്യൂയന്റുകൾ, സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ, പ്രിസർവേറ്റിവുകൾ: 80.00% മാക്സിമം, ആകെ: 100.00%

സവിശേഷതകൾ

നിറം: കറുപ്പ് കലർന്ന തവിട്ട് ദ്രാവകം, ഗന്ധം: കടൽ, മൊത്തം ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ: > 20.0%, വിഎച്ച്: > 4.00, സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി: > 1.0 ഗ്രാം/സിസി

പ്രയോഗ രീതിയും നിർദ്ദേശവും

കാർഷിക ഉപയോഗത്തിന് മാത്രം. ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുപ്പി നന്നായി കുലുക്കുക. ഇൻഡോലൈസർ ലിക്വിഡ് ഹെക്ടറിന് 500-750 മില്ലി എന്ന തോതിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അളവ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക

വിള	പ്രയോഗം	സമയം
ഗോതമ്പ്	1-മത്തെ പ്രയോഗം	വിതച്ച് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
നെല്ല്	1-മത്തെ പ്രയോഗം	കതിരിടുന്ന ഘട്ടം (25-30 ഡിഎടി-പറിച്ചു നടീലിനു ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ)
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	കതിരു പുറത്തു വരുന്ന സമയം (45-60 ഡിഎടി
	3-മത്തെ പ്രയോഗം	പാൽ വയ്ക്കുന്ന സമയം (70-85 ഡിഎടി)
പരുത്തി	1-മത്തെ പ്രയോഗം	മൊട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയ ശേഷം
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	ആദ്യ പ്രയോഗത്തിനു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് (പൂ വിരിയുന്നതിനു മുമ്പ്)
	3-മത്തെ പ്രയോഗം	രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗത്തിനു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് (ബോൾ ഫോർമേഷൻ)
സോയാബീൻ	1-മത്തെ പ്രയോഗം	പൂവിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	കായപിടിക്കുന്ന സമയത്ത്
കരിമ്പ്	1-മത്തെ പ്രയോഗം	നട്ട് 45 മുതൽ 70 ദിവസം വരെ
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	ആദ്യ പ്രയോഗത്തിന്റെ 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ്
	3-മത്തെ പ്രയോഗം	രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗത്തിന് 8 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ്
വാഴപ്പഴം	1-മത്തെ പ്രയോഗം	നടീലിനു ശേഷം 75 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	കുലച്ച് 125 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
പച്ചക്കറികൾ, മുളക്, കോളിഫ്ലവർ, തക്കാളി, വഴുതന കാരറ്റ്, മല്ലി, കാബേജ്	1-മത്തെ പ്രയോഗം	നട്ട് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	നട്ട് 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
ഉള്ളി	1-മത്തെ പ്രയോഗം	ഇലവളരുന്ന ഘട്ടം (15-20 ഡിഎടി)
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	ഉള്ളി രൂപീകരണ ഘട്ടം (30-35 ഡിഎടി)
	3-മത്തെ പ്രയോഗം	ഉള്ളി വളരുന്ന ഘട്ടം (65-75 ഡിഎടി)
വെളുത്തുള്ളി	1-മത്തെ പ്രയോഗം	6 – 8 ഇല ഘട്ടം
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	ആദ്യ പ്രയോഗത്തിന് 2 -3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ്
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്	1-മത്തെ പ്രയോഗം	6 – 8 ഇല ഘട്ടം
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	ആദ്യ പ്രയോഗത്തിന് 40 -45 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
മുന്തിരി	1-മത്തെ പ്രയോഗം	പൂവിടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	കഫയ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്
	3-മത്തെ പ്രയോഗം	കായ പിടിച്ച് 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
ആപ്പിൾ / പ്ലം / പീച്ച് / ചെറി	1-മത്തെ പ്രയോഗം	തീവ്രമായ വളർച്ചയുടെ സമയത്ത്
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	കായ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്
തേയില	1-മത്തെ പ്രയോഗം	ദ്രുതഗതിയിൽ ഇല വളരുമ്പോൾ
	2-മത്തെ പ്രയോഗം	ഓരോ പിക്കിംഗിനും ശേഷം

ഡോസേജ്: ഒരു ഹെക്ടറിന് 500–750 മില്ലി

അനുയോജ്യത: ഇൻഡോലൈസർ ലിക്വിഡ് കാർഷികാവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക കീടനാശിനികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുയോജ്യത പരിശോധിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ: സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് മുറുക്കി അടച്ച യഥാർത്ഥ കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിലും തണുത്തുറഞ്ഞ താപനിലയിലും സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

മുന്നറിയിപ്പ്: കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

പ്രഥമശുശ്രൂഷാ നടപടികൾ: ഈ ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നിരുന്നാലും ചർമ്മം, കണ്ണുകൾ, വായ എന്നിവയുമായി അനാവശ്യ സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. കണ്ണുകളിൽ ആയാൽ : കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റെങ്കിലും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി നനയ്ക്കുക. അസ്വസ്ഥത തുടരുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക. ചർമ്മം: ചർമ്മം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകുക. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കിയ ശേഷം കഴുകുക. രൂക്ഷമായ കേസുകളിൽ വൈദ്യസഹായം നേടുക. കഴിച്ചാൽ: വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വായ നന്നായി കഴുകുക, വൈദ്യസഹായം നേടുക. ശ്വസിച്ചാൽ: പദാർത്ഥം ശ്വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തുറന്ന വായുവിലേക്ക് ആളെ നീക്കുക. കഠിനമായ കേസുകളിൽ വൈദ്യസഹായം നേടുക.

നിരാകരണം: ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായതിനാൽ, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഏകീകൃത ഗുണനിലവാരമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

Malayalam

اِنــــڈولائـــزر
لکـویـڈ

سمندری ویڈ کے نچوڑ پر مبنی بائیواسٹیمولینٹ

انڈولانزر لـکـویڈ ایک مائیکروبائیولوجی ریسرچ پروڈکٹ ہے جو انوکھے پروسیس کے ذریعے سمندری ویڈ کے نچوڑ سے ماخوذ ہے۔ پودوں کے بہت سے پروسیس کو اُبھارنے کیلئے اور پودوں کی نشوونما اور پیداوار کو بڑھانے کیلئے ایک جدید ٹیکنالوجی والا فارمیولیشن۔

اجزائے ترکیبی:

مکمل ٹھوس اجزاء: سمندری ویڈ کا نچوڑ، ہائیڈرولائزڈ پروٹینس، امینو ایسڈس : 20.00% کم سے کم، ایکیوس ڈائیلوئینٹس، اسٹیبلائزرس اور حفاظتی مادّے : 80.00% زیادہ سے زیادہ، **کُل : 100.00%**۔

خاصیت

رنگ: سیاہ رنگ والا بھورا لکویڈ، خوشبو: میرین، کُل سولڈس : 20.0%<، پی ایچ : 4.00<،

مخصوص گریویٹی : 1.0< جی ایم / سی سی

استعمال کی ہدایت اور طریقہ

صرف زراعتی استعمال کیلئے۔ استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں۔ سفارش کردہ پانی کی مقدار میں فی ایکڑ 500 تا 750 ملی لیٹر انڈولانزر لکویڈ ملاتے ہوئے اُس کا گھول بنا لیں۔

فصل	استعمال	وقت
گیہوں	پہلا استعمال	بوائی کے 30 دنوں بعد
دھان	پہلا استعمال	کھیتی باڑی کے مرحلے میں (25 تا 30 ڈی اے ٹی - ٹرانسپلانٹنگ کے دنوں کے بعد
	دوسرا استعمال	چھوٹے گچھے کی شروعات کے مرحلے پر (45 تا 60 ڈی اے ٹی)
	تیسرا استعمال	دودھی مرحلے پر (70 تا 85 ڈی اے ٹی)
کپاس	پہلا استعمال	مربع تشکیل کے بعد
	دوسرا استعمال	پہلے استعمال کے 15 دنوں بعد (پھول کھِلنے سے پہلے)
	تیسرا استعمال	دوسرے استعمال کے 15 دنوں بعد (بیل کی تشکیل)
سویابین	پہلا استعمال	پھول آنے کے مرحلے سے قبل
	دوسرا استعمال	پھلی کی ترتیب کے وقت پر
گنا	پہلا استعمال	پودا لگانے کے 45 تا 70 دنوں بعد
	دوسرا استعمال	پہلے استعمال کے 6 ہفتوں بعد
	تیسرا استعمال	دوسرے استعمال کے 8 ہفتوں بعد
کیلا	پہلا استعمال	پودا لگانے کے 75 دنوں بعد
	دوسرا استعمال	پھل کی ترتیب کے 125 دنوں بعد
سبزیاں، مرچ، گوبھی، ٹماٹر، بینگن، گاجر، ہری دھنیا بند گوبھی	پہلا استعمال	پودا لگانے کے 30 دنوں بعد
	دوسرا استعمال	پودا لگانے کے 60 دنوں بعد
پیاز	پہلا استعمال	ویجیٹیٹیو مرحلہ (15 تا 20 ڈی اے ٹی)
	دوسرا استعمال	بلب کی تشکیل کا مرحلہ (30 تا 35 ڈی اے ٹی)
	تیسرا استعمال	بلب کے ارتقاء کا مرحلہ (65 تا 75 ڈی اے ٹی)
لہسن	پہلا استعمال	6 تا 8 پتے کا مرحلہ
	دوسرا استعمال	پہلے استعمال کے 2 تا 3 ہفتوں بعد
آلو	پہلا استعمال	6 تا 8 پتے کا مرحلہ
	دوسرا استعمال	پہلے استعمال کے بعد 40 تا 45 دنوں پر
انگور	پہلا استعمال	پھول آنے سے قبل کا مرحلہ
	دوسرا استعمال	پھلوں کی ترتیب کے وقت پر
	تیسرا استعمال	پھلوں کی ترتیب کے 20 دنوں بعد
سیب / آلو بخارہ / آڑو / چیری	پہلا استعمال	شدید نشوونما کے وقت پر
	دوسرا استعمال	پھلوں کی ترتیب کے وقت پر
چائے	پہلا استعمال	پتّوں کی پہلی تیز توسیع پر
	دوسرا استعمال	ہر بار توڑنے پر

مقدار : 500 تا 750 ملی لیٹر فی ایکڑ

مطابقت: انڈولانزر لکویڈ زراعتی طور پر زیادہ تر استعمال کئے جانے والے جراثیم کُش کے ساتھ مطابقت والا ہے۔ اس بات کی ہمیشہ سفارش کی جاتی ہے کہ استعمال سے مطابقت ہونے کی جانچ کرلی جائے۔

ذخیرہ اندوزی کی شرائط: اصل کنٹینر میں مضبوطی کے ساتھ بند کرکے محفوظ مقام پر رکھیں۔ سورج کی براہ راست روشنی اور ٹھنڈ والے ٹمپریچر میں رکھنے سے بچائیں۔

انتباہ: بچوں کی پہونچ سے دور رکھیں۔

ابتدائی تدارک کے اقدامات: اس پروڈکٹ سے منسلک کوئی مخصوص خطرات تو نہیں ہیں، حالانکہ جلد، آنکھوں اور منھ سے غیرضروری رابطے سے بچانے کیلئے احتیاطیں برتنی چاہئے۔ آنکھیں: کم سے کم 10 منٹوں تک پانی سے اچھی طرح بھگوئیں۔ اگر تکلیف پھر بھی رہتی ہے تو طبی تدارک حاصل کریں۔ جلد: جلد کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ آلودہ کپڑے اُتار دیں اور دوبارہ استعمال سے پہلے انہیں دھولیں۔ تشویشناک معاملات میں طبی تدارک حاصل کریں۔ پیٹ میں اُتر جانا: منھ کو پانی سے اچھی طرح دھوئیں، طبی تدارک حاصل کریں۔ سانس کے ذریعے اندر چلے جانا: رابطے والی جگہ سے کھلی ہوا والی جگہ پر آجائیں۔ تشویشناک معاملات میں طبی توجہ حاصل کریں۔

قانونی دستبرداری: چونکہ اس پروڈکٹ کا استعمال ہمارے قابو سے باہر ہے، اس لئے ہم پروڈکٹ کے ایک جیسے معیار کے علاوہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں۔

Urdu