KILLOG®

PYRAZOSULFURON ETHYL 10% WP

(Systemic Herbicide)

Pyrazosulfuron ethyl [ethyl-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl-carbamoyl sulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate] is a selective, systemic and pre emergence herbicide which effectively controls the various weeds of transplanted rice.

Recommendation

Crop (s)	Name of weed species	Dosage/HA		Dilution in Water (L)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		AI (kg)	Formulation (kg)		
Transplanted Rice	Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis	0.01-0.015	0.1-0.15	500-600	95

Direction of Use : Method of Application : As per the recommendation, mix the herbicide and water at right dosage and spray. Spray by using high volume sprayer, viz. Knapsack sprayer fitted with herbicide nozzel. Use 500 to 600 litres of water per hectare. Before spraying the herbicide, it's suspension should be mixed thoroughly with a wooden log

Time of Application : Spray should be given, before emergence of weeds, at three to seven days after transplanting of rice.

Precaution : Do not mix with bare hands. Use a wooden stick for stirring during preparation of spray mixtures. Avoid breathing concentrate or spray mist. Avoid skin contact, keep away from foodstuff and animal feed. Use protective clothings such as full trouser, full sleeve shirt, cap, boots, goggles, handgloves, apron and face shield. Do not chew, eat, drink or smoke during application. Wash hands with soap and water, after use. Change the contaminated clothes. Destroy empty containers after use.

Symptoms of Poisoning : Respiratory distress, abnormal movement, convulsion may occur. Eye contact may initially cause eye irritation with discomfort, tearing or blurring of vision, Repeated dermal exposures may lead to skin irritation with discomfort or rash.

First Aid : Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. Remove contaminated clothes. If eyes are contaminated, flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes and refer to doctor. In case of poisoning by ingestion, victim should be induced to vomit by giving tablespoon of salt in warm water. Repeat till vomit fluid is clear. If necessary , give gastric lavage with 5% sodium bicarbonate solution. In emergency take the patient to the nearest hospital.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically and supportively.

Disposal Of Used Container : 1.Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2.The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 3.Packages should be broken and buried away from habitation or source of water.

Storage Conditions :1.The packages containing herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides. 2.The rooms or premises meant for storing herbicides shall be well-built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Pyrazosulfuron ethyl Technical	(Purity 97%)	10.309% min.
(Sodium salt of Lignosulphonic acid)	Wetting agent	2.000% max.
(Aryl sulphonic acid formaldehyde condensate)	Dispersing agent	5.000% max.
(Welson-S)	Inert filler	82.691% max.
Total		**100.000% w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.

English

किलॉग

पाईराज़ोसल्फ्युरान ईथाईल १०% घुलनशील चूर्ण

(अंतर्प्रवाही खरपतवारनाशक)

पाईराजोसल्फ्युरान ईथाईल [ईथाईल-५-{४,६-डायमिथोक्सी पायरीमिडीन-२-इलकारबामाईल सल्फामईल}-१-मिथाईल पाईराजोल-४-कारबोक्सिलेट] एक चुनिंदा, अन्तर्वाही एव अग्रीम उदभवोपरान्त खरपतवारनाशक है, जो रोपित धान के खरपतवारों को असरदार ढंग से नियंत्रण करता है ।

उपयोग

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनो में)
		स. तत्व (कि.ग्रा.)	संरचना (कि. ग्रा.)		
रोपित धान	सायपरस इरिया (छतरीवाला मोथा), सायपरस डिफारमिस (मारफला), फिम्ब्रीसटायलिस मिलीएशिया (बोगी), मोनोकोरिया वैजिनेलिस, लुडविजिया परविफ्लोरा (महानली)	0.01-0.015	0.1-0.15	500-600	95

उपयोग के लिए निर्देश : संस्तुति अनुसार, उचित मात्रा में दवा और पानी का अच्छी तरह मिश्रण कर, उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र (नैपसैक स्प्रेयर) खरपतवार युक्त नोजल, द्वारा छिड़काव करें । एक हेक्टर में ५०० से ६०० लीटर पानी का उपयोग करें । किसी स्थान पर दोहरा छिड़काव न करें ।

प्रयोग का समय : खरपतवारनाशक का छिड़काव खरपतवार उगने से पहले तथा धान रोपने के बाद तीन से सात दिनों के अंदर करें ।

प्रयोगकर्ताओ के लिए सावधानियां : दवा को नंगे हाथों से न मिलायें । इसे एक लकडी की डडी द्वारा मिलायें । इस खरपतवारनाशक को न ही सूंघे और न ही स्पर्श करें । इस खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ तथा पशु आहार से दूर रखें । दवा को उपयोग में लाते समय टोपी, दस्ताने, जूते, चश्मा, सम्पूर्ण शरीर को ढकने वाले कपडे इत्यादि पहनें । उपयोग के समय खाना, पीना तथा धुम्रपान करना मना है । इसके उपयोग पश्चात हाथों को साबुन और पानी से धोयें । दूषित कपडों को बदल डालें । उपयोग पश्चात खाली डिब्बों को नष्ट कर दें ।

विष के लक्षण : साँस लेने में तकलीफ, लडखडाना, ऐंठन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं । आँख के सम्पर्क मे आने से आंसू आना तथा धुंधला दिखाई दे सकता है । बार बार चर्म के सम्पर्क से जलन एवं खुजली हो सकती है ।

प्राथमिक चिकित्सा : रोगी को खुली हवा मे लाये । यदि विष, निगल लिया गया हो तो रोगी को नमक युक्त उष्ण पानी पिलायें और उल्टी करा कर पेट साफ करें । आवश्यकता पड़ने पर सोडियम बाईकारबोनेट द्वारा पेट साफ करे । दूषित त्वचा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोयें और दूषित कपडों को बदल डालें । आँखों में चला गया हो तो आँखे स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोये अथवा तुरन्त डॉक्टर को बुलायें । आवश्यकता पडने पर रोगी को निकट के अस्पतालय में ले जाएं ।

विष नाशक : कोई खास विषनाशक उपलब्ध नही है । लक्षणानुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों, बची हुई दवा को ध्यानपूर्वक नष्ट करें, जिससे की वातावरण या पानी का स्त्रोत दूषित न हो । २. खरपतवारनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को, पुन:उपयोग के लिए बाहर न छोडें । ३. खाली डिब्बों को नष्ट कर, आबादी से दूर जमीन में गाड दें ।

संग्रहण की शर्तें : १. खरपतवारनाशक डिब्बों का भंडारण, अलग कमरा या जगह या ऐसी जगह जहाँ अन्य वस्तु भडारण न हो अथवा ताला बन्द अलमारियों में करें । खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ से दूर रखें । २. खरपतवारनाशक के भडारण की जगह अच्छी तरह बनी हो, शीतल, शुष्क और हवादार हो तथा पर्याप्त लम्बी व चौड़ी हो, जैसे की वाष्प द्वारा प्रदूषण होने का डर न रहे ।

रासायनिक संरचना :

पाईराजोसल्फ्युरान ईथाईल टेक्निकल	(शुद्धता १७.०%)	१०.३०१% न्यू.
(लिगनोसल्फोनेट के सोडियम साल्टस)	वेटिंग एजंट	२.०००% अधि.
(अरिल सल्फोनिक एसिड आफ फोरमलडिहाईड कन्डेनसेट)	डिसपर्सिंग एजंट	५.०००% अधि.
(वेसलोन -एस)	ईनर्ट फिलर	८२.६९१% अधि.
योग		**१००.०००% भार/भार**

चेतावनी : इस लेबल / पत्रिका पर निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें ।

Hindi

કીલૉગ

પાયરાઝોસલ્ફ્યૂરોન ઈથાઈલ ૧૦% ડબ્લ્યૂપી

(આંતરપ્રવાહી નિંદામણ નાશક)

પાયરાઝોસલ્ફ્યૂરોન ઇથાઇલ ૧૦% ડબ્લ્યુપી (ઇથાઇલ-૫(૪,૬-ડાયમિથોક્સીપાઇરિમિડાઇન-૨-વાયએલ-કાર્બોમોઇલ સલ્ફામોઇલ)-૧ મિથાઇલપાઇરાઝોલ-૪-કાર્બોક્ઝિલેટ) એક પસંદગીયુક્ત આંતરપ્રવાહી અને પ્રી-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક છે, જે ફેરરોપણી કરેલા ડાંગરમાં ઊગી નીકળતાં વિવિધ નીંદણનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરે છે.

ભલામણો

પાક (ક્રો)	નીંદણ નું નામ	માત્રા/હેક્ટર		પાણીમાં મંદતા (લી.)	અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષા-ગાળો (દિવસો)
		સ.ત. (કિગ્રા)	ફॉર્મ્યૂલેશન (કિગ્રા)		
ફેરરોપણી કરેલ ડાંગર	સાયપેરસ ઈરિયા, સાયપેરસ ડિફૉર્મિસ, ફિમ્બ્રિસ્ટીલિસ મિલિઆસીઆ, લુડવિગીઆ પાર્વિફ્લોરા,મોનોકોરિયા વજીનેઇલ્સ	૦.૦૧-૦.૦૧૫	૦.૧-૦.૧૫	૫૦૦-૬૦૦	૯૫

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન: વપરાશની રીતઃ ભલામણ કર્યા મુજબ, નીંદણનાશક અને પાણીને યોગ્ય માત્રામાં ભેળવો અને છંટકાવ કરો. હાઇ વૉલ્યુમ સ્પ્રે જેમ કે નેપસેક સ્પ્રેયર કે જેમાં હર્બિસાઇડ નાળચું બેસાડેલું હોય. પ્રતિ હેક્ટર ૫૦૦થી ૬૦૦ લીટર પાણી વાપરો. નીંદણનાશકનો છંટકાવ કરતાં પહેલાં એના દ્રાવણને લાકડી વડે સારી રીતે હલાવીને ભેળવવું જોઇએ.

વપરાશ કરવા માટેનો સમયઃ ડાંગરની ફેરરોપણી કર્યાના ત્રણથી સાત દિવસો પછી, નીંદણ ઊગી નીકળે એ પહેલાં છંટકાવ કરવો જોઇએ.

સાવધાની: ખુલ્લા હાથ વડ ભેળવશો નહીં. છંટકાવનું દ્રાવણ બનાવતી વખતે ભેળવતી વખતે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. દ્રાવણને અથવા છંટકાવના સૂક્ષ્મ કણોને શ્વાસમાં જવા ના દેશો. ત્વચા સાથેનો સંસર્ગ ટાળો. ખાદ્યપદાર્થો અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. શરીરને રક્ષણ આપતાં કપડાં જેવાં જે આખું પાટલુન, આખી બાયનું શર્ટ, ટોપી, બૂટ, ગૉગલ્સ, હાથમોજાં, ઍપરોન અને બુકાની પહેરો. છંટકાવ કરતી વખતે ચાવશો, ખાશો, પીશો કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. છંટકાવ પતી ગયાં પછી સાબુ અને પાણી વડે હાથ ધોઈ નાંખો. દુષિત કપડાંને બદલી નાંખો. વપરાશ પછી ખાલી પૅકેજોનો નાશ કરો.

ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોઃ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, અસાધારણ હલનચલન, આંચકી આવી શકે છે. આંખમાં જવા પર શરૂઆતમાં આંખમાં નાંખમાં બળતરા, બેચેની, આંસુ અથવા ઝાંખપ જેવાં લક્ષણો નજરે પડી શકે છે. ત્વચા પર વારંવાર લાગવાથી બળતરા, બેચેની અથવા અળાઈ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો, દુષિત ત્વચાને પુષ્કળ સાબુ અને પાણી વડે ધોઈ નાંખો. દુષિત કપડાંને કાઢી નાંખો. જો આંખમાં જાય તો ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી આંખોમાં પાણીની છાલક મારીને આંખોને ધોઈ નાંખો અને ડૉક્ટરની સલાહ લો. જો પેટમાં જવા પર ઝેર ચઢે તો દરદીને હઝફાળા પાણીમાં એક ચમચો મીઠું નાંખીને પીવડાવીને ઉલટી કરાવડાવો. જ્યાં સુધી ઉલટીમાં ઝેર પૂરેપૂરું બહાર ના નીકળી જાય ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવતાં રહો. જો જરૂર લાગે તો ૫% સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ સૉલ્યુશન વડે ગૅસ્ટ્રિક લવાજ આપો. કટોકટીની પળોમાં દરદીને નજીકની હૉસ્પિટલમાં ખસેડો.

ઝેરનું મારણઃ કોઈ ખાસ મારણ નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

વપરાયેલાં પૅકેજોનો નિકાલઃ ૧. પૅકેજો અથવા વધેલા દ્રાવણ અને મશીનો તથા પાત્રોના ધોવાણનો નિકાલ એવી સુરક્ષિત રીતે કરો કે જેથી પર્યાવરણ કે પાણી પ્રદુષિત ના થાય. ૨. વાપરેલાં પૅકેજોનો ફરી વાર ઉપયોગ થતો ટાળવા માટે એને બહાર રઝળતાં ના છોડશો. ૩. પૅકેજોને તોડી નાંખીને એને માનવ-વસ્તીથી અને પાણીના સ્રોતથી દૂર ઉંડાઇ જગ્યામાં દાટી દો.

સંગ્રહ કરવાની શરતોઃ ૧. નીંદણનાશકનાં પૅકેજોને અન્ય ચીજ-વસ્તુઓ રાખવાના ઓરડા કે જગ્યાથી દૂર અલગ જ ઓરડા કે જગ્યામાં રાખો અથવા નીંદણનાશકોના પ્રકાર અને જથ્થા અનુસાર એને અલગ જ કબાટમાં તાળું-ચાવી વારીને રાખો. ૨. નીંદણનાશકોને સંગ્રહ કરવાનો ઓરડો કે જગ્યા મજબૂત, સૂકો, હવાઉજાસવાળો અને પૂરતો મોકળો હોવો જોઇએ.

રાસાયણિક સંયોજનઃ

પાયરાઝોસલ્ફ્યુરોન ઇથાઇલ ટેકનિકલ	(શુદ્ધતા ૯૭%)	૧૦.૩૦૯% ન્યૂ.
(સોડિયમ સૉલ્ટ ઑફ લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ)	વેટિંગ એજન્ટ	૨.૦૦૦% અધિ.
(એરિલ સલ્ફોનિક એસિડ ફૉર્મલડિહાઇડ કોન્ડેન્સેટ)	ડિસ્પર્સિંગએજન્ટ	૫.૦૦૦% અધિ.
(વેલસન-એસ)	ઇનર્ટ ફિલર	૮૨.૬૯૧% અધિ.
કુલઃ		૧૦૦.૦૦૦%વ/વ

આ પત્રિકા/પુસ્તિકામાં નિર્દિષ્ટ પાકોને છોડીને કોઇ અન્ય પાકો પર ઉપયોગ કરશો નહીં.

Gujarati

ਕਿਲੱਗ

ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫ਼ਯੂਰਾਨ ਈਥਾਈਲ ੧੦% ਡਬਲਯੂਪੀ

(ਅੰਤਰਪਰਾਹੀ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ)

ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫ਼ਯੂਰਾਨ ਇਥਾਇਲ [ਇਥਾਇਲ - ੫ (੪, ੬ ਡਾਇਮੈਥੋਕਸੀ ਪਾਇਰੀਮਿਡੀਨ - ੨ - ਇਲਕਾਰਬਾਮਾਇਲ ਸਲਫ਼ਾਮੀਲ) - ੧ - ਮਿਥਾਇਲ ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਲ - ੪ - ਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ] ਇੱਕ ਚੁਨਿੰਦਾ, ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਰੋਪਿਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਫਸਲ	ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ	ਖੁਰਾਕ/ ਹੇਕਟਰ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ. ਆਈ. (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)		
ਪ੍ਰਤਿਰੋਪਿਤ ਝੋਨਾ	ਸਾਇਪ੍ਰੱਸ ਇਰਿਯਾ (ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮੋਥਾ), ਸਾਇਪ੍ਰੱਸ ਡਿਫ਼ਾਰਮਿਸ (ਮਾਰਫਲਾ), ਫਿਮ੍ਬ੍ਰਿਸਟਾਈਲਿਸ ਮਿਲਿਏਸ਼ਿਆ (ਬੋਗੀ), ਮੋਨੋਕੋਰਿਯਾ ਵੈਜਿਨੇਲਿਸ, ਲੁਡਵਿਜਿਆ ਪਰਵਿਫ਼ਲੋਰਾ (ਮਹਾਨਲੀ)	੦.੦੧-੦.੦੧੫	੦.੧-੦.੧੫	੫੦੦-੬੦੦	੯੫

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਉੱਚ ਵੌਲਯੂਮ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਬੀਸਾਇਡ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ੫੦੦ - ੬੦੦ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਕਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਸਦੇ ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਰੋਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ਖੁੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸੂਤਰੀਕਰਣ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਲਓ। ਤ੍ਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਂਹਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਟੋਪੀ, ਬੂਟ, ਐਨਕ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਲਬਾਦਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਠਕਾਬ ਪਾਓ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਲੜਖੜਾਣਾ, ਅਕਤਾਅ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧੁੰਧਲਾ ਦਿੱਸਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ - ਬਾਰ ਤ੍ਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਖਲਨ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ : ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤ੍ਰਚਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ। ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤੱਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਦਾ ਤਰਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਹਿਰਾਂਦੇ ਰਹੋ। ੫% ਸੋਡੀਯਮ ਬਾਇਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਲ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵੇਜ ਦਿਓ। ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

੧. ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

੨. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

੩. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਣ : ੧. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

੨. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਪਾਇਰਾਜ਼ੋਸਲਫ਼ਯੂਰਾਨ ਇਥਾਇਲ ਟੈਕਨੀਕਲ	(ਟੀਚਾ ੯੭%)	੧੦.੩੦੯% ਕਨਿਸ਼ਠ
(ਲਿਗਨੋ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਯਮ ਸਾੱਲਟ)	ਵੈਟਿੰਗ ਅਜੰਟ	੨.੦੦੦% ਅਧਿਕਤਮ
(ਅਰਾਇਲ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਫੋਰਮਲਡੀਹਾਇਡ ਕੰਡੇਨਸੇਟ)	ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਅਜੰਟ	੫.੦੦੦% ਅਧਿਕਤਮ
(ਵੇਲਸਨ-ਐਸ)	ਇਨਟ ਫਿਲਰ	੮੨.੬੯੧% ਅਧਿਕਤਮ
ਕੁਲ		**੧੦੦.੦੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ**

ਚੇਤਾਵਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ / ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੁਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

Punjabi

Technical Source – LG Chem Ltd, South Korea

PYRAZOSULFURON ETHYL 10% WP

पाईराज़ोसल्फ्युरान ईथाईल 10% घुलनशील चूर्ण

Killog®

किलॉग

(Systemic Herbicide)

(अंर्तप्रवाही खरपतवारनाशक)

Manufactured & Marketed by: Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory : C/o S. S. Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023

फैक्टरी : C/o एस. एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३

For any complaint contact Customer Care Cell at
Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

®-Registered Trademark of
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Manufactured & Marketed by :
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

09.22

किलग

पाईराजोसालफिउरन ईथाईल 10% डब्लिउपि

(अन्तर्वाही आगाहानाशक)

पायराजोसालफिउरन ईथाइल [ईथाइल-५-(४,६- डाइमेथक्सिपाइरीमाइडिन- २-इल-कार्बामोइलसालफामाइल)- १-मिथाइलपायराजोल-४-कार्बाक्सिलेटर्स] हल एकटि निर्वाचन विशिक, अग्रुसिउतिक एवं प्राक-उद्भव शुन्यमान्रक यटि रोपनकृत धानेर क्षेत्रे विभिन्न प्रकार शुन्मके कार्यकरीभावे नियन्त्रुण करे ।

सुपारिश

শস্য (ভলি)	আগাছার প্রজাতির নাম	মাত্রা / প্রতি হেক্টর		জলের দ্বারা তরলীকরণ (লিটার)	সর্বশেষ স্প্রে করা ফসল কাটার মধ্যে অপেক্ষার সময় (দিন)
		এআই (কেজি)	গঠন (কেজি)		
রোপনকৃত ধান	সাইপেরাস আইরিয়া, সাইপেরাস ডিফর্মিস, ফিমব্রিস্টাইলিস মিলিয়াসি, লুডউইজিয়া পারভিফ্লোরা, মোনোক্লোয়া ভার্জিনালিস	০.০১-০.০১৫	০.১-০.১৫	৫০০-