ஃப்ளாஷ் குயினால்போஸ் 25% ஈ ஸி பூச்சிக்கொல்லி

குயினால்போஸ் டெக்னிக்கல் அடிப்படையிலான தொடு நஞ்சு மற்றும் குடல் நஞ்சு கரையும் அடர்வு. இது துவரை, நெல், தேயிலை, நிலக்கடலை, கடுகு, எலுமிச்சை, காலிஃப்ளவர், சோயாபீன்ஸ் பயிர்களில் பலவித பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்			கடைசித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் காத்திருப்பு இடைவெளி (நாட்களில்)
		தீ.மூ. %	மருந்து (மிலி)	கால வரம்பு (லிட்டர்)	
நெல்	புகையான் ஹிஸ்பா/	375	1500	500-1000	40
நெல்	நீலவண்டு	500	2000	500-1000	40
நெல்	இலை சுருட்டி	250	1000	500-1000	40
நெல்	தண்டு துளைப்பான்	325	1300	500-1000	40
துவரை	நெற்று துளைப்பான்	350	1400	500-1000	30
துவரை	நெற்று ஈ	350	1400	500-1000	30
மிளகாய்	அசுவினி	250	1000	500-1000	
மிளகாய்	சிலந்தி	375	1500	500-1000	
தேயிலை	இலைப்பேன்கள்	190	760	500-1000	7
கடலை	நெற்று துளைப்பான்	250	1000	500-1000	
நிலக்கடலை	இலைத்தாவி	350	1400	500-1000	30
நிலக்கடலை	இலைச் சுரண்டி	250	1000	500-1000	30
கடுகு	கடுகு ரம்பப் பூச்சி	300	1200	500-1000	
எலுமிச்சை	தட்டைப்பூச்சி	0.7%	4200-5600	500-1000	
எலுமிச்சை	எலுமிச்சை வண்ணப்பூச்சி	0.25%	1500-2000	500-1000	
முட்டைகோஸ்	தண்டு துளைப்பான்	500	2000	500-1000	
சோயாபீன்ஸ்	இலை வண்டு	500	1000	500-1000	

பயன்படுத்த குறிப்புகள்: பயிர் பாதுகாப்பு கருவி: நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், கம்ப்ரெஷன் நாப்சாக் தெளிப்பான், கம்ப்ரெஷன் நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான், அல்லது அஸ்பீ-எச்டிபி தெளிப்பான். **முன்னெச்சரிக்கை:** 1. உணவு வகைகள், உணவு வைக்கப்படும் பாத்திரங்கள், கால்நடை தீவனங்கள், போன்றவற்றிலிருந்து தூரத்தில் வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் உடலின், தோல்களில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. மருந்தின் தெளிப்பு புகையை உறிஞ்சுவதைத் தவிர்க்கவும். மருந்தை காற்றடிக்கும் திசையில் தெளிக்கவும். 4. மருந்து தெளித்தபிறகு மருந்து கலந்துவிட்ட ஆடைகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் சுத்தமாக கழுவவும். 5. மருந்து தெளிக்கும்போது புகை பிடித்தல், தண்ணீர் அருந்துவது, உணவு உண்பது, சுவைப்பது கூடாது. 6. மருந்து கலக்கும்போதும், தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும். 7. நெல் சாகுபடி உடன் தேனி வளர்ப்பு/மீன் வளர்ப்பு செய்யப்படும் இடங்களில் இது பயன்படுத்தக் கூடாது. **விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்:** தலைவலி, தலைச்சுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, வியர்வை, அதிக கண்ணீர், மற்றும் உமிழ்நீர் சுரப்பு ஏற்படலாம். **முதல் உதவி:** 1. தவறுதலாக இந்த மருந்தைக் குடித்துவிட்டால் வாந்தி எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்வதோ, தண்ணீர் ஆகாரமோ கொடுக்காதீர்கள். 2. உடை மற்றும் உடல் பாகத்தில் மருந்து பட்டிருந்தால் உடையைக் கலைந்துவிட்டு உடம்பையும், உடைகளையும் கணிசமான அளவு சோப்பு கலந்த தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 3. கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால் கண்களை உப்பு கலந்த தண்ணீரில்/சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். 4. மருந்தை சுவாசித்துவிட்டால் அந்த நோயாளியை சுத்தமான காற்றுள்ள பகுதிக்கு மாற்றவும். **விஷமுறிவு மருந்து:** 1) நோயாளியை முழுமையாக அட்ரோபினைசேஷனுக்கு உட்படுத்தவும் மற்றும் 5 முதல் 10 நிமிட இடைவெளியில் சிரைவழியே அட்ரோபைன் சல்பேட் 2 முதல் 4 மிகி டோஸ்கள் மீண்டும் மீண்டும் செலுத்துங்கள். ஒரு நாளில் 25 முதல் 50 மிகி வரை அட்ரோபைன் தேவைப்படலாம். அட்ரோபைன் கூடுதலாக செலுத்தப்பட வேண்டியது தேவையை தொடரும் அறிகுறிகளில் இருந்து அறியலாம். உமிழ்நீர் சுரப்பு தொடர்வது டோஸை அட்ஜஸ்ட் செய்ய பயன்படும் வரம்பு. 2) 10 மிலி டிஸ்டில்டு தண்ணீரில் 2 PAM 1-2 கிராம் கலந்து 10-15 நிமிடங்களுக்கு மிக மெதுவாக சிரை வழியாக ஊசி மூலம் செலுத்துங்கள். **தாவரங்களுக்கு விஷத்தன்மை:** பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன் படுத்தினால் இது பயிர்களுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாது. **பயன்படுத்திய டப்பாக்களை அப்புறப்படுத்தல்:** 1. காலி டப்பாக்கள் அல்லது எஞ்சிய களைக்கொல்லி, தெளிப்பான் மற்றும் டப்பாவை கழுவிய நீர் போன்றவற்றை, சுற்றுப்புறச் சூழல் மற்றும் நீர் மாசுபடாமல் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துதல் தயாளிப்பாளர்கள், காப்பவர்கள் மற்றும் தெளிப்பவர்கள் பொறுப்பு. 2. உபயோகப்படுத்திய பேக்கிங்குகளை வெளியில் வைக்காமல் இருப்பது அதனை மறு உபயோகத்தில் இருந்து தடுக்கும். 3. உபயோகத்திற்கு பின்பு பேக்கிங்குகளை உடைத்து பூமிக் கடியில் புதைத்து விடுவது அது புழக்கத்தில் வராமல் தடுக்க உதவும். **சேமிப்பு விதிமுறைகள்:** 1. பூச்சிக்கொல்லி கலந்துள்ள கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் முக்கியமாக உணவு சம்பந்தமான பொருட்கள் வைத்துள்ள இடத்தில் இருந்து தூரத்தில் சேமித்து வைப்பது நலம். மற்றும் களைகொல்லியின் மொத்த அளவைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டி வைப்பது நல்லது. 2. மருந்து கலன்களை சேமித்து வைத்துள்ள இடம் நல்ல வெளிச்சம், நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, இதமான காற்றோட்டம் நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் நிறைவான பரப்பளவு உள்ளதாக அமைந்திருத்தல் அவசியம். அதன்மூலம் பூச்சிமருந்து ஆவியாகி கலப்படம் ஆகாமல் தடுக்கலாம்.

இரசாயன சேர்க்கை:

குயினால்போஸ் டெக்னிக்கல்	(குறைந்தபட்ச தூய்மை 70% தீ.மூ.)	35.70% எ/எ
கரைப்பான் ஸைலின்	(டைமெதைல் பென்ஸீன்)	54.30% எ/எ
எமல்ஸிஃபையர்	கால்சியம் அல்கில் ஆரில் சல்போனேட் மற்றும் பாலி ஆக்ஸி எதிலீன் ஈதர்	10.00% எ/எ
மொத்தம்		100.00% எ/எ

TAMIL

ఫ్లాష్ క్వినాల్‌ఫాస్ 25% ఇసి కీటకనాశిని

క్వినాల్‌ఫాస్ టెక్నికల్‌పై ఆధారపడిన స్పర్శ మరియు ఉదర విషపూరిత ఎమల్సిఫైయబుల్ కాన్‌సన్‌ట్రేషన్, కంది, వరి, వేరుశనగ, ఆవాలు, నిమ్మ, క్యాలీఫ్లవర్, సోయాబీన్ పంటలను సోకే కీటకాలపై ఉపయోగించాలి.

సిఫారసు:

పంట(లు)	కీటకాల సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు			చివరి పిచికారికి మరియు కోతకు మధ్య వేచి వుండవలసిన సమయం (రోజుల్లో)
		ఎ.ఐ. (%)	సూత్రీకరణ (మి.లీ.)	వ్యవధి (లీటర్లు)	
వరి	గోధుమరంగు దోమ	375	1500	500-1000	40
వరి	హిస్పా/బ్లూబీటిల్	500	2000	500-1000	40
వరి	ఆకుముడత	250	1000	500-1000	40
వరి	కాండంతొలుచు పురుగు	325	1300	500-1000	40
కంది పంట	పిసికాయ తొలుచు పురుగు	350	1400	500-1000	30
కంది పంట	పాడ్ ఫ్లై	350	1400	500-1000	30
మిరప	పేనుబంక	250	1000	500-1000	
మిరప	నల్లి	375	1500	500-1000	
టీ	థ్రిప్స్	190	760	500-1000	7
శనగ కంది	పిసికాయ తొలుచు పురుగు	250	1000	500-1000	
వేరుశనగ	ఆకు మిడత థ్రిప్స్	350	1400	500-1000	30
వేరుశనగ	లీఫ్ మైనర్	250	1000	500-1000	30
ఆవాలు	ఆవాల రంపపు ఈగ	300	1200	500-1000	
నిమ్మ	స్కేలు	0.07%	4200-5600	500-1000	
నిమ్మ	సిట్రస్ బటర్‌ఫ్లై	0.025%	1500-2000	500-1000	
క్యాలీఫ్లవర్	కాండం తొలుచు పురుగు	500	2000	500-1000	
సోయాబీన్	ఆకు నల్లి	250	1000	500-1000	

వాడేందుకు నిర్దేశం: మొక్క విషతుల్యత- నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ లేదా ఆస్పీ-హెచ్‌టిపి స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించండి. **ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ వంట పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోటిలో, కళ్లలో మరియు శరీరానికి అంటుకోకుండా చూసుకోవాలి. 3. స్ప్రే తుంపరలను పీల్చవద్దు. గాలివీచే దిశవైపు మాత్రమే స్ప్రే చేయండి. 4. స్ప్రే చేసిన తరువాత కలుషితమైన దుస్తులను మరియు శరీర భాగాలను బాగా శుభ్రం చేసుకోండి. 5.స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగత్రాగటం, త్రాగటం, నోట్టినా తినటం మరియు నమలటం వంటివి చేయవద్దు. 6. స్ప్రే ద్రావకాన్ని కలిపేటప్పుడు, స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షిత దుస్తులను ధరించండి. 7. వరి సాగుతో పాటు పిసికల్చర్/ఆక్వాకల్చర్ ఉత్పత్తిచేసే చోట దీన్ని ఉపయోగించకూడదు. **విషం లక్షణాలు:** తలనొప్పి, తలతిరగడం, వికారం, వాంతులు, చెమటపోయడం, అమితంగా చొంగకారడం మరియు లాలాజలం ఊరడం కలగవచ్చు. **ప్రథమ చికిత్స:** 1. ఒకవేళ మింగినచో వాంతి చేయించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో వుంటే వాంతి చేయించకూడదు. నోటిద్వారా ద్రావకాన్ని ఇవ్వాలి. 2. ఒకవేళ దుస్తులు మరియు శరీరం కలుషితమైనచో దుస్తులను తీసివేసి, కలుషితమైన శరీరాన్ని బాగా సబ్బురుద్దుతూ ఎక్కువ నీటిపోసి శుభ్రపరచండి. 3. ఒకవేళ కళ్లలో పడినట్లయితే సెలైన్/శుద్ధమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల వరకు కళ్లను కడుక్కోండి. 4. ఒకవేళ పీల్చినచో రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తరలించండి. **విరుగుడు:** 1. రోగిని వెంటనే విషరహితం చేయాలి మరియు 5 నుంచి 10 నిమిషాల విరామంలో ఇంట్రావీనస్‌గా అట్రోపైన్ సల్ఫేట్‌ని 2 నుంచి 4 మోతాదుల్లో పదేపదే ఇవ్వడం ద్వారా సంపూర్ణంగా విషరహితం చేయాలి. రోజుకు గరిష్ఠంగా 25 నుంచి 50 మి.గ్రా.ల అట్రోపైన్ అవసరం ఉండొచ్చు. మరింతగా అట్రోపైన్ అవసరం ఉంటుందా అనే విషయం లక్షణాలు కొనసాగడాన్నిబట్టి ఉంటుంది. మోతాదును సవరించడానికి లాలాజలం విస్తృతి ఉపయోగకరమైన ప్రమాణికత అవుతుంది. 2. 1-2 గ్రాముల 2 పిఎఎం 10 మి.లీ. డిస్టిల్డ్ నీటిలో కరిగించండి మరియు 10-15 నిమిషాలపాటు నెమ్మదిగా ఇంట్రావీనస్‌గా ఎక్కించండి. **విషతుల్యత:** సిఫారసు చేసిన ప్రకారం క్షేత్ర స్థాయిలో ఉపయోగించినట్లయితే ఈ ఉత్పాదన విషపూరితం కాదు. **వాడిన డబ్బాలను పారవేయు విధానం:** 1. ఈ కలుపునాశిని గల ప్యాకేజీలను లేదా మిగిలిన సామగ్రిని కడిగినప్పుడు వచ్చిన నీరు మరియు కంటెయినర్‌ని పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా సురక్షితమైన రీతిలో పారవేయడం తయారు చేసేవారి, సూత్రీకరించినవారి, వ్యవహరించేవారి బాధ్యత అయి ఉంటుంది. 2. వాడిన డబ్బాలను తిరిగి వినియోగించడం కుదరడానికి వాటిని బయట వదిలి పెట్టరాదు. 3. ఈ వాడిన డబ్బాలను ధ్వంసంచేసి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి. **నిల్వ పరిస్థితులు:** 1. ఈ కీటకనాశినిని ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థాలు అంటే ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాలు, పశుపుల దాణాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గాకుండా వేరుగా వాటి పరిమాణము మరియు నైజాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి. 2. ఈ కీటకనాశిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడముల్లో, పొడిగా, వెలుతురు, మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రసరించేలా వుండాలి. తద్వారా దీని ఆవిరివలన పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

రసాయనిక మిశ్రమం:

క్వినాల్‌ఫాస్ టెక్	(కనీస స్వచ్ఛత 70% ఎ.ఐ.)	35.70% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సాల్వెంట్ జైలీన్	(డైమిథైల్ బెంజీన్)	54.30% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఎమల్సిఫైయర్	(క్యాల్షియం ఆల్కైల్ ఆరిల్ సల్ఫేనేట్ మరియు పాలీ ఆక్సి ఎథిలీన్ ఇథర్)	10.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
మొత్తం:		100.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

TELUGU

ಫ್ಲಾಶ್ ಕ್ವಿನಾಲ್‌ಫಾಸ್ 25% ಇ.ಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ

ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವಿಷವಾಗುವ, ಕ್ವಿನಾಲ್‌ಫಾಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಧಾರಿತ ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಡಲೆ, ಭತ್ತ, ಚಹಾ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಸಾಸಿವೆ, ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಗಳು, ಹೂಕೋಸು, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಬಳಿಕ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ)	ಅವಧಿ (ಲೀ.)	
ಭತ್ತ	ಕಂದು ಗಿಡ ಜಿಗಿಹುಳು	375	1500	500-1000	40
ಭತ್ತ	ಹಿಸ್ಪಾ/ನೀಲಿ ಜೀರುಂಡೆ	500	2000	500-1000	40
ಭತ್ತ	ಎಲೆ ಮಡಚುಹುಳು	250	1000	500-1000	40
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡಕೊರಕ	325	1300	500-1000	40
ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ	ಕೋಡು ಕೊರಕ	350	1400	500-1000	30
ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ	ಕೋಡುನೊಣ	350	1400	500-1000	30
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಗಿಡಹೇನು	250	1000	500-1000	
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಮೈಟ್	375	1500	500-1000	
ಚಹಾ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ	190	760	500-1000	7
ಕಡಲೆ	ಕೋಡುಕೊರಕ	250	1000	500-1000	
ಶೇಂಗಾ	ಎಲೆ ಜಿಗಿಹುಳ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ	350	1400	500-1000	30
ಶೇಂಗಾ	ಎಲೆ ಬಿಲಕೊರೆಯುವ ಕೀಟ	250	1000	500-1000	30
ನಿಂಬೆ	ಸಾಸಿವೆಯ ಗರಗಸ ನೊಣ	300	1200	500-1000	
ನಿಂಬೆ	ಸ್ಕೇಲ್	0.07%	4200-5600	500-1000	
ನಿಂಬೆ	ಸಿಟ್ರಸ್ ಪತಂಗ	0.025%	1500-2000	500-1000	
ಹೂಕೋಸು	ಕಾಂಡ ಕೊರಕ	500	2000	500-1000	
ಸೋಯಾಬೀನ್	ಎಲೆಯ ವೀವಲ್	250	1000	500-1000	

ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ: ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ- ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಿ-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. **ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು:** 1. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೇನರ್ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಭಾಷ್ಪವು ಉಸಿರಾಟವಾಗದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. 4.ಮಲಿನವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವಿಕೆ, ತಿನ್ನುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ. 7. ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ/ಜಲಜೀವಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. **ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ತಲೆ ನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಹಿತ್ತೋದ್ರೇಕ, ವಾಂತಿ, ಬೆವರುವಿಕೆ, ವಿಪರೀತ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ದ್ರವ ಕುಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯು ಮಲಿನಗೊಂಡರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, ಮತ್ತು ಮಲಿನಗೊಂಡ ತ್ವಚೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೇರಳ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದರೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಕಾಲ ಹೇರಳ ನೀರನ್ನು/ಸಾಲೈನ್ ನೀರು ಎರಚಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗಾಳಿ ಆಡ್ಡಾಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರಿ. **ಪ್ರತಿವಿಷ:** 1. ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಯನ್ನು ಅಟ್ರೋಪೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಾಗೂ 2ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾಂ ಅಟ್ರೋಪೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಧಮನಿಗೆ (ಇನ್‌ಟ್ರಾವೀನಸ್) ಪುನರಪಿ ಡೋಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಟ್ರೋಪೈನೇಶನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 50 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಅಟ್ರೋಪೈನ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಟ್ರೋಪೈನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಡೋಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಒಂದು ಆವಶ್ಯಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಬಹುದು. 2. 1-2 ಗ್ರಾಮ್ 2 ಪಿಎಎಮ್‌ನ್ನು 10 ಮಿ.ಲೀ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಡಿಸಿ ಅಭಿಧಮನಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. **ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ:** ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. **ಖಾಲಿಧಾರಕಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:** 1. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವರು, ಫಾರ್ಮುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸುವರು. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ತೊಳೆ ನೀರುಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 2. ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ಮರುಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಬಾರದು. 3. ಬರಿದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹುಗಿದು ಬಿಡಬೇಕು. **ಶೇಖರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು:** 1. ಮರಿಜೇಡನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮರಿಜೇಡನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಡಬೇಕು. 2. ಮರಿಜೇಡನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ವಿರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳದಂತಾಗಲು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ವಿನಾಲ್‌ಫೋಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್	ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ 70% ಸ.ಘ.	35.70% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕ್ಸೈಲೀನ್	(ಡೈ ಮೆಥಿಲ್ ಬೆಂಜೀನ್)	54.30% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಇಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್	ಕಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿ ಒಕ್ಸಿಎಥಿಲಿನ್ ಈಥರ್	10.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒಟ್ಟು :		100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

KANNADA

ফ্লেশ্ব কুইনালফচ ২৫% ইচি কীটনাশক

ই হ'ল এবিধ স্পৰ্শপ্ৰভাৱী আৰু পাকস্থলীত ক্ৰিয়াৰত বিষাক্ত অৱদ্ৰৱণযোগ্য গাঢ় কীটনাশক যি কুইনালফচ টেকনিকেলৰ ওপৰত আধাৰিত, আৰু ইয়াক মচুৰ মাহ, ধান, চাহপাত, চীনা বাদাম, সৰিয়হ, নেমু, ফুলকবি, চ'য়াবীন আদি শস্যৰ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

অনুমোদন:

শস্য	কীটপতঙ্গৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা/হেক্টৰ			শেষ স্প্ৰে আৰু চপোৱাৰ মাজত ৰবলগীয়া সময় (দিন)
		স. উ. (গ্ৰাম)	ফৰ্মূলেশ্যন (মিলি)	কালদৈৰ্ঘ্য (লিটাৰ)	
ধান	মুগা গছ ফৰিং	৩৭৫	১৫০০	৫০০-১০০০	৪০
ধান	চৰহাপোক/নীলা ফুটিপোক	৫০০	২০০০	৫০০-১০০০	৪০
ধান	পাত মেৰিউৱা পোক	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	৪০
ধান	মজাখোৱা পোক	৩২৫	১৩০০	৫০০-১০০০	৪০
মচুৰমাহ	ছেঁইখোৱা পোক	৩৫০	১৪০০	৫০০-১০০০	৩০
মচুৰমাহ	ছেঁইখোৱা মাখি	৩৫০	১৪০০	৫০০-১০০০	৩০
জলকীয়া	মোৱাপোক	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	
জলকীয়া	মাইটচ্	৩৭৫	১৫০০	৫০০-১০০০	
চাহ	থ্ৰিপচ	১৯০	৭৬০	৫০০-১০০০	৭
বুটমাহ	ছেঁইখোৱা পোক	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	
চীনাবাদাম	পাত ফৰিং থ্ৰিপচ	৩৫০	১৪০০	৫০০-১০০০	৩০
চীনাবাদাম	পাত ছেদক পোক	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	৩০
সৰিয়হ	সৰিয়হৰ কৰপত্ৰ মাখি	৩০০	১২০০	৫০০-১০০০	
নেমু	শল্ককীট	০.০৭%	৪২০০-৫৬০০	৫০০-১০০০	
নেমু	নেমুৰ পখিলা	০.০২৫%	১৫০০-২০০০	৫০০-১০০০	
ফুলকবি	মজাখোৱা পোক	৫০০	২০০০	৫০০-১০০০	
চ'য়াবীন	পাতৰ উইভিলপোক	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ: প্ৰয়োগৰ বাবে সঁজুলি: স্প্ৰে কৰিবলৈ নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশ্যন নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেশ্যন নেপচেক বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ বা অম্পী-এইচটিপি স্প্ৰেয়াৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰিব। **সতৰ্কতা:** ১. খোৱাবস্তু, খোৱাবস্তুৰ খালী পাত্ৰ আৰু পশু খাদ্যৰ পৰা ইয়াক দূৰত ৰাখিব। ২. মুখ, চকু আৰু ছালত ইয়াক লাগিবলৈ নিদিব। ৩. স্প্ৰে কণিকা উশাহত যাবলৈ নিদিব। বতাহৰ একে দিশতহে স্প্ৰে কৰিব। ৪. স্প্ৰে কামৰ শেষত দূষিত কাপোৰ-কানি আৰু গাৰ দূষিত অংশসমূহ ভালদৰে ধুই পেলাব। ৫. স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ খোৱা-বোৱা বা ধূমপান নকৰিব। ৬. মিহলাবৰ আৰু স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত সাজ-পোছাক পিন্ধি লব। ৭. ধানখেতিৰ সৈতে একেলগে যদিহে মীনপালন/জলজ জীৱ পালনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তেন্তে তেনে অঞ্চলত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। **বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ:** মূৰকামোৰণি, মূৰঘূৰণি, ওকালি, বমি, ঘাম ওলোৱা, অত্যধিক চকুপানী আৰু থুই ওলোৱা আদি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে। **প্ৰাথমিক সাহায্য:** ১. যদিহে পেটলৈ গৈছে, ডিঙিৰ ভিতৰত আঙুলিৰে সুৰসুৰাই দি, যেতিয়ালৈকে বমিখিনি পৰিষ্কাৰ নহয় বমি কৰোৱাই থাকিব। কিন্তু ৰোগী অচেতন হৈ থাকিলে বমি নকৰোৱাব। ২. কাপোৰ-কানি আৰু গাৰ ছাল দূষিত হলে, কাপোৰ-কানি আৰু গাৰ দূষিত অংশ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে চাবোন সানি ধুই পেলাব। ৩. যদিহে চকুত লাগে, নিমখীয়া/পৰিস্কাৰ পানীৰে প্ৰায় ১০-১৫ মিনিট সময় ধৰি চকু ধুব। ৪. উশাহত গলে, ৰোগীক মুকলিৰ বিশুদ্ধ বতাহলৈ লৈ যাব। **বিষঘ্ন:** ১. ৰোগীক লগে লগে এট্ৰপিনাজ কৰিব আৰু ৫-১০ মিনিটৰ ব্যৱধানত সিৰৰ মাজেদি ২-ৰ পৰা ৪ মিগ্ৰা মাত্ৰাত এট্'পিন চালফেট বাৰে বাৰে প্ৰয়োগ কৰি সম্পূৰ্ণ এট্ৰ'পিনাইজেশ্যন অব্যাহত ৰাখিব। এদিনত ২৫-ৰ পৰা ৫০ মিগ্ৰা পৰ্যন্ত এট্ৰ'পিন দিয়াৰ প্ৰয়োজন পৰিব পাৰে। পুনৰ এট্ৰ'পিন দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই সেই কথা লক্ষণসমূহ পুনৰ দেখা দিয়া নিদিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এনে সময়ত এট্ৰ'পিনৰ মাত্ৰা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে লালটিৰ পৰিমাণ হ'ল এটা ভাল নিৰ্ণায়ক। ২. ১০ মিলি ডিষ্টিল্ড ওৱাটাৰ ১-২ গ্ৰাম ২ পিএএম-ৰ সৈতে ভালকৈ মিহলাই সিৰৰ মাজেদি খুব লাহে লাহে ১০-১৫ মিনিট সময় লৈ ইঞ্জেকশ্যন দিব। ??**উদ্ভিদিক বিষাক্ততা:** অনুমোদন জনোৱা অনুযায়ী খেতি-পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰিলে এই ভেঁকুৰনাশক উদ্ভিদৰ প্ৰতি বিষাক্ত নহয়। **পেকেট বিনষ্টকৰণ:** ১. খালী পেকেট, অৱশিষ্ট দ্ৰব্য আৰু ধোৱা-পখলা কৰা পানী আদি পৰিবেশ বা পানীৰ প্ৰদূষণ ঘটিব নোৱৰাকৈ নিৰাপদে নষ্ট কৰাটো হ'ল কীটনাশকবিধৰ উৎপাদনকৰ্তা, ফৰ্মূলেটৰ আৰু ব্যৱহাৰকৰ্তাৰ কৰ্তব্য। ২. খালী পেকেটৰ পুনৰ্ব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ সেইবিলাক বাহিৰতে এৰি অহা অনুচিত। ৩. পেকেটবিলাক ভাঙি-চিঙি, জনবসতিৰ পৰা আঁতৰত মাটিৰ তলত পুতি পেলোৱা উচিত। **মজুতকৰণৰ অৱস্থা:** ১. কীটনাশক থকা পেকেটবিলাক অন্যান্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰখাৰ বাবে ব্যৱহৃত কোঠা বা ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পৃথক কোঠা বা ঠাইত মজুত ৰখা উচিত অথবা কীটনাশকেৰ পৰিমাণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা মাৰি ৰখা উচিত। ২. কীটনাশক মজুত ৰখা কোঠা বা ঠাইডোখৰ মজবুত, পোহৰ থকা, শুকান, বতাহ চলাচল কৰিব পৰা আৰু জলীয় বাষ্পৰ দ্বাৰা দূষিত হব নোৱৰাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

ৰাসায়নিক গঠন:

কুইনালফচ টেকনিকেল	(ন্যূনতম বিশুদ্ধতা ১০% স. উ.)	৩৫.৭০% ও/ও
দ্ৰাৱক জাইলিন	(ডাইমিথাইল বেঞ্জিন)	৫৪.৩০% ও/ও
ইমালচিফায়াৰ	(কেলচিয়াম এলকিল এৰিল চালফ'নেট আৰু পলি অক্সি ইথাইলিন ইথাৰ)	১০.০০% ও/ও
মুঠ		১০০.০০% ও/ও

ASSAMME

ଫ୍ଲାଶ୍ କ୍ୱିନାଲ୍‌ଫସ୍ ୨୫% ଇ ସି କୀଟନାଶକ

କ୍ୱିନାଲଫସ୍ ଟେକ୍‌ନିକାଲ ଆଧାରିତ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଅବଦ୍ରବଯୋଗ୍ୟ ସାନ୍ଦ୍ର ରସାୟନ ସଂସର୍ଗ ଓ ପେଟ ବିଷ ରୂପେ କାମ କରେ । ଏହାକୁ ମସୁର ଡାଲି, ଧାନ, ଚାହା, ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ, ଲେମ୍ବୁଜାତୀୟ ଫଳ, ଫୁଲକୋବି, ସୋୟାବୀନ ଫସଲର ଅପକାରୀ ପୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ।

ସୁପାରିଶ:

ଫସଲ	ପୋକଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ମାତ୍ରା/ହେକ୍ଟର୍			ଅନ୍ତିମ ସିଞ୍ଚନ ପରଠୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରା.)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ମି.ଲି.)	ଅବଧି (ଲିଟର)	
ଧାନ	ବାଦାମି ଗଛଡିଆଁ	୩୭୫	୧୫୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୪୦
ଧାନ	ମହିଷା/ନୀଳ ବାଟଲ୍	୫୦୦	୨୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୪୦
ଧାନ	ପତ୍ରମୋଡ଼ା	୨୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୪୦
ଧାନ	କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା	୩୨୫	୧୩୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୪୦
ମସୁର ଡାଲି	କୋଷା ବେଧକ	୩୫୦	୧୪୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୩୦
ମସୁର ଡାଲି	କୋଷା ମାଛି	୩୫୦	୧୪୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୩୦
ଲଙ୍କାମରିଚ	ଜଉପୋ	୨୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ଲଙ୍କାମରିଚ	ବରୁଥୀ	୩୭୫	୧୫୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ଚାହା	ଭରୁଣି	୧୯୦	୭୬୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୭
ବୁଟ	କୋଷା ବେଧକ	୨୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ଚିନାବାଦାମ	ପତ୍ରଡିଆଁ ଭରୁଣି	୩୫୦	୧୪୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୩୦
ଚିନାବାଦାମ	ପତ୍ର ଖନକ	୨୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	୩୦
ସୋରିଷ	ସୋରିଷିଆ ମାଛି	୩୦୦	୧୨୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ	କାତି ପୋକ	୦.୦୭%	୪୨୦୦-୫୬୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ	ସିଟ୍ରସ୍ ବଟରଫ୍ଲାଇ	୦.୦୨୫%	୧୫୦୦-୨୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ଫୁଲକୋବି	କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା	୫୦୦	୨୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	
ସୋୟାବୀନ୍	ପତ୍ର ଘୁଣିପୋକ	୨୫୦	୧୦୦୦	୫୦୦-୧୦୦୦	

ପ୍ରୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ପାଦପ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ: ସିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, କମ୍ପ୍ରେଶନ୍, ନାପ୍‌ସାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, କମ୍ପ୍ରେଶନ୍ ନାପ୍‌ସାକ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେୟର ବା ଅସ୍ପୀ-ଏଚଟିପି ସ୍ପ୍ରେୟର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। **ସତର୍କତା:** ୧. ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ରଖାଯିବା ଖାଲି ପାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ୨. ତୁଣ୍ଡ, ଆଖି ଓ ଚେହେରେ ଲାଗିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ୩. ସିଞ୍ଚନକଣ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ପବନ ବୋହୁଥିବା ପଟରୁ ହିଁ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ୪. କାମ ସରିବା ପରେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଲୁଗାପଟା ଭଲକରି ଧୁଅନ୍ତୁ। ୫. ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ ଧୂମ୍ରପାନ, ଖାନ-ପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୁଆଗୁଣ୍ଡି ଆଦି କିଛି ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୬. ମିଶାଇଲା ବେଳେ ଓ ସିଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପୂରା ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ୭. ଏହାକୁ ଧାନ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ପିସିକଲ୍‌ଚର୍/ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚିତ । **ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ:** ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡଘୁରା, ଅଣ୍ଠ ଉଠିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଝାଳେଇବା, ଅତିରିକ୍ତ ଲୁହେଇବା ଓ ଲାଳେଇବା ଲକ୍ଷଣ ଦିଶିପାରେ । **ପ୍ରଥମୋପଚାର:** ୧. ପେଟକୁ ଯାଇ ବିଷାକ୍ତତା ଘଟିଥିଲେ, ତଣ୍ଟି ସାଉଁଳେଇ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ବାନ୍ତି ସଫା ଦିଶିବା ଯାଏଁ ଏହା ଦୋହରାନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଅଚେତ ଥିଲେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୨. ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା ଓ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସାବୁନରେ ସଫା କରି ପ୍ରଚୁର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ୩. ଆଖି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ସାଲାଇନ୍/ସଫା ପାଣିରେ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ୪. ଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ରୋଗୀକୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। **ବିଷଘ୍ନ :** ୧. ରୋଗୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଟ୍ରୋପିନାଇଜ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂରା ଆଟ୍ରୋପିନାଇଜେଶନ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୫-୧୦ ମିନିଟ ଅନ୍ତରରେ ୨-୪ ମି.ଗ୍ରା. ଆଟ୍ରୋପିନ୍ ସଲ୍‌ଫେଟ ମାତ୍ରା ଦୋହରାନ୍ତୁ । ଦିନକ ଭିତରେ ୨୫-୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟ୍ରୋପିନ୍ ଲାଗିପାରେ । ଲକ୍ଷଣ ଦିଶିବା ଉପରେ ଆହୁରି ଆଟ୍ରୋପିନ୍ ଦେବା ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାରେ ବୋହୁଥିବା ଲାଳ ମାତ୍ରା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ୨. ୧୦ ମି.ଲି. ଡିଷ୍ଟିଲ୍ଡ ୱାଟରରେ ୧-୨ ଗ୍ରାମ୍ ୨-ପିଏମ୍ ମିଶାଇକରି ଶିରାରେ ଅତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମାନେ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ ଲଗାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। **ପାଦପ ବିଷାକ୍ତତା:** କ୍ଷେତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶକୃତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ, ଗଛ ପାଇଁ ନିରାପଦ। **ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ:** ୧. ଫିମ୍ପିନାଶକ ର ଉତ୍ପାଦକ, ଫର୍ମୁଲେଟର୍ ଆଉ ଅପରେଟର୍ ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧୁଆଧୁଇ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିବେବେ, ଯେପରି ପାଣି କି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ୨. ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ କାମରେ ନ ଲଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାକୁ/ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ/ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ୩. ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ଲୋକବସତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗିଭୁଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଦରକାର। **ମହଜୁଦକରଣ ସ୍ଥିତି:** ୧. ଉତ୍ପାଦ ଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଖାସ୍‌କରି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଅଲଗା ଏକ ସ୍ଥାନ/କୋଠରୀରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଜରୁରୀ, କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାକୁ ଏକ ଖାଲି ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ୨. କୀଟନାଶକ ମହଜୁଦ କରାଯିବା ସ୍ଥାନ ବା କୋଠରୀଟି ମଜବୁତ, ଶୁଖିଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟବୀୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ବି ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ଏହାର ବାଷ୍ପ ଯୋଗେ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା:

କ୍ୱିନାଲଫସ୍ ଟେକ୍‌ନିକାଲ୍	(ଅନ୍ୟୂନ ଶୁଦ୍ଧତା ୭୦% ସ.ଉ.)	୩୫.୭୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ଦ୍ରାବକ ଜାଇଲିନ୍	(ଡାଇମେଥିଲ୍ ବେଞ୍ଜିନ୍)	୫୪.୩୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ଅବଦ୍ରବକାରକ	(କାଲ୍‌ସିଅମ୍ ଅଲ୍‌କାଇଲ୍ ଆରିଲ ସଲ୍‌ଫୋନେଟ୍ ଓ ପଲି ଅକ୍ସି ଇଥାଇଲିନ୍ ଇଥର୍)	୧୦.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ
ମୋଟ		୧୦୦.୦୦% ଓଜନ/ଓଜନ

ORIYA

فلیش قینل پھوس EC 25 % انسیکٹ سائیڈ

اکہ رابطہ تہ میادہ ظہار دار مکدار بناوٹھ قینل پھوس ٹیکنیکل ، تہ استعمال گاسی بیمارن خلاف ین منز چھنہ ، دانیہ ، چائی ، جل گوجہ ، تیلگو ل ، لیؤمب ، فولگوبی ، سوئے فسلن ۔

صلاح:

فصل	بیماری بند عام ناو	میقدار فی بیکٹر			پرانک وق پتمہ چھرکاو پیٹھ فصل ژٹنس تام
		اے آیی (گرام)	بناوٹ (ملی لیٹر)	واکٹھاس متیک (لیٹر)	
دانیہ	دوبچین رنگ وول ھلو	375	1500	500-1000	40
دانیہ	ھسپاہ / نیل داغ	500	2000	500-1000	40
دانیہ	واتھر وول	250	1000	500-1000	40
دانیہ	گوڈ موکلوں	325	1300	500-1000	40
	پوڈ بور	350	1400	500-1000	30
اربر	پوڈ فلائی	350	1400	500-1000	30
مرچھ وانگن	اپہد	250	1000	500-1000	
مرچھ وانگن	داغ	375	1500	500-1000	
چائی	تھرپس	190	760	500-1000	7
چنہ	پوڈ بور	250	1000	500-1000	
جلہ گوجہ	واتھر کیس	350	1400	500-1000	30
جلہ گوجہ	واتھر کم	250	1000	500-1000	30
تیلگو گل	سے واتھیس	300	1200	500-1000	
لیومب	سکیل	0.07%	4200-5600	500-1000	
لیومب	لیومب تولید	0.025%	1500-2000	500-1000	
فلگوبی	گوڈ موکلوں	500	2000	500-1000	
موہنہ	واتھر چھینن	250	1000	500-1000	

استعمال خاطر ہدایت: کل بچاون سامان نیپسیک چھکن وول ، خور دار چھکن وول ، دباوٗں وول چھکن وول ، دباوٗں نیپسک بیٹری تہ ASPEE-HTP پاور چھکن وول. **احتیاط :1.** کیمیں چیزن نیش تھوو دور ، خالی کو کیس بانہ تہ جانور فیڈ. .2. پونٹھ ، اچھ تہ مسلح بچھوواری نیش .3 یہ گو ںمہ چڑو . سپرے کرو ہاوٗی کس زخس کن .4 پورہ پھنٹھ چھلیو متاثر گامیت پلو تہ پتھو اپی اختیار . .5 سپرے کرنس دوران مہ چھوو تموخ ، ترش ، کیس تہ مہ چشیو .6 لاگو محفوظ پلو زاذ نہ تہ چانک نہ وزتہ .7 یہ گوس نہ کس استعمال یتن ماشہ تلاپیہ ، گاڑھ یا دانی اس ووف دونہ یوان .

بیمار گاسنک علامات : کل دوو ، نیت سوئی ، پکام ، دروخ ، آراخ یوں ، زیادہ نیت سوئی تہ آراخ مہ پییہ . گوڈ نیک علاج : .1 اگر نیگلیتھ گو ، دروخ آنیو انگول دیں سیٹ پتس گلاس نہ دروخ گاسی بند . اگر بیمار گو بیہوش تلی مہ انو دروخ . .2 اگر پلو تہ مسلح چھ متاثر ، نبر کرو پلو تہ چھالو متاثر دار مسلہ صابن تہ اب سیٹ . .3 اگر اچھن منز چھ گومت اب چھکو اچھن منز 10 پیچہ 15 منٹن تیان . .4 اگر چومت چھ نیرو تازہ ہاوٗس کن. **انٹی ڈٹ : .1** ائو پنیزے کو بیارس جلدی تہ برکرار تھوو ائو پنزئیوں لگاتار ڈوز 2 پیچہ 4 گرام اٹرو پائن سلفیٹ گی کرنہ سیٹ 5 پیچہ 10 منٹن بندس درمیان منز . زیاد سے زیاد 25 پیچہ 50 گرام اٹرو پائن چھ درکار اکیس دوہاس . اگر بیچہ پی اٹرو پائن درکار لگاتار علامات متبک . بدوٗو تلی ڈوز چ ملکار . .2 رلوو 1-2 گرام PAM 2 منز 10 ایم یل صاف آبس سیٹ تہ کرو انجکشن گی 10-15 منٹن تیان. **فیٹو توشچتی :** یہ چھ نہ فیٹو توشک یتم سات استعمال گاسی فیلڈ سالہ متبک. **ٹھکان لگاویو استعمال گامیت بانہ : .1** یہ گاس آسین ذمداری بناون ولن کی تم کرن ییم پکیجس یا آتھ متالک کنہ تہ چیز یا چھلن ییم بانہ سی تہ اصل تاجٔ سان تاکہ امی سیٹ گاسی نہ ماحول خراب یہ اب گندہ. .2 استعمال گامیت پکیجیس گاسن نہ پیتہ کن تھاو نہ ینہ تہ بی گاسن استعمال. .3 پکیجیس گاسن فرداؤ نہ ین استعمال پیتہ . **محفوظ تھاو نیک لوازمات : .1** ین پکیجس منز کیمن خاطر دوا اسی گاسن اسٹور گاسن الگ کرس منز یا ٹمپن یاتی بکی آزیکزآس یا تھوو الگ المار ی منز کلفس تل تہ کنز گاسن آسن بیماری متبک والس آئی. .2 تم کرہ یا جائے ییم دوا محفوظ تھاو نہ خاطر اس گاسن آسن پورہ پوشک ، اصل بناوٹھ توشک ، ٹھنڈ ، ہوادار تہ بی ی نہ آتھ آراخ گاسی.

کیمیائی مکدار :

قینلپوس ٹیلنیکل	(کم صفائی 70% آی ای)	35.75 %w/w
سولونٹ شیلینے	(دمتھیل بنزین)	54.30%w/w
یملسفر	(کالشم الکیل سلفونٹ تہ پولے وتھی ائلے اتھر)	10.00 %w/w
کل		100.00%w/w

KASHMIRI

QUINALPHOS 25% EC

FLASH®

INSECTICIDE

क्यूनालफोस २५% ई.सी.

फ्लैश

(कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक एवं विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंज़िल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory :
Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2,
Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat

फैक्टरी :
प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२,
जि.- पंचमहाल – ३८९३५०, गुजरात

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India.

Manufactured & Marketed by :
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059



11.23 H

FLASH® QUINALPHOS 25% EC INSECTICIDE

A Contact and stomach poisonous emulsifiable concentration based on Quinalphos technical, and used against the pests of Red Gram, Paddy, Ground nut, Mustard, Citrus, Cauliflower, Soybean crops.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/ HA			Waiting Period between last spray to harvest days
		A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution (Ltr.)	
Paddy	Brown plant hopper	375	1500	500-1000	40
Paddy	Hispa/Blue Beetle	500	2000	500-1000	40
Paddy	Leaf roller	250	1000	500-1000	40
Paddy	Stem borer	325	1300	500-1000	40
Red gram	Pod borer	350	1400	500-1000	30
Red gram	Pod fly	350	1400	500-1000	30
Chilies	Aphid	250	1000	500-1000	
Chilies	Mite	375	1500	500-1000	
Tea	Thrips	190	760	500-1000	7
Bengal gram	Pod Borer	250	1000	500-1000	
Groundnut	Leaf Hopper Thrips	350	1400	500-1000	30
Groundnut	Leaf miner	250	1000	500-1000	30
Mustard	Mustard saw fly	300	1200	500-1000	
Citrus	Scale	0.07%	4200-5600	500-1000	
Citrus	Citrus butterfly	0.025%	1500-2000	500-1000	
Cauliflower	Stem borer	500	2000	500-1000	
Soybean	Leaf weevil	250	1000	500-1000	

Direction of Use : Plant protection Equipment-Knapsack sprayer, foot sprayer, Compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery and ASPEE-HTP power sprayer. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. It should not be used in the areas where pisciculture/aquaculture is practiced along with rice cultivation. **Symptoms of Poisoning :** Headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive lacrimation and salivation may occur. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote** : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated does of 2 to 4 mg of atropine Sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. **Phytotoxcity** : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation. **Disposal of Used Container** : 1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washing and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. **Storage Conditions :** 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticides. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well-buiilt, dry, cool, ventilated and sufficient in dimensions to avoid contaminated with vapour.

Chemical Composition :

Quinalphos technical	(min. purity 70% a.i.)	35.70% w/w
Solvent xylene	(Dimethyl benzene)	54.30% w/w
Emulsifier	(Calcium alkyl aryl sulphonate & poly oxy ethylene ether)	10.00% w/w
Total		100.00% w/w

ENGLISH

फ्लैश क्यूनालफोस २५% ई.सी. कीटनाशक

क्यूनालफोस २५ प्रतिशत ई.सी. धान, अरहर, चाय, चना, मूंगफली, सरसों, मौसम्मी, फूल गोभी, सोयाबीन आदि फसलों पर आने वाले कीटों की रोकथाम के लिए प्रभावकारी है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा			अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (ली)	
धान	भूरा पौध फुदका,	३७५	१५००	५००-१०००	४०
धान	कर्कश रोमिल/नीली भृंग,	५००	२०००	५००-१०००	४०
धान	पर्ण वेलनक,	२५०	१०००	५००-१०००	४०
धान	तना छेदक	३२५	१३००	५००-१०००	४०
अरहर	फली छेदक,	३५०	१४००	५००-१०००	३०
अरहर	फली मक्खी	३५०	१४००	५००-१०००	३०
मिर्च	माहू,	२५०	१०००	५००-१०००	
मिर्च	धुन	३७५	१५००	५००-१०००	
चाय	चुरदा	१९०	७६०	५००-१०००	७
चना	फली छेदक	२५०	१०००	५००-१०००	
मूंगफली	पत्ती का टिड्डा, चुरदा	३५०	१४००	५००-१०००	३०
मूंगफली	पत्ती का सुरंगी कीट	२५०	१०००	५००-१०००	३०
सरसों	सरसों आरा मक्खी	३००	१२००	५००-१०००	
मौसम्मी	स्केल	०.०७%	४२००-५६००	५००-१०००	
मौसम्मी	मौसम्मी की तितली	०.०२५%	१५००-२०००	५००-१०००	
फूल गोभी	गोभी तना छेदक	५००	२०००	५००-१०००	
सोयाबीन	पत्ती का घुन	२५०	१०००	५००-१०००	

उपयोग के लिए निर्देश: प्रयोग में लाये जाने वाले छिड़काव यंत्र नैपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई-एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. जिन क्षेत्रों में धान की खेती के साथ मछली की पैदावार (पिसीकल्चर/एक्वाकल्चर) की जाती है। इस कीटनाशक का प्रयोग न करें। **विष के लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, अधिक पसीना आना, आंसू आना, दस्त, लार टपकना और झटके (मिर्गी) आ सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ें उतार दे और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि कीटनाशक सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक:** १. रोगी को तुरंत एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तः शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए। एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती हैं। एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं। एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मूंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं। २. १ से २ ग्राम २ पी. ए. एम. १० मि. ली. आसुत जल में घोलकर अन्तः शिरा द्वारा बहुत धीरे-धीरे से २५ मिनट में देना चाहिए। **पौधविशाक्तता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविनाशक्त नहीं हैं। **खाली डिब्बों का निपटारा:** १. कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों या पात्रों को तोड़-फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २. प्रयोग किये हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन को निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास के चीजे, पीने का पानी विषला न हों। **संग्रहण की शर्तें:** १. कीटनाशक के डिब्बों का संग्रहण अलग कमरे या स्थान पर अन्य वस्तुओं विशेषकर खाद्य पदार्थों के संग्रहण कक्ष से दूर किया जाना व कीटनाशक की मात्रा व स्वभाव पर निर्भर करते हुए डिब्बों को अलग आलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। २. संग्रहण कक्ष रोशनीदार, मजबूत, शुष्क, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई-चौड़ाई का होना चाहिए जिससे बाष्प दूषित न हो सकें।

रासायनिक संरचना:

क्यूनालफोस टैकि.	(न्यूनतम शुद्धता ७० प्रतिशत स.त.)	३५.७०% भार/भार
सोलवेंट्स जाईलिन	(डाईमिथायल बेनजीन)	५४.३०% भार/भार
इमल्सीफायर	(कैल्शियम अलकयिल आयरिल सल्फोनेट एवं पोलीओक्सी इथीलिन ईथर)	१०.००% भार/भार
योग		१००.००% भार/भार

HINDI

फ्लॅश क्विनालफॉस २५% ई सी कीटकनाशक

क्विनालफॉस हे स्पर्श व पोट विषकारक कार्य पद्धती असलेले तूर, धान (भात), चहा, भुईमुग, मोहरी, लिंबू, सोयाबीन तसेच कोबी पिकांवरील कीड नियंत्रणासाठी उपयुक्त असे कीटकनाशक आहे.

शिफारस:

पिके	रोगाचे नाव	मात्रा/हेक्टरी			शेवटच्या फवारणीनंतर पिक तयार होईपर्यंतचा प्रतीक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		सं.घ. (ग्रॅम)	मिश्रण (मिलि.)	कालावधी लिटर	
भात	तपकिरी तुडतुडा	३७५	१५००	५००-१०००	४०
भात	हिस्पा/निळा भुंगा	५००	२०००	५००-१०००	४०
भात	पाने गुंडाळणारी अळी	२५०	१०००	५००-१०००	४०
भात	खोडकीडा	३२५	१३००	५००-१०००	४०
तूर	शेंगा पोखरणारी अळी	३५०	१४००	५००-१०००	३०
तूर	शेंगांवरील माशी	३५०	१४००	५००-१०००	३०
मिरची	मावा	२५०	१०००	५००-१०००	
मिरची	कोळी	३७५	१५००	५००-१०००	
चहा	फुलकिडे	१९०	७६०	५००-१०००	७
हरभरा	घाटे आळी	२५०	१०००	५००-१०००	
भुईमूग	पानावरील तुडतुडे, फुलकिडे	३५०	१४००	५००-१०००	३०
भुईमूग	पाने कुरतडणारी अळी	२५०	१०००	५००-१०००	३०
मोहरी	मोहरीवरील काळी माशी	३००	१२००	५००-१०००	
लिंबू	खवले कीड	०.०७%	४२००-५६००	५००-१०००	
लिंबू	लिंबूवरील पतंग	०.०२५%	१५००-२०००	५००-१०००	
फुल कोबी	अळी	५००	२०००	५००-१०००	
सोयाबीन	पाने गुंडाळणारी अंळी	२५०	१०००	५००-१०००	

वापरण्यासाठी सूचना: रोप सुरक्षा उपकरण: फवारणीसाठी नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर वा अस्पी एचटीपी स्प्रेयर वापरा. **सावधगिरी:** १. अन्नपदार्थ, खाद्यपदार्थांचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क येऊ देऊ नका. ३. फवारणीची वाफ श्वासात जाऊ देऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग व्यवस्थित धुवून काढा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका. तसेच काहीही खाऊ पिऊ अथवा चघळू नका. ६. मिश्रण तयार करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला. ७. भाताच्या पिकाबरोबर मत्स्यशेती, जलचर संवर्धन होणाऱ्या क्षेत्रात याचा वापर केला जाऊ नये. **विषबाधेची लक्षणे:** डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळ, ओकाऱ्या, घाम येणे, डोळ्यातून जास्त प्रमाणात अश्रुनिर्मिती आणि लाळ येणे या गोष्टी घडू शकतात. **प्रथमोपचार:** १. पोटात गेलेले असल्यास घशाच्या मागच्या बाजूला स्पर्श करून ओकारी होऊ द्या. ओकारीचे द्रावण स्वच्छ होईपर्यंत ही गोष्ट वारंवार करा. रोगी बेशुद्ध असल्यास त्याच्या ओकाऱ्या काढू नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित झालेली असल्यास कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर साबण व पाणी वापरून स्वच्छ करा. ३. डोळे दूषित झालेले असल्यास भरपूर सलाईन/स्वच्छ पाणी यांचे सुमारे १० ते १५ मिनिटे हबके मारुन धुवून टाका. ४. श्वासात गेलेले असल्यास रोग्याला मोकळ्या हवेत हालवा. **उतारा:** १. रूग्णाला ताबडतोब ॲट्रोपायनाइझ करा आणि ५ ते १० मिनिटाच्या अंतराने शिरेद्वारे ॲट्रोपाइन सल्फेटच्या २ ते ४ मिग्रॅ. मात्रा वारंवार देऊन संपूर्ण ॲट्रोपायनाझेशन राहू द्या. एका दिवसात २५ ते ५० मिग्रॅ. ॲट्रोपाइनची गरज पडू शकते. लक्षणे चालू राहण्याचर त्यापुढे ॲट्रोपाइन वापरण्याची गरज अवलंबून असते. लाळ येण्याची मर्यादा ही मात्रामध्ये फेरफार करण्यासाठी उपयुक्त निकष असते. २. १० मिली उर्ध्वपतित पाण्यामध्ये १-२ ग्रॅ. २ पीएम विरघळवा आणि शिरेमधून अत्यंत सावकाशपणे १०-१५ मिनिटे द्या. **विषारक्षमता:** शिफारशीच्या अनुसार वापरले असता हे उत्पादन फायटोटॉक्सिक नाही. **वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट:** १. उरलेले रसायन व कंटेनर धुतल्यानंतर बाहेर पडणारं धुवण ह्यामुळे पर्यावरणीय तसेच जल प्रदूषण होणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांची विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक, फॉर्म्युलेटर्स आणि वापरणाऱ्याचे कर्तव्य आहे. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत ह्यासाठी ती उघड्यावर टाकू नयेत. ३. पॅकेजेसची मोडतोड करावी आणि ती वस्तीपासून दूर खोलवर पुरावीत. **साठवण:** १. कीटकनाशक सामावलेली वेष्टणे ही अन्य वस्तू साठवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या वा जागांपासून दूर असलेल्या स्वतंत्र खोल्या वा जागांमध्ये साठवावीत किंवा कीटनाशकाचं स्वरूप व प्रमाण ह्यानुसार स्वतंत्र फडताळात कडीकुलुपात बंदिस्त ठेवावीत. २. कीटनाशक साठवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या वा जागांचे बांधकाम भक्कम असावे तसेच बाष्पामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी त्या कोरड्या, हवा उत्तम खेळती रहाणाऱ्या, भरपूर उजेडाच्या आणि पुरेशा मोजमापांच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचना:

क्विनालफॉस तांत्रिक	(किमान शुद्धता ७०% स.घ.)	३५.७०% व/व
द्रावक ग्झायलीन	(डायमिथिल बेन्झेन)	५४.३०% व/व
मिसळणारा पदार्थ	(कॅल्शियम अल्काइल अरायल सल्फोनेट आणि पॉलि ऑक्सि इथिलिन इथर)	१०.००% व/व
एकूण		१००.००% व/व

MARATHI

ફ્લૅશ ક્વિનલફૉસ ૨૫% ઇ સી જંતુનાશક

ક્વિનલફૉસ ટેકનિકલ પર આધારિત એક સ્પર્શદ્દન અને પેટમાં જઈને અસર કરનારું ઝેરી ઇમલ્સિફાયેબલ કૉન્સન્ટ્રેશન જેનો ઉપયોગ તુવર, ડાંગર, ચા, મગફળી, રાઈ, રસાળ ફળો, કોબીફ્લાવર, સોયાબિનના પાક પર લાગતાં કીટકોની સામે કરવામાં આવે છે.

ભલામણોઃ

પાક (પાકો)	જીવાતનું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ/હેક્ટર			છેલ્લા છંટકાવ અને લણણી વચ્ચે પ્રતીક્ષાગાળો (દિવસ)
		સ.ઘ. (ગ્રા.)	રચના (મિ.લી.)	મંદતા (લી.)	
ડાંગર	છોડના ભુખરા તીતીઘોડા	૩૭૫	૧૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૪૦
ડાંગર	હિસ્પા/બ્લૂ બીટલ	૫૦૦	૨૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૪૦
ડાંગર	પાન વાળતી ઇયળ	૨૫૦	૧૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૪૦
ડાંગર	ગાભમારાની ઇયળ	૩૨૫	૧૩૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૪૦
તુવર	સીંગ કોરતી ઇયળ	૩૫૦	૧૪૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	30
તુવર	સીંગની માખી	૩૫૦	૧૪૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	30
મરચાં	મોલોમશી	૨૫૦	૧૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
મરચાં	કથીરી	૩૭૫	૧૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
ચા	થ્રીપ્સ	૧૯૦	૭૬૦	૫૦૦-૧૦૦૦	૭
બંગાલીચણા	સીંગ કોરતી ઇયળ	૨૫૦	૧૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
મગફળી	પાનના તીતીઘોડા, થ્રીપ્સ	૩૫૦	૧૪૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	30
મગફળી	પાન કોરતી ઇયળ	૨૫૦	૧૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	30
રાઈ	મસ્ટર્ડ સો ફ્લાય	300	૧૨૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
રસાળ ફળો	સડો	0.0૭%	૪૨૦૦-૫૬૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
રસાળ ફળો	સાયટ્રસ બટરફ્લાય	0.0૨૫%	૧૫૦૦-૨૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
કોબીફ્લાવર	ગાભમારાની ઇયળ	૫૦૦	૨૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	
સોયાબિન	પાંદડાનું ધનેરું	૨૫૦	૧૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	

ઉપયોગની સૂચનાઃ છોડ રક્ષણનાં સાધન – નૅપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નૅપસેક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નૅપસેક બૅટરી સ્પ્રેયર અથવા એસપી–એચટીપી સ્પ્રેયર વાપરો. **સાવચેતીઃ** ૧. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુચારાથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ત્વચા સાથે સંપર્ક થતા ટાળો. ૩. છાંટને શ્વાસમાં ન આવવા દો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪. છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગો બરોબર ધુઓ. ૫. છંટકાવ કરતી વખતે ખાવું, પીવું, ચાવવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. ૬. છંટકાવ કરતી વખતે અને મિશ્રણ બનાવતી વખતે સંપૂર્ણ સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો. ૭. જ્યાં પીસીકલ્ચર/ઍક્વાકલ્ચરનું ઉત્પાદન ડાંગરની ખેતી સાથે થતું હોય એવા વિસ્તારોમાં એનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ. **ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોઃ** માથું દુખવું, ચક્કર, ઊબકા, ઊલટી, પરસેવો, આંખમાંથી વધારે પડતું પાણી વહેવું અને લાળ ટપકવી જેવાં લક્ષણો નજરે પડી શકે છે. **પ્રાથમિક સારવારઃ** ૧. જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવવા પ્રયાસ કરો. ઉલટી સાફ ન આવે ત્યાં સુધી આમ કરતા રહો. જો દરદી બેહોશ હોય, તો ઉલ્ટી કરાવવા પ્રયાસ કરશો નહીં. ૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય તો કપડાં કાઢી નાખી દૂષિત ત્વચા પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી બરોબર ધુઓ. ૩. જો આંખો દૂષિત થાય તો ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ સલાઇન કે સ્વચ્છ પાણીની છાલક મારી સાફ કરો. ૪. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને શુદ્ધ હવામાં લઇ જાઓ. **ઝેરનું મારણઃ** ૧. દરદીને તરત જ એટ્રોપિનાઇઝ કરો અને ૫ થી ૧૦ મિનિટના ગાળાએ નસમારફત એટ્રોપિન સલ્ફેટના ૨ થી ૪ મિ.ગ્રા.ના વારંવાર ડોઝ આપી સંપૂર્ણ એટ્રોપિનાઇઝેશન જાળવી રાખો. દિવસના ૨૫ થી ૫૦ મિ.ગ્રા. જેટલું એટ્રોપિન જરૂરી બને પણ ખરૂં. વધુ એટ્રોપિન આપવાની જરૂર માટે માર્ગદર્શન લક્ષણો ચાલુ રહેતાં મળી શકે છે. ડોઝ વત્તાઓછા કરવા માટે લાળ ગળવાની હદ ઉપયોગી ધોરણ છે. ૨. ૧-૨ ગ્રામ ૨ પીએએમ ૧૦ મિ.લી. ડિસ્ટિલ્ડ પાણીમાં ઓગાળો અને ૧૦-૧૫ મિનિટ સુધી ખૂબ ધીમેધીમે નસ વાટે ઇન્જેક્શનથી આપો. **વિષમયતાઃ** જો ખેતરમાં વાપરવા માટે કરેલી ભલામણ અનુસાર વાપરવામાં આવે તો આ ઉત્પાદન વિષમય નથી. **વપરાયેલા પાત્રનો નિકાલઃ** ૧. ઉત્પાદક, રચના તૈયાર કરનાર અને સંચાલકની એ ફરજ રહેશે કે પૅકેજીસ, વધારાની સામગ્રી અને ધોવાણ અને પાત્રોનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવામાં આવે જેથી પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ થતું અટકે. ૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો. ૩. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિવાળા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દો. **સંગ્રહની શરતોઃ** ૧. જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતી જગ્યા કે ઓરડીથી દૂર અલગ જગ્યા કે ઓરડીમાં અથવા જંતુનાશકની માત્રા અને પ્રકાર આધારે અલગ કબાટમાં તાળું-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઇએ. ૨. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની જગ્યા કે ઓરડી યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, યોગ્ય હવા ઉજાસ ધરાવતી અને પૂરતા વિસરવાળી હોવી જોઇએ.

રાસાયણિક રચનાઃ

ક્વિનલફૉસ ટેક.	(અલ્પતમ શુધ્ધતા ૭૦% સ.ઘ.)	૩૫.૭૦% વ/વ
સૉલ્વન્ટ ઝાયલીન	(ડાયમિથાઇલ બેન્ઝીન)	૫૪.30% વ/વ
ઇમલ્સિફાયર	(કૅલ્શિયમ અલ્કાઇલ અરાઇલ સલ્ફોનેટ અને પોલિ ઑક્સિ ઇથાયલીન ઇથર)	૧0.00% વ/વ
કુલઃ		૧00.00% વ/વ

GUJARATI

ফ্ল্যাশ কুইনালফস ২৫% ই সি কীটনাশক

কুইনালফস টেকনিক্যাল ভিত্তিক স্পর্শজনিত এবং পাকস্থলীজনিত বিষময় দ্রাবণশীল ঘনীভবন। আর মসুর, ধান, চা-পাতা, চীনেবাদাম, সরষে, লেবু, ফুলকপি, সয়াবিন চাষের নানা পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়।

সুপারিশ:

ফসল (সমূহ)	পোকার সাধারণ নাম	মাত্রা/হেক্টর			শেষ স্প্রে থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সঃ উঃ (গ্রাম)	ফর্মুলেশন (মিঃলিঃ)	অবধি (লিটার)	
ধান	বাদামী শোষক পোকা	৩৭৫	১৫০০	৫০০-১০০০	৪০
ধান	হিস্‌পা/নীল বিটল্	৫০০	২০০০	৫০০-১০০০	৪০
ধান	পাতামোড়া পোকা	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	৪০
ধান	মাজরা পোকা	৩২৫	১৩০০	৫০০-১০০০	৪০
মুসুর	শুঁটিছিদ্রক পোকা	৩৫০	১৪০০	৫০০-১০০০	৩০
মুসুর	শুঁটির মাছি	৩৫০	১৪০০	৫০০-১০০০	৩০
লঙ্কা	জাব পোকা	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	
লঙ্কা	মাকড়	৩৭৫	১৫০০	৫০০-১০০০	
চা-পাতা	চোষী পোকা	১৯০	৭৬০	৫০০-১০০০	৭
ছোলা	শুঁটিছিদ্রক পোকা	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	
চীনেবাদাম	পাতার শোষক পোকা, চোষী পোকা	৩৫০	১৪০০	৫০০-১০০০	৩০
চীনেবাদাম	পাতাখেকো পোকা	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	৩০
সরষে	সরষের করাত মাছি	৩০০	১২০০	৫০০-১০০০	
লেবু	আঁশ পোকা	০.০৭%	৪২০০-৫৬০০	৫০০-১০০০	
লেবু	লেবুর প্রজাপতি	০.০২৫%	১৫০০-২০০০	৫০০-১০০০	
ফুলকপি	মাজরা পোকা	৫০০	২০০০	৫০০-১০০০	
সয়াবিন	পাতার কেড়িপোকা	২৫০	১০০০	৫০০-১০০০	

ব্যবহার করার নির্দেশ: গাছ সুরক্ষার সরঞ্জাম - ব্যবহার করুন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারী স্প্রেয়ার বা অ্যাম্পী-এইচটিপি স্প্রেয়ার। **সতর্কতা:** ১. খাদ্যবস্তু, খালি বাসনপত্র এবং পশু খাদ্য থেকে দূরে রাখবেন। ২. মুখ, চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শ এড়াবেন। ৩. স্প্রে-কণা শ্বাসে নেওয়া এড়াবেন। হাওয়ার অনুকূলে স্প্রে করবেন। ৪. স্প্রে করার পর সংক্রমিত পোশাক ও দেহাংশ আগাগোড়া ধুয়ে নেবেন। ৫. স্প্রে করার সময় ধূমপান, পানীয় পান করা, খাওয়া এবং চেবানো নিষেধ। ৬. মেশানো ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরবেন। ৭. এটা ধানচাষের সঙ্গে একত্রে পিকিকালচার/অ্যাকুয়াকালচার উৎপাদিত হওয়ার এলাকাগুলোতে ব্যবহৃত করা যাবেই না। **বিষাক্ততার লক্ষণাদি:** মাথাধরা, মাথা ঝিমঝিম করা, গাবমি, বমি করা, ঘাম হওয়া, অত্যধিক অশ্রুপাত এবং লালা ঝরা ঘটতে পারে। **প্রাথমিক চিকিৎসা:** ১. গিলে ফেললে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করান। বমির তরল পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তা বারংবার করুন। রোগী অচৈতন্য থাকলে বমি করাতে চেষ্টা করবেন না। ২. পোশাক ও ত্বক সংক্রমিত হ'লে, পোশাক ছাড়িয়ে সংক্রমিত ত্বক সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে নেবেন। ৩. চোখ সংক্রমিত হ'লে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর স্যালাইন পরিষ্কার জল দিয়ে ঝাপ্টা দেবেন। ৪. শ্বাসে গেলে, রোগীকে মুক্তবায়ুতে সরিয়ে নিয়ে যান। **প্রতিষেধক:** ১. রোগীকে অবিলম্বে অ্যাট্রোপিনাইজ করবেন ও ৫ থেকে ১০ মিনিট অন্তর শিরার মধ্যে অ্যাট্রোপিন সালফেটের ২ থেকে ৪ মিঃগ্রাঃ মাত্রা বারংবার দিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাট্রোপিনাইজেশন বজায় রাখবেন। একদিনে সর্বাধিক ২৫ থেকে ৫০ মিঃগ্রাঃ অ্যাট্রোপিনের প্রয়োজন হতে পারে। পুনরায় অ্যাট্রোপিন প্রয়োগের প্রয়োজন পথনির্দেশিত হয় লক্ষণাদির নিরন্তরতার দ্বারা। মাত্রা কমবেশী করার জন্যে উপযোগী বিচারের মান হ'লো লালাঝরার ব্যাপ্তি। ২. ১০ মিঃলিঃ ডিস্টিল্ড ওয়াটারে ২ পিএএম-এর ১-২ গ্রাম ঘুলান এবং ১০-১৫ মিনিট ধরে অত্যন্ত ধীরে-ধীরে শিরার মধ্যে ইঞ্জেকশন দেবেন। **বিষাক্ততা:** ক্ষেতী সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবহৃতের ক্ষেত্রে উৎপাদটি বিষাক্ত নয়। **ব্যবহৃত প্যাকের বিনষ্টিকরণ:** ১. ছত্রাকনাশকের নির্মাতা, ফর্মূলাকারীদের এবং প্রচালনাকারীদের দায়িত্ব হবে, প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত পদার্থ ও ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করা যাতে পরিবেশ বা জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে যত্রতত্র ফেলে রাখবেননা। ৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতেই হবে। **মজুতকরণের অবস্থাদি:** ১. কীটনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য সামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্য পদার্থ মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর এবং চৌহদ্দি থেকে দূরে পৃথক ঘর এবং চৌহদ্দিতে মজুত করতে হবে, অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. কীটনাশক মজুতকরণের ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআচ্ছাদিত, বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ:

কুইনালফস টেকনিক্যাল	(ন্যূনতম বিশুদ্ধতা ৭০% সঃ উঃ)	৩৫.৭০% ওজন/ওজন
দ্রাবক জাইলিন	(ডাইমিথাইল বেঞ্জিন)	৫৪.৩০% ওজন/ওজন
অবদ্রব	(ক্যালসিয়াম অ্যালকাইল আরিল সালফোনেট এবং পলি অক্সি ইথাইলিন ইথার)	১০.০০% ওজন/ওজন
মোট:		১০০.০০% ওজন/ওজন

BENGALI

ਫ਼ਲੈਸ਼ ਕਵਿਨਲਫ਼ੋਸ 25% ਈ ਸੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਇਕ ਸਪਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਇਮਲਸੀਫ਼ਾਇਬਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜੋ ਕਵਿਨਲਫ਼ੋਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਹਰ, ਝੋਨਾ, ਚਾਹ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਿਟਰਸ, ਫੁਲ ਗੋਭੀ ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ.			ਅੰਤਮ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਨੁਸਖਾ (ਮਿਲੀ)	ਮਿਆਦ (ਲੀ.)	
ਝੋਨਾ	ਭੂਰਾ ਟਿੱਡਾ	375	1500	500-1000	40
ਝੋਨਾ	ਹਿਸਪਾ/ਨੀਲੇ ਭੂੰਡ	500	2000	500-1000	40
ਝੋਨਾ	ਪੱਤੀ ਲਪੇਟੂ	250	1000	500-1000	40
ਝੋਨਾ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ	325	1300	500-1000	40
ਅਰਹਰ	ਫਲੀ ਛੇਦਕ	350	1400	500-1000	30
ਅਰਹਰ	ਫਲੀ ਦੀ ਮੱਖੀ	350	1400	500-1000	30
ਮਿਰਚਾਂ	ਤੇਲੇ	250	1000	500-1000	
ਮਿਰਚਾਂ	ਮਕੜੀ	375	1500	500-1000	
ਚਾਹ	ਥ੍ਰਿਪਸ	190	760	500-1000	7
ਚਨਾ	ਫਲੀ ਛੇਦਕ	250	1000	500-1000	
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਪੱਤੀ ਟਿੱਡੇ, ਥ੍ਰਿਪਸ	350	1400	500-1000	30
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜੇ	250	1000	500-1000	30
ਸਰ੍ਹੋਂ	ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਆਰਾ ਮੱਖੀ	300	1200	500-1000	
ਸਿਟਰਸ	ਸਕੇਲ	0.07%	4200-5600	500-1000	
ਸਿਟਰਸ	ਸਿਟਰਸ ਤਿਤਲੀ	0.025%	1500-2000	500-1000	
ਫੁਲ ਗੋਭੀ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ	500	2000	500-1000	
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਪੱਤੀ ਵੀਵਲ	250	1000	500-1000	

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ: ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ - ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਯਾ ਏਐਸਪੀ-ਐਚਟੀਪੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਤੋ। **ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ**: 1. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਨਾ ਚਿੱਥੋ। 6. ਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। 7. ਜਿੱਥੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਨਾ ਵਰਤੋ। **ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ:** ਸਿਰਪੀੜ, ਚੱਕਰ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਲਾਰ ਦਾ ਟਪਕਣਾ। **ਫੋਰੀ ਇਲਾਜ:** 1. ਜੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੇ ਅੰਦਰ ਉਗਲਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਲਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤਕ ਉਲਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਆਏ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ। 2. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। 3. ਅੱਖਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਸਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। 4. ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਜਰੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ। **ਵਿਸ਼ਤੋੜ:** 1. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 2-4 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਸਲਫ਼ੇਟ ਹਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਦ ਨਸ ਵਿਚ ਦੇਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ 25-50 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬੁੱਕਾਂ ਵਗਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 2. 2 ਪੀਐਮ ਦੀ 1-2 ਗ੍ਰਾ. ਮਾਤਰਾ 10 ਮਿਲੀ ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਵਿਚ ਘੋਲਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਸ ਵਿਚ ਦਿਓ। **ਪੌਦ ਵਿਸ਼ਕਤਤਾ**: ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। **ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ**: 1. ਉਤਪਾਦਕ, ਨੁਸਖੇਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪੈਕਿਟਾਂ, ਵਧੂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਧੁਆਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਹਵਾਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। 2. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। 3. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੱਡ ਦਿਓ। **ਰਖਰਖਾਵ**: 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕਿਟ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਖਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰਕੇ ਰੱਖੋ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਰੌਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ:

ਕਵਿਨਲਫ਼ੋਸ ਟੈਕਨਿਕਲ	(ਨਿਊਨ. ਸ਼ੁੱਧਤਾ 70% ਏ.ਆਈ)	35.70% ਵ/ਵ
ਸਾਲਵੇਂਟ ਕਜ਼ਾਈਲੀਨ	(ਡਿਮਿਥਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ)	54.30% ਵ/ਵ
ਈਮਲਸੀਫ਼ਾਇਰ	(ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਅਲਕਾਇਲ ਐਰੀਲ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਆਕਸੀ ਈਥੀਲੀਨ ਈਥਰ)	10.00% ਵ/ਵ
ਕੁਲ:		100.00% ਵ/ਵ

PUNJABI

فلیش کوینالفوس25%ای سی جراثیم کش

یہ رابطے میں آنے اور پیٹ میں جانے پر اثر دکھانے والا کوینالفوس ٹیکنیکل کے مرکب پرمبنی ایک زہریلا ایملسیفائر ہے۔ جس کا استعمال چنا، دھان، چائے، مونگ پھلی، رائی، سائیٹرس، پھول گوبھی اور سویابین کی فصل میں کیڑوں پر قابو پانے کے لئے کیاجاتا ہے۔

سفارشات:

فصل	بیماریوں کے عام نام	مقدار فی ہیکٹر			فصل پرآخری چھڑکاؤ کے بعد سے انتظار کی مدت (دنوں میں)
		اے آئی (گرام)	مرکب (گرام)	حلول (لیٹر)	
دھان	پلانٹ ہوپر،	375	1500	500-1000	40
دھان	ہسپا۔ بلیو بیٹل	500	2000	500-1000	40
دھان	پتوں کوموڑنے والاکیڑا	250	1000	500-1000	40
دھان	اسٹیم بورر	325	1300	500-1000	40
ارہر	پوڈ بورر	350	1400	500-1000	30
ارہر	پوڈ مکھی	350	1400	500-1000	30
مرچ	ایفڈ	250	1000	500-1000	
مرچ	گھن	375	1500	500-1000	
چائے	تھرپس	190	760	500-1000	7
چنا	پوڈ بورر	250	1000	500-1000	
مونگ پھلی	لیف ہوپر تھرپس	350	1400	500-1000	30
مونگ پھلی	لیف مائنر	250	1000	500-1000	30
رائی	مسٹرڈ سوافلائے	300	1200	500-1000	
سائٹرس	اسکیل	0.07%	4200-5600	500-1000	
سائٹرس	سائٹرس بٹرفلائی	0.025%	1500-2000	500-1000	
پھول گوبھی	اسٹیم بورر	500	2000	500-1000	
سویابین	لیف ویول	250	1000	500-1000	

استعمال کے لئے ہدایات: اس کا استعمال ایسے علاقے میں نہیں کیا جانا چاہئے جہاں چاول کی فصل کے ساتھ پکی کلچر۔ ایکوا کلچر پیدا کی جاتی ہو۔ **پودوں کے تحفظاتی سازو سامان:** نیپ سیک اسپریئر، فٹ اسپریئر، کمپریشن نیپ سیک اسپریئر، کمپریشن نیپ سیک بیٹری اسپریئراوراسپی۔ ایچ ٹی پی پاوراسپریئر۔ احتیاط: 1۔کھانے پینے کی اشیاء،کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے خالی ڈبوں اور جانوروں کی خوراک سے دور رکھیں۔ 2۔منہ، آنکھیں اورجلد پر لگنے سے بچائیں۔ 3۔چھڑکاؤ کے دوران اس کے ذرات منہ میں جانے سے بچائیں۔ اس کا چھڑکاؤ ہوا کی سمت میں کریں۔ 4۔چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اورجسم کے آلودہ حصوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ 5۔چھڑکاؤ کرتے وقت سگریٹ نوشی اورکوئی شئے کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ 6۔محلول بنانے اور چھڑکاؤ کرنے کے دوران حفاظتی کپڑے پہنیں۔ **فائٹو ٹاکسی سٹی:** فیلڈ سفارشات کے مطابق استعمال کرنے پر یہ پروڈکٹ فائٹوٹاکسک نہیں ہے۔ **زہر کی علامتیں:** سردرد، چکر، متلی، قے، آنکھوں سے دھندلا دکھائی دینا، لیکریمیشن، تھوک نکلنا۔ **ابتدائی طبی تدابیر: 1**۔پروڈکٹ حلق کے نیچے جانے پر گلے میں انگلی ڈال کر قے کرائیں۔صاف قے ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اگرمریض بے ہوش ہوتو قے نہ کروائیں۔ 2۔اگرکپڑے اورجسم آلودہ ہےتو کپڑے نکالیں اورجسم کے آلودہ حصوں کو ڈھیر سارے صابن اور پانی سے دھوئیں۔ 3۔اگرآنکھیں آلودہ ہوگئی ہوں تو ڈھیر سارے کشید کئے ہوئے پانی یاصاف پانی سے 10 سے 15منٹ تک اسے چھپاکے دیں۔ 4۔اگرحلق کے نیچے چلا گیا ہوں تو مریض کوکھلی ہوا میں لے آئیں۔ **تریاق: 1)** مریض کوفوراًایٹروپینائز کریں اوراسے تواتر کے ساتھ 5 سے 10منٹ کے وقفے سے ایٹروپائن سلفیٹ کے 2 سے 4ملی گرام ڈوزنسوں کے ذریعے دیں۔ ایک دن میں 25 سے 50ملی گرام تک ایٹروپائن درکار ہوگا۔ مزید ایٹروپائن کا استعمال علامتوں کے ظاہر ہونے کے عین مطابق ہوگا۔ اس کی خوراک دینے کاتعین آب تھوک (جھاگ) نکلنے سے کرسکتے ہیں۔ 2) 1-2 گرام پی اے ایم 10ملی لیٹرکشید کئے گئے پانی میں حلول کریں اوراسے 10 سے 15منٹ تک بہت دھیرے دھیرے سےنسوں کے ذریعے مریض کےجسم میں داخل کریں۔ **استعمال شدہ ڈبوں کا زیاں: 1**۔اس پروڈکٹ کوتیار کرنے اوراسے استعمال کرنے والوں کی ذمے داری ہے کہ وہ اضافی مال اوراستعمال شدہ ڈبوں اورمشین اورڈبوں سے نکلنے والی دھلن کواس طرح کسی محفوظ مقام پرضائع کریں کہ اس سے کسی بھی طرح کی ماحولیاتی اورآبی آلودگی نہ ہو۔ 2۔استعمال شدہ ڈبوں کے دوبارہ استعمال نہ ہوسکے اس لئے ان ڈبوں کو باہر کھلے میں نہ پھینکیں۔ 3۔ پیکیجس کوتوڑکرآبادی سے باہر دفن کردینا چاہئے۔ **ذخیرہ اندوزی کے لئے شرائط: 1**۔جراثیم کش کے ڈبوں کوایک الگ کمرے یا جگہ پران کمروں یاجگہوں سے دوررکھاجاناچاہئے جن کا استعمال کھانے پینے کی اشیاء رکھنے کے لئے ہوتا ہے۔ جراثیم کش دوا کی مقداراوران کی فطرت کے مطابق انہیں ایک الگ الماری میں مقفل رکھناچاہئے۔ 2۔جراثیم کش دوائیں رکھنے کے لئے بنائے گئے کمرے روشن، اچھی طرح تعمیر کئے گئے، خشک، ٹھنڈے، ہوادار اوراچھے خاصے بڑے ہونے چاہئیں تاکہ ان دواؤں سے اٹھنے والے بخارات سے بچاجاسکے۔

کیمیائی مرکبات:

کوینالفوس ٹیکنیکل	(کم سے کم70%اے آئی خالص)	35.70% w/w
سالوینٹ زائلین	(ڈی میتھائیل بینزین)	54.30% w/w
ایملسیفائر	(کیلشیم الکائل ایرل سلفونیٹ اور پولی آکسی اینتھیلین اینتھر)	10.00% w/w
کل:		100.00% w/w

URDU