Motive®

Mancozeb 68% + Hexaconazole 4% w/w WG

(Systemic & Contact Fungicide)

For Agricultural use.

Mancozeb 68% + Hexaconazole 4% w/w WG is a broad spectrum systemic and contact fungicide.

Recommendation

Crop	Common name of diseases	Dosage per hectare			Pre- harvesting interval (days)
		a.i. (g)	Formulation (g)	Water (Litre)	
Rice (Paddy)	Blast, Sheath blight, Brown spot and Grain discoloration	850+50	1250	500	30

Direction of use : It is used for control of diseases of Paddy crop as per recommendation. Take the measured quantity of fungicide as per recommendation and add to it small quantity of water. Stir thoroughly using a wooden stick and then add the remaining quantity of water stir well to form fine spray solution. **Weather condition :** Do not apply fungicides just before rain and avoid spray during windy days. **Soil and water :** There should be sufficient moisture in the soil while spraying of fungicides. **Crop stage of application :** Vegetative and Productive. **Application Technique :** Application to be done during morning or evening time. Do not apply just before rain and avoid spray during windy days. At a time of application there should be sufficient moisture in the soil. It should be applied in crops, crop stage and with dosage as mentioned in recommendation. Maintain the frequency of application, pre-harvest interval and re-entry period as specify in recommendation. **Equipment and Nozzle type :** Application should be done by using high volume spray fitted with low drift nozzle as per the recommended dose viz. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer and ASPEE-HTP power sprayer. **Instruction for mixing :** The mixing of fungicide to be done as mentioned in recommendation of use. **Re-entry period : 24** hrs **Manner and time of Application :** Application should be done on appearance of disease symptoms on the crop by using high volume spray fitted with low drift nozzle viz. Knapsack sprayer or foot sprayer, etc as per recommended dose. **Spraying mixture :** Application to be done during morning or evening time. **Frequency including maximum no. of spray :** 1-3 sprays depending on disease intensity. **Stages during which pesticide should not applied :** It should be applied in crops, crop stage and with dosage as mentioned in recommendation. **Phytotoxicity :** The product is non phytotoxic when used as per field recommendation **Precautions : 1.** Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat nor chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask while mixing and spraying. **Cautionary statements :** 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. It is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture or pisciculture area. 4. Wear plant protection equipment as mentioned in precautions. **5. Dangerous to re-use empty container. Symptoms of poisoning :** Nasal discharge, hypoactivity, lachrymation, hypersalivation, allergic, redness, palpitation, nausea, vomiting, diarrhoea, hypothermia, nervousness, headache, dizziness, may occur. **First aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing & skin contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If chemical is inhaled, get the victim into fresh air. Apply artificial respiration if breathing has stopped. 5. Call the doctor immediately. **Antidote :** Atropine sulphate. **Caution to doctor :** Anticholinesterase activity is known. Treat symptomatically. **Disposal of Used Container :** 1. It shall be the duty of manufacturer, formulators of fungicides and operators to dispose off the washings and surplus materials in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their misuse. 3. The package shall be broken and buried away from habitation. **Storage conditions :** 1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms and premises, away from the room and premises used for storing other articles particularly food or stuff meant for human consumption. 2. The room and premises must be dry and nature of pesticide. 2. The room and premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

Mancozeb a.i.	68.00
Hexaconazole a.i	04.00
Sodium salt of alkyl naphthalene sulfonate condensate	03.90
Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated	03.90
Sodium ligno sulphonate	02.20
Sodium lauryl sulphate	03.00
Hexamethylenetetramine	00.50
Silicon defoaming agent	01.00
Kaolin clay	Q.S.
Total	**100.00**

Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet.

English

मोटिव

मॅन्कोझेब ६८% + हेक्साकोनॅझोल ४% भार/भार (डब्ल्यू जी)

(अंतरप्रवाही और स्पर्शीय फफूँदीनाशक)

कृषि उपयोग के लिए।

मैनकोझेब ६८% + हेक्साकोनॅझोल ४% भार/भार डब्ल्यू जी यह एक बृहत्कार्यक्षम अंतरप्रवाही और स्पर्शीय फफूँदीनाशक है।

उपयोग

फसल	रोग का नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अनिम छिड़काव तथा फसल कटाने के बीच अंतराल (दिन)
		स.त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी (लीटर)	
धान	ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, तपकिरी डाग अनि धान्य रंगीन ठेडी फ्रो	८५०+५०	१२५०	५००	३०

उपयोग के लिए निर्देश : इसका उपयोग धान की फसल में रोगों के नियंत्रण के लिए सिफारिश के अनुसार किया जाता है। सिफारिश के अनुसार फफूँदीनाशक की मात्रा मापकर ली और इसमें थोड़ी मात्रा में पानी मिलाएं। एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग कर अच्छी तरह से हिलाएं और फिर अतिरिक्त पानि बनाने के लिए पानी की शेष मात्रा को अच्छी तरह से मिलाएं। **मौसम की स्थिति :** बारिश से ठीक पहले फफूँदीनाशक का छिड़काव न करें और हवा चलने वाले दिनों में भी छिड़काव करने से बचें। **मिट्टी और पानी :** फफूँदीनाशक का छिड़काव करते समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। **आवेदन के लिए फसल अवस्था :** वानस्पतिवृद्धी व फलधारण **उपयोग तकनीक :** शाखीय वाढ़ और उत्पादक. फफूँदीनाशक का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। बारिश से ठीक पहले छिड़काव न करें और तेज हवा चलने वाले दिनों में छिड़काव से बचें। छिड़काव के समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। इसे फसलों, फसल की अवस्था और खुराक के साथ सिफारिश के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। **पीक छिड़काव :** फफूँदीनाशक का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। छिड़काव की मात्रा और आवृत्ति सिफारिश के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। सिफारिश में निर्दिष्ट अनुसार उपयोग की आवृत्ति, अनिम छिड़काव तथा फसल कटाने के बीच अंतराल और पुन: प्रवेश की अवधि बनाए रखें। **उपकरण और नोजल प्रकार :** सिफारिश की गई खुराक के अनुसार कम बहाव वाले नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम वाले स्प्रेयर का उपयोग करें जैसे नैपसैक स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर या कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई. एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर या उपयोग करना चाहिए। **मिश्रण के लिए निर्देश :** फफूँदीनाशक का मिश्रण उपयोग के निर्देश में उल्लिखित के अनुसार करना चाहिए। **पुन: प्रविष्टि : 24** घंटे **रीति और अनुप्रयोग का समय :** फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसका उपयोग करना चाहिए। कम बहाव वाले नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे, जैसे नैपसैक स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर आदि का उपयोग सिफारिश के अनुसार करना चाहिए। **आवेदन का समय :** फफूँदीनाशक का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। **अधिकतम स्प्रे सहित आवृत्ति :** १-३ छिड़काव रोग की तीव्रता पर निर्भर है। **पौध अवस्था जिसके दौरान कीटनाशक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए :** इसे फसलों, फसल की अवस्था और खुराक के साथ सिफारिश के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। **पौध विषाक्तता :** सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर यह उपयोग पौध विषाक्त नहीं है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १.** खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बे और पशु चारे से दूर रखें। **२.** मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें। **३.** छिड़काव करते समय सांस लेने से बचें, हवा के बहने की दिशा में छिड़काव करें। **४.** उपयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धो लें। **५.** उपयोग करते समय धूम्रपान करना पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। **६.** पूरी सुरक्षात्मी वस्त्र जैसे कि पूरा आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट, केमिकल प्रतिरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, टोपा तथा मास्क मिक्स करते व छिड़काव करते समय पहनें। **सावधानियां वक्तव्य : १.** लेबल और पर्चियों पर जो अभिहित है, उसके सिवा अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। **२.** पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आधान को नष्ट करें। **३.** यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल स्रोतों के पास नहीं करना चाहिए। **४.** सिफारिश किए गए सुरक्षात्मक उपकरणों पहनें। **५. खाली कंटेनर का पुन: उपयोग खतरनाक है। विषाक्तिकरण के लक्षण :** नाक बहना, हायपोएक्टिविटी, रुकावट, अत्यधिक लार, एलर्जिक, लालरंगपना, धड़कन, मतली, उलटना, अतिसार, उदासीनता, शोकेदुखी, भोजन रोग, होश कमते. **प्रथमोपचार :** १. अगर निगल लिया, तो गले के पीछे गुदगुदी कर उल्टी प्रेरित करें। उल्टी साफ होने तक दोहराएं। यदि रोगी बेहोश हो तो उल्टी प्रेरित न करें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित है, तो कपड़े उतार दें और बहुत साबुन और पानी से त्वचा को अच्छी तरह से धोएं। ३. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको कपड़े साफ करने के लिए पानी का छींटा मारें। ४. यदि रसायन निगल लिया हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ५. तत्काल डॉक्टरल सेवाएं. **डॉक्टर/चिकित्सक सलाह :** विषाक्त लक्षण ज्ञात नहीं. **सावधानियां उपचार कर :** **सावधानियां कंटेनरों की विल्हेवाट :** १. अधिकारी कीटनाशक और सामग्री आपि मानिमानीय सिफारियों पर्यावरणशा आपि पाण्याच्या प्रदुषणाचा धोका टाळण्यासाठी **धारणी ठेवि हाँडेल** आपा एकत्रित पुढारीत विल्हेवाट लावावी ही उपादान, मिश्रक आपि वापरकर्ते यांची जबाबदारी असेल. २. वापरलेले कंटेनर पुन्हा वापरले जाऊ नयेत म्हणून त्यांचा वापर टाळावा. ३. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर सर्व साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागेपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत साठवावीत किंवा कीटकनाशकाचे साठवण करताना इतर वस्तू किंवा अन्नासाठी वापरले जाणारे पदार्थ असे वेगळे ठेवावे. **साठवण :** कीटकनाशक असलेले पॅकेजेस इतर सर्व वापरले जाणारे साहित्यापासून वेगळ्या खोल्या किंवा जागेपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत साठवावीत किंवा अन्नासाठी साठवलेल्या वस्तूंपासून वेगळे ठेवावे. २. खोली कोरडी आणि नैसर्गिक असावी. ३. पॅकेजेस खोलीत आणि जागेत आणि कीटकनाशकाचे स्वरूप. ४. फफवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे अवयव चांगले स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करत असताना धूम्रपान करू नका, काहीही पिऊ, खाऊ किंवा चघळू नका. ६. सिंचन पाण्याचे स्रोत, तलाव, नद्या, ओढे, विहीर, कूपनलिका, बोअरवेल आदि जलाशय हाताळताना आणि मिसळताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे, बूट, गॉगल, हॅट आणि मास्क यासारखे संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला. **सावधिगिरीचे विधान :** १. लेबल आणि माहितीपत्रकावर नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापरू नका. २. माहितीपत्रकात निर्देशित्याप्रमाणे वापरानंतर कंटेनर नष्ट करा. ३ ते जलचरांसाठी विषारी आहे त्यामुळे पाण्याचे साठे, मत्स्यपालन किंवा पीसीकल्चरच्या जवळपास वापरू नका. ४. सावधगिरीच्या मुद्दे केलेल्याप्रमाणे पीक संरक्षण उपकरणे घाला. **५. रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे. विषबाधेची लक्षणे:** नाक वाहणे, हायपोएक्टिविटी, रुकावट, अत्यधिक लार, एलर्जिक, लालरंगपना, धडकन, मतली, उलटणा, अतिसार, उदासीनता, डोकेदुखी, भोजन रोग, होश कमते. **प्रथमोपचार :** १. जर गिळले असेल तर घशाच्या मागच्या बाजूला गुदगुल्या करून उलटीला उत्तेजित करा. उलटीचा द्रव स्पष्ट होईपर्यंत हे पुन्हा पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असेल तर उलटीला उत्तेजित करू नका. २. कपडे आणि त्वचा दूषित झाली असेल तर, कपडे काढा आणि दूषित त्वचा भरपूर पाणी आणि साबणाने धुवा. ३. डोळे दूषित झाले असतील तर, सुमारे १० ते १५ मिनिटे भरपूर स्वच्छ पाण्याने स्प्रेक्ष मारा. ४. रसायन श्वासात आत गेलेले असेल तर, बाधितला ताजा हवेत हलवा. कृत्रिम श्वासोच्छ्वास असेल तर कृत्रिम श्वास द्या. ५. तात्काळ डॉक्टरला बोलवा. **डॉक्टर/चिकित्सकाला सल्ला :** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १. यह निर्माता, फफूँदीनाशक निर्माता और ऑपरेटर का कर्तव्य है की धोवन और अधिक सामग्री आणि का निपटान सुरक्षित रूप से करें, जिससे पर्यावरण और पानी में प्रदूषण न हो। २. उपयोग किए जा चुके पैकेजों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे इनका दुरुपयोग न हो सके। ३. पैकेज को तोड़कर दफना दिया जाना चाहिए। **संग्रहण की शर्तें :** १. फफूँदीनाशक युक्त पैकेजों को अलग कमरे या परिसर में संग्रहीत करना चाहिए, जो अन्य सामानों विशेषकर खाद्य पदार्थों और पशु चारे को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर रहे और इसे तापरोधी के तहत अलग अलमारी में रखना चाहिए। २. फफूँदीनाशक भंडारण वाला कमरा या परिसर अच्छी तरह से हवादार, अच्छी तरह हवादार और वाष्प से संतृप्त से बचने के लिए पर्याप्त आयाम का होना चाहिए।

रासायनिक संरचना:

मैनकोझेब स.त.	६८.००
हेक्साकोनॅझोल स.त.	०४.००
सोडियम लाउरल ऑल अल्कील नाफथालीन सल्फोनेट कन्डेन्सेट	०३.९०
सिंग्नोसल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट, सल्फोमेथाइलेटेड	०३.९०
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	०२.२०
सोडियम लॉरील सल्फेट	०३.००
हेक्साथियाइलीनटेट्रामाइन	००.५०
सिलिकॉन डिफोमिंग एजंट	०१.००
काओलिन क्ले	पूर्ण
कुल	**१००.००**

सावधान: या पत्रिकेत/पत्रिकामां नमूदकरेलाया पिकांखेरीज अन्य पिकांवर वापर करू नये.

Marathi

मोटिव

मॅन्कोझेब ६८% + हेक्साकोनाझोल ४% भा/भा डब्ल्यूजी

(अंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक)

शेतीविषयक उपयोगासाठी.

मॅन्कोझेब ६८% + हेक्साकोनाझोल ४% भा/भा डब्ल्यूजी हे एक व्यापक-स्पेक्ट्रम अंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक आहे.

शिफारस:

पीक	रोगाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा			कापणी-पूर्व मध्यांतर (दिवस)
		स.घ. (ग्रा)	मिश्रण (ग्रा)	पाणी (लीटर)	
तांदूळ (भात)	ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, तपकिरी डाग आणि धान्य रंगीन ठेडी फ्रो	८५०+५०	१२५०	५००	३०

वापरण्याची निर्देश : याचा वापर भातावरील रोगांच्या नियंत्रणासाठी शिफारशीनुसार केला जातो. शिफारशीनुसार बुरशीनाशक मोजून घ्या आणि ते थोड्या पाण्यात टाका. लाकडी काठी वापरून चांगले ढवळा आणि नंतर उर्वरित पाणी घाला आणि फवारणीचे द्रावण तयार करण्यासाठी ढवळा. **हवामान:** पावसाळ्यापूर्वी बुरशीनाशक आणि वारा असताना फवारणी बुरशीनाशक फवारू नका. **माती आणि पाणी:** बुरशीनाशकाची फवारणी करताना माती पुरेसा ओलावा असावा. **फवारणीसाठी पीकाचा टप्पा:** शाखीय वाढ आणि उत्पादक. **फवारणीचे तंत्र:** फवारणी सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या वेळात करावी. पावसाच्या अगदी आधी फवारणी करून नका आणि वारा वाहत असताना दिवसी फवारणी टाळा. फवारणीच्या वेळी माती पुरेसा ओलावा असावा. **वारंवारता आणि फवारणीची संख्या:** रोगाच्या तीव्रतेवर अवलंबून १-३ फवारण्या. पीकाच्या टप्प्यात आणि मात्रेत फवारणी. शिफारशीत नमूद केल्याप्रमाणे फवारणीची वारंवारता, काप्णी-पूर्व मध्यांतर आणि पुन्हा प्रवेश कालावधी राखा. **उपकरण आणि नोजल प्रकार :** सिफारिशी ची गई खुराक के अनुसार कम बहाव वाले नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे जैसे नैपसैक स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर या कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई. एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर का उपयोग करना चाहिए। **मिश्रण के लिए निर्देश :** फफूँदीनाशक का मिश्रण उपयोग के निर्देश में उल्लिखित के अनुसार करना चाहिए। **पुन: प्रविष्टि : 24** घंटे **रीति और अनुप्रयोग का समय :** फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसका उपयोग करना चाहिए। कम बहाव वाले नोजल के साथ फिट किए गए उच्च वॉल्यूम स्प्रे, जैसे नैपसैक स्प्रेयर या फुट स्प्रेयर आदि का उपयोग सिफारिश के अनुसार करना चाहिए। **आवेदन का समय :** फफूँदीनाशक का छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। **अधिकतम स्प्रे सहित आवृत्ति :** १-३ छिड़काव रोग की तीव्रता पर निर्भर है। **पौध अवस्था जिसके दौरान कीटनाशक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए :** इसे फसलों, फसल की अवस्था और खुराक के साथ सिफारिश के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। **पौध विषाक्तता :** सिफारिश के अनुसार उपयोग किए जाने पर यह उपयोग पौध विषाक्त नहीं है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १.** खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थों के खाली डिब्बे और पशु चारे से दूर रखें। **२.** मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें। **३.** छिड़काव करते समय सांस लेने से बचें, हवा के बहने की दिशा में छिड़काव करें। **४.** उपयोग के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धो लें। **५.** उपयोग करते समय धूम्रपान करना पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। **६.** पूरी सुरक्षात्मी वस्त्र जैसे कि पूरा आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट, केमिकल प्रतिरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, टोपा तथा मास्क मिक्स करते व छिड़काव करते समय पहनें। **सावधानियां वक्तव्य : १.** लेबल और पर्चियों पर जो अभिहित है, उसके सिवा अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं। **२.** पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात आधान को नष्ट करें। **३.** यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल स्रोतों के पास नहीं करना चाहिए। **४.** सिफारिश किए गए सुरक्षात्मक उपकरणों पहनें। **५. खाली कंटेनर का पुन: उपयोग खतरनाक है। विषाक्तिकरण के लक्षण :** नाक बहना, हायपोएक्टिविटी, रुकावट, अत्यधिक लार, एलर्जिक, लालरंगपना, धड़कन, मतली, उलटणा, अतिसार, उदासीनता, डोकेदुखी, भोजन रोग, होश कमते. **प्रथमोपचार :** १. अगर निगल लिया, तो गले के पीछे गुदगुदी कर उल्टी प्रेरित करें। उल्टी साफ होने तक दोहराएं। यदि रोगी बेहोश हो तो उल्टी प्रेरित न करें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित है, तो कपड़े उतार दें और बहुत साबुन और पानी से त्वचा को अच्छी तरह से धोएं। ३. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको कपड़े साफ करने के लिए पानी का छींटा मारें। ४. यदि रसायन निगल लिया हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ५. तत्काल डॉक्टरल सेवाएं. **डॉक्टर/चिकित्सक सलाह :** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १. यह निर्माता, फफूँदीनाशक निर्माता और ऑपरेटर का कर्तव्य है की धोवन और अधिक सामग्री आणि का निपटान सुरक्षित रूप से करें, जिससे पर्यावरण और पानी में प्रदूषण न हो। २. उपयोग किए जा चुके पैकेजों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे इनका दुरुपयोग न हो सके। ३. पैकेज को तोड़कर दफना दिया जाना चाहिए। **संग्रहण की शर्तें :** १. फफूँदीनाशक युक्त पैकेजों को अलग कमरे या परिसर में संग्रहीत करना चाहिए, जो अन्य सामानों विशेषकर खाद्य पदार्थों और पशु चारे को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर रहे और इसे तापरोधी के तहत अलग अलमारी में रखना चाहिए। २. फफूँदीनाशक भंडारण वाला कमरा या परिसर अच्छी तरह से हवादार, अच्छी तरह हवादार और वाष्प से संतृप्त से बचने के लिए पर्याप्त आयाम का होना चाहिए।

रासायनिक संरचना:

मैनकोझेब स.त.	६८.००
हेक्साकोनॅझोल स.त.	०४.००
अल्काइल नॅफ्थालिन सल्फोनेट कंडेन्सेटचे सोडियम सॉल्ट	०३.९०
लिग्नोसल्फोनिक ॲसिड, सोडियम सॉल्ट, सल्फोमेथाइलेटेड	०३.९०
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	०२.२०
सोडियम लॉरील सल्फेट	०३.००
हेक्साथियाइलीनटेट्रामाइन	००.५०
सिलिकॉन डिफोमिंग एजंट	०१.००
काओलिन क्ले	पूरता प्रमाणात
एकूण	**१००.००**

खबरदारी : या लेबलवर / पुस्तिकेमध्ये दिलेल्या पिकांखेरीज इतरांवर वापर करू नये.

Gujarati

मोटिव

ম্যানকোজেব ৬৮% + হেক্সাকোনাজোল ৪% ডব্লিউ/ডব্লিউ ডব্লিউজি

(সিস্টেমিক ও স্পর্শীয় ফুঙ্গিসাইড)

ফুঙ্গি ব্যবহারের জন্যে।

মেনকোজেব ৬৮% + হেক্সাকোনাজোল ৪% ডব্লিউ/ডব্লিউ ডব্লিউজি. হিচ বিস্তৃতপথ ব্যয়ক্ষমতাবাহী এবং স্পর্শীয় ফুঙ্গিসাইড হিচ সংক্রামী ফুঙ্গিসাইড।

ব্যবহার

ধানের রোগের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা			অনিম ছিড়কাব তথা ফসল কাটার মধ্যে ব্যবধান (দিন)
	স.ত. (গ্রাম)	সংরচনা (গ্রাম)	পানী (লিটার)	
ব্লাস্ট, শীথ ব্লাইট, ব্রাউন স্পট আর গ্রেইনের বর্ণ সমানি রোগ	८५०+५०	१२५०	५००	३०

ব্যবহারের নির্দেশ : ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করে ধানের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্যে ব্যবহার করা হয়। সুপারিশ অনুসারে ফুঙ্গিসাইডের পরিমাণ মেপে নিন এবং সামান্য পরিমাণে পানী যোগ দিন। কাঠের মাপি ব্যবহার করে ভালোভাবে নাড়ুন আর তারপর বাকি পানী যোগ করে মিশ্রণ তৈরি করুন। **আবহাওয়া অবস্থা :** বৃষ্টির পূর্বে ফুঙ্গিসাইডের ব্যবহার করবেন না এবং জোরে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সময়ে ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করবেন না। **মাটি ও পানী :** ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার সময়ে মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকতে হবে। **প্রয়োগের জন্যে ফসলের পর্যায় :** বানস্পতি এবং উৎপাদনশীল পর্যায়। **প্রয়োগ কৌশল :** সকাল বা বিকেলের সময় ফসলকীটনাশক প্রয়োগ করবেন। ঠিক বৃষ্টির পূর্বে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করবেন না এবং জোরে হাওয়া বয়ে যাওয়ার সময়ে ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করবেন না। প্রয়োগ করার সময়ে মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকতে হবে। সুপারিশে উল্লেখিত অনুযায়ী ফসলগুলি, ফসল পর্যায় এবং মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। সুপারিশে নির্দিষ্ট করা মতো প্রয়োগের পুনঃপুনঃত্বা, ফসল সংগ্রহ-পূর্বক বিরতি এবং পুনঃপ্রবেশ সময়কাল বজায় রাখতে হবে। **সরঞ্জাম এবং নজলের প্রকার :** সুপারিশকৃত মাত্রা অনুসারে যে নিম্ন ড্রিফ নজল দিয়ে উচ্চ ভলিউম স্প্রে ব্যবহার করে ফুঙ্গিসাইড প্রয়োগ করা উচিত। নাপসাক স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন নাপসাক স্প্রেয়ার এবং আস্পী-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করার দ্বারা প্রয়োগ করতে হবে। **পুনঃ প্রবেশ সময়কাল :** ২৪ ঘণ্টা। **প্রয়োগের পদ্ধতি ও সময় :** রোগের লক্ষণগুলি দেখা যাওয়ার পরে নিম্ন ড্রিফ নজল লাগানো উচ্চ ভলিউম স্প্রে ব্যবহার করে নাপসাক স্প্রেয়ার বা ফুট স্প্রেয়ার প্রভৃতির মাধ্যমে সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। **স্প্রে মিশ্রণ :** সকাল বা বিকেলের সময় ফসলকীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। **সর্বোচ্চ সংখ্যা সহ ফ্রিকোয়েন্সি :** রোগের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ১-৩ বার স্প্রে করা হবে। **ফসল পর্যায় যেসময়ে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয় :** রোগের লক্ষণ দেখা যাওয়ার পরে এটি প্রয়োগ করতে হবে। **ফাইটোটক্সিসিটি :** সুপারিশ অনুসারে ব্যবহার করেও এই উৎপাদন **সতর্কতা : ১.** খাদ্য পদার্থ, খালি খাদ্য পাত্র এবং পশু খাদ্য থেকে দূরে রাখবেন। **২.** মুখ, চোখ এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়াবেন। **৩.** স্প্রেয়ার ধোঁয়া এড়াবেন। **৪.** স্প্রেয়ার করার সময় ধূমপান করবেন না, খাবেন না এবং কিছু চিবাবেন না। **৫.** স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরবেন। **সতর্কবাণী বক্তব্য : ১.** লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন না। **২.** প্রয়োগের পরে পাত্রটি ধ্বংস করে দিন। **৩.** এটি জলজ জীবের জন্য বিষাক্ত। **৪.** প্রয়োগের সময় সুরক্ষামূলক পোশাক পরুন। **৫. খালি পাত্রগুলি পুনরায় ব্যবহার করবেন না। বিষক্রিয়ার লক্ষণ :** নাক দিয়ে জল পড়া, অলস ভাব, দুর্বল হৃৎপিণ্ড, লালা নিঃসরণ, এলার্জি, ফুসকুড়ি, বমি, বমি ভাব, পেটের গোলমাল, অতিসার, অবসাদ, মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, ত্বকের রোগ, হৃদকম্পন, অজ্ঞান, বিভ্রান্তি, বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। **প্রাথমিক চিকিৎসা :** ১. গলায় গিলে ফেলে থাকলে গলার পিছনে গুদগুদি দিয়ে বমি করান। বমি স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত এটি পুনরাবৃত্তি করুন। অচেতন অবস্থায় বমি করাবেন না। ২. যদি পোষাক এবং ত্বক দূষিত হয়ে থাকে, তাহলে জামাকাপড় খুলে ফেলুন এবং দূষিত ত্বক প্রচুর পরিমাণ সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৩. যদি চোখ দূষিত হয়ে থাকে তাহলে প্রচুর পরিষ্কার জল দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধুয়ে ফেলুন। ৪. যদি রাসায়ন শ্বাসের সঙ্গে ভেতরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে রোগীকে তাজা বাতাসে নিয়ে যান। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দিন। ৫. তাৎক্ষণিক ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। **ডॉক্টর/চিকিৎসকের জন্যে সতর্কতা :** কোনো বিষনাশক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন। **ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি :** ১. প্রস্তুতকারক, ফুঙ্গিসাইড প্রস্তুতকারক এবং অপারেটরদের উচিত ধোয়া এবং অতিরিক্ত উপাদানগুলি নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি করা যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ না হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলি বাইরে ফেলে দেওয়া উচিত নয় যাতে এগুলির অপব্যবহার না হয়। ৩. প্যাকেজ ভেঙ্গে দিয়ে বাসস্থান থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত। **স্টোরেজ শর্তাবলি :** ১. ফুঙ্গিসাইড ধারণকারী প্যাকেজগুলি অন্যান্য জিনিস বিশেষত খাদ্য বা পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর থেকে দূরে পৃথক ঘর বা পরিসরে সংরক্ষণ করতে হবে। ২. ঘর বা পরিসর শুষ্ক হওয়া উচিত এবং কীটনাশক প্রকৃতি। **রাসায়নিক গঠন :**

মেনকোজেব স.ত.	৬৮.০০
হেক্সাকোনাজোল স.ত.	০৪.০০
অ্যালকাইল নেপথালিন সল্ফোনেট কন্ডেন্সেটের সোডিয়াম সॉল্ট	০৩.৯০
লিগ্নোসালফোনিক এসিড, সোডিয়াম সॉল্ট, সল্ফোমিথাইলেটেড	০৩.৯০
সোডিয়াম লিগ্নো সল্ফোনেট	০২.২০
সোডিয়াম লরেল সল্ফেট	০৩.০০
হেক্সামেথাইলেনটেট্রামাইন	০০.৫০
সিলিকন ডিফোমিং এজেন্ট	০১.০০
কাওলিন ক্লে	পর্যাপ্ত
মোট	**১০০.০০**

সতর্কতা বিবৃতি : লেবেল / লিফলেটে উল্লিখিত ফসল ব্যতীত অন্য কিছুতে ব্যবহার করবেন না।

Bengali

Motive®

Mancozeb 68% + Hexaconazole 4% w/w WG

(Systemic & Contact Fungicide)

कृषिकार्य व्यवहारतत जन्ये।

मॅन्कोझेब ६८% + हेक्साकोनाझोल ४% भार/भार (डब्ल्यू जी)

(अंतरप्रवाही और स्पर्शीय फफूँदीनाशक)

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्