

Picozole Way®

Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC

Systemic Fungicide

Read leaflet before use. Chemical Composition : Picoxystrobin a.i. : 7.05 % w/w, Propiconazole a.i. : 11.71 % w/w, Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer : 2.50 % w/w, Mixture of ethyleneoxide/propylene oxide block copolymer and ethoxylated alcohol : 3.50 % w/w, Poly siloxane emulsion : 0.40 % w/w, Amorphous Silicon dioxide : 1.00 % w/w, Propylene glycol : 10.00 % w/w, Xantham Gum : 0.30 % w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one : 0.10 % w/w, Water (Solvent) : Q.S. Total : 100.00 % W/W. Direction Of Use : Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity. For agricultural use. Read leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid inhalation of the fungicide spray mist and contact with mouth, eyes and skin. 3. Wear full protective clothing such as apron, boots & coveralls as appropriate. 4. Wear protective clothes and wear 5. Wash contaminated clothes and body parts with soap and plenty of water. 6. Do not eat, drink, smoke while applying. 7. The product is toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies aquaculture/pisciculture area. Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically. First Aid : If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and wash separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain irritation, redness or photophobia persist consult eye specialist. Symptoms : Toxic if inhaled. May cause moderate skin irritation, skin sensitization and mild eye irritation. Sedation, dyspnea, abnormal posture may occur. Recommendations : Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity. Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

पिकोजोल वे

पिकोक्सीस्ट्रोबिन ७.०५% + प्रोपिकोनाजोल ११.७१% एस. सी.

अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

उपयोग से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें। रासायनिक संरचना: पिकोक्सीस्ट्रोबिन स.त.: ७.०५% भा/भा, प्रोपिकोनाजोल स.त.: ११.७१% भा/भा, मिथाइल मिथाक्राइलेट इथॉक्सीलेटेड ग्राफ्ट कोपोलिमर : २.५०% भा/भा, इथिलीनॉक्साइड/ प्रॉपिलिनॉक्साइड ब्लॉक कोपोलिमर भा/भा इथॉक्सीलेटेड अल्कोहल का मिश्रण : ३.५०% भा/भा, पॉलि सिलिकॉन इमल्शन : ०.४०% भा/भा, एमोर्फोअस सिलिकॉन डाइऑक्साइड : १.००% भा/भा, प्रोपॉईलीन ग्लायकोल : १०.००% भा/भा, जैथन गॉद : ०.३०% भा/भा, १,२-बेन्जिसोथियाजोलिन-३-वन : ०.१०% भा/भा, जल : पर्याप्त मात्रा, योग: १००.००% भार/भार। उपयोग के लिये निर्देश : पिकोक्सीस्ट्रोबिन ७.०५% + प्रोपिकोनाजोल ११.७१% भा/भा एस. सी. एक बहुआयामी फफूंदनाशक है जो अन्तःप्रवाही क्रियाशीलता रखता है। केवल कृषि उपयोग हेतु। इस्तेमाल से पहले लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानीयाँ : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। 2. फफूंदनाशक के छिड़काव की फुहारों के सांस द्वारा अंदर जाने से तथा मूंह, आँखों और चर्म के संपर्क होने से बचाना। ३. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहने जैसे ट्रेन, बूट या ओवरऑल जैस उचित हो पहले। ४. आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने। ५. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को साबून और खूब सारे पानी से धोएं। ६. प्रयोग के समय खाना, पीना और धुएँगान नहीं करना चाहिए। ७. यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषाल है इसलिए इसका इस्तेमाल जल स्रोतों के पास, जलसंधर्धन/मत्स्य पालन गतिविधियाँ में नहीं करना चाहिए। विषनाशक: कोई भी ज्ञात विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल लिया गया है : यदि मरीज होश में और सचेत है तो मुँह को पानी के साथ कुल्ला करवाएँ और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। कभी भी क्लिनी बेहोश व्यक्ति को मुँह के दरवार कोई चीज न दें, चिकित्सक को बुलाएँ। जब तक चिकित्सक को बुलाएँ दरवार कहां न जाए तब तक उल्टी करवाने की कोशिश न करें। २. यदि सिर के साथ प्रहार कर लिया है: मरीज को ताली हटवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान की देखभाल करें, यदि मरीज सचेत नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठनाई हो रही हो तो कृत्रिम सांस दें, तबकीही तौर पर मुँह से मुँह को सांस दें। चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा से संपर्क होने पर : बालों और नाखूनों के नीचे के भाग सहित शरीर के प्रभावित अंगों को साबून और खूब सारे पानी के साथ अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द, जलन या लालिमा बनी रहती है तो चिकित्सक से संपर्क करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग करें और इस्तेमाल से पहले साबून एवं पानी के साथ अलग से अच्छी तरह धोएं। ४. आँख से संपर्क होने पर: कम से कम १५ मिनट तक खूब सारे पानी के साथ कोमलतापूर्वक आँखों को धोएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा और प्रकाशभयिती बनी रहती है तो आँखों के विशेषज्ञ से संपर्क करें। लक्षण: आँखों में हल्की जलन। निगल ली जाने पर सुस्ती, लार का बहना और ऐंठन हो सकती है। सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना और उल्टी कोकंबी एवं श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है। उपयोग : पिकोक्सीस्ट्रोबिन ७.०५% + प्रोपिकोनाजोल ११.७१% भा/भा एस. सी. एक बहुआयामी फफूंदनाशक है जो अन्तःप्रवाही क्रियाशीलता रखता है। शैतानी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है। सूखी और ठण्डी जगह पर आम से दूर रखें।

पिकोज़ोल् वे

पिकोक्सीस्ट्रोबिन 7.05% + प्रोपिकोनाजोल 11.71% एस. सी.

अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

अंतःप्रवाही फफूंदनाशक की संरचना: पिकोक्सीस्ट्रोबिन 7.05% w/w, Propiconazole 11.71% w/w, Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer 2.50% w/w, Mixture of ethyleneoxide/propylene oxide block copolymer and ethoxylated alcohol 3.50% w/w, Poly siloxane emulsion 0.40% w/w, Amorphous Silicon dioxide 1.00% w/w, Propylene glycol 10.00% w/w, Xantham Gum 0.30% w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one 0.10% w/w, Water (Solvent) Q.S. Total 100.00% W/W. Direction Of Use : Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity. For agricultural use. Read leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid inhalation of the fungicide spray mist and contact with mouth, eyes and skin. 3. Wear full protective clothing such as apron, boots & coveralls as appropriate. 4. Wear protective clothes and wear 5. Wash contaminated clothes and body parts with soap and plenty of water. 6. Do not eat, drink, smoke while applying. 7. The product is toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies aquaculture/pisciculture area. Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically. First Aid : If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and wash separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain irritation, redness or photophobia persist consult eye specialist. Symptoms : Toxic if inhaled. May cause moderate skin irritation, skin sensitization and mild eye irritation. Sedation, dyspnea, abnormal posture may occur. Recommendations : Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity. Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC

Picozole Way® Systemic Fungicide



पिकोज़ोल वे

अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. खतरा DANGER असाध्य. बच्चों की पहुँच से दूर रखिए।

प्राधान्यपूर्वक रूप से पिकोक्सीस्ट्रोबिन 7.05% w/w, Propiconazole 11.71% w/w, Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer 2.50% w/w, Mixture of ethyleneoxide/propylene oxide block copolymer and ethoxylated alcohol 3.50% w/w, Poly siloxane emulsion 0.40% w/w, Amorphous Silicon dioxide 1.00% w/w, Propylene glycol 10.00% w/w, Xantham Gum 0.30% w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one 0.10% w/w, Water (Solvent) Q.S. Total 100.00% W/W. Direction Of Use : Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity. For agricultural use. Read leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid inhalation of the fungicide spray mist and contact with mouth, eyes and skin. 3. Wear full protective clothing such as apron, boots & coveralls as appropriate. 4. Wear protective clothes and wear 5. Wash contaminated clothes and body parts with soap and plenty of water. 6. Do not eat, drink, smoke while applying. 7. The product is toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies aquaculture/pisciculture area. Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically. First Aid : If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and wash separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain irritation, redness or photophobia persist consult eye specialist. Symptoms : Toxic if inhaled. May cause moderate skin irritation, skin sensitization and mild eye irritation. Sedation, dyspnea, abnormal posture may occur. Recommendations : Picoxystrobin 7.05% + Propiconazole 11.71% SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity. Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Regn. No.: CIR-19610/2021-Picoxystrobin+Propiconazole(SC)(434)-17
रजि. नं.: सीआयआर-१९६०९८/२०२१-पिकोक्सीस्ट्रोबिन+प्रोपिकोनाजोल(एससी)(४३४)-१७
Mfg. Lic.No.: GJ-PAN-01048 उत्पादन लाईसन्स नं.: जीजे-पीएन-०१०४८

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited, Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रजि. ऑफिस: कल्पतरु स्क्वैर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

Manufacturer Premises : Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat

उत्पादन परिसर : प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि. - पंचमहाल - ३८९३५०, गुजरात

Batch No.: वैच नं.: Mfg. Date : उत्पादन तिथि: Exp. Date : समापन तिथि: Max. retail price ₹ : inclusive of all taxes अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ : सभी करों सहित Unit sale price per L ₹ :

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com



Manufactured & Marketed by: INDIFIL INDUSTRIES LIMITED

Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India