ପିକୋଜୋଲ୍ ୱେ

ପିକୋଜାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସି

ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ

ସିଷ୍ଟେମିକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍

ପିକୋଜାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସି ହେଉଛି ଏକ ଡବ୍ଲ୍ ୱେଡ୍ଟମ୍ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଯାହାର ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପିକୋଜାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସିରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ / ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଲିଟର ପ୍ରତି।

ସୂଚାଣି:

ଫସଲ (ଅନୁଚ୍ଛେଦ)	ଜାତର ସାଧାରଣ ନାମ	ମାତ୍ରା/ ହେକ୍ଟର		ଦାଖିଲର ପରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ	ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନରେ)
		ଏଆଇ	ଫର୍ମୁଲେସନ୍		
ଗହମ	ଯେଲୋ ରଷ୍ଟ (ପୁସିନିଆ ଷ୍ଟ୍ରିଫର୍ମିସ୍ ଏସପି. ଟ୍ରିଟିସି)	200	1000	500	52
ଧାନ	ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ (ରିଜୋକ୍ଟୋନିଆ ସୋଲାନି) ଫଳସ୍ ରୁଟ୍ (ଅଷ୍ଟିଲାଗିନୋଇଡିଆ ଭିରେନସ୍) ଡାର୍ଟି ପାନିକଲ	200	1000	500	24

ବ୍ୟବହାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ପିକୋଜାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସିକୁ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମୟରେ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ ଭାବରେ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକାଲି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସମାନ ଆଚାରଣ ହାର ଅନୁସାରେ ବିଷନ ଦ୍ରବଣକୁ ଲାଗୁକରେ ବିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମିଶ୍ରାଣୁ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିଫନ ଉପକରଣ : ଭଲ ଲବ୍ଜାମସୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଯଥା ମାପସାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେର ପୋଷିତ୍ରରେ ହଲୋକାକାର କୋଳର ଲାଗିଥିବ ଏହା ସହାୟକାରକ ସ୍ପ୍ରେର ସମାନଗୁଣର ଲାଗୁ ହେବ। **ସାବଧାନତା :** ୧. ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପାଣିର ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ୨. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୩. ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପୋଷାକ ଯଥା ଆପ୍ରନ, ବୁଟ୍ ଜିନସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ୪. ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିନା ବଦଳା ପରାଧ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୫. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ନିଷେଧ। ୬. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଚାରା ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ୭. ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିନା ବଦଳା ପରାଧ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ୮. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ନିଷେଧ। ୯. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଚାରା ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। **ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ :** ପିକୋଜାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଷାକ୍ତ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପାଣିର ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେ ରଖନ୍ତୁ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା ନିଷେଧ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଚାରା ଗଛ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। **ସ୍ୱୟଂ ଚିକିତ୍ସା :** ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଜା ପବନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଖିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗିଳିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ।

Oriya

ପିକୋସୋଲ ବେ

ପିକୋକାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସି

ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରବୀୟ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍

ପିକୋକାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସି ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଜନ୍ମର ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଯାହାର ସକ୍ରିୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପିକୋକାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସିରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ / ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଲିଟର ପ୍ରତି।

ସୂଚାଣି:

ଫସଲ	କୀଟ	ମାତ୍ରା/ ହେକ୍ଟର		ଦାଖିଲର ପରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ	ଦୁଇଥର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନରେ)
		ଏଆଇ	ଫର୍ମୁଲେସନ୍		
ଗହମ	ଯେଲୋ ରଷ୍ଟ (ପୁସିନିଆ ଷ୍ଟ୍ରିଫର୍ମିସ୍ ଏସ୍ ଏ. ଟ୍ରିଟିସି)	200	1000	500	52
ଧାନ	ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ (ରିଜୋକ୍ଟୋନିଆ ସୋଲାନି) ଫଳସ୍ ରୁଟ୍ (ଅଷ୍ଟିଲାଗିନୋଇଡିଆ ଭିରେନସ୍) ଡାର୍ଟି ପାନିକଲ	200	1000	500	24

ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ : ପିକୋକାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୭.୦୫% + ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୧୧.୭୧% ଏସସିକୁ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମୟରେ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ ଭାବରେ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକାଲି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ସମାନ ଆଚାରଣ ହାର ଅନୁସାରେ ବିଷନ ଦ୍ରବଣକୁ ଲାଗୁକରେ ବିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମିଶ୍ରାଣୁ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲିଫନ ଉପକରଣ : ଭଲ ଲବ୍ଜାମସୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଯଥା ମାପସାଲ୍ ସ୍ପ୍ରେର, ଫୁଟ୍ ସ୍ପ୍ରେର ପୋଷିତ୍ରରେ ହଲୋକାକାର କୋଳର ଲାଗିଥିବ ଏହା ସହାୟକାରକ ସ୍ପ୍ରେର ସମାନଗୁଣର ଲାଗୁ ହେବ। **ବିଷନାଶକ :** ଫେନିଶସି ନିହିଷ୍ଟ ବିଷନାଶକ ଉଚା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ଯଥା ପାଣି ରଖିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାତ୍ରକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ୨. ବ୍ୟବହାର ସରିଗଲା ପରେ ପାତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଛାଡି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି କେହି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଓ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ୩. ପାତ୍ରକୁ ଦିନି ଥର ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଜାଳନ୍ତୁ। ୪. ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିନା ବଦଳା ପରାଧ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଧୋଇବା ବାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ତାହା ପରିବେଶ ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। **ଜଳାଭାଣ ଅବସ୍ଥା :** ୧. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ରଖିଥିବା ପାତ୍ରେକୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଓ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଓ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୃହ ବା ପରିବେଶରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ନିକଟରେ ପିଲା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକ ପୃଥକ ଆଲମିରାରେ ତାଲା ଦାବି ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ। ୨. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବା ପରିବେଶରି ଉଚ୍ଚମ ଭାବରେ ନିମ୍ନିତ, ଶୁଷ୍କ, ଆଲୋକିତ ଓ ସାୟୁ ବଳାଚଳ କରୁଥିବା ସହିତ ବାଷ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ଦରକାର।

ରସାୟନିକ ସଂରଚନା

ପିକୋଜାଇଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ଏ.ଆଇ.	୭.୦୫ % ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ଏ.ଆଇ.	୧୧.୭୧ % ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ମିଥାଇଲ୍ ମେଥାକ୍ରାଇଲେଟ୍ ଇଥୋକ୍ସାଲେଟେଡ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟ କୋପଲିମର	୨.୫୦ % ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ଇଥାଇଲେନୋକ୍ସାଇଡ୍ / ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବ୍ଲକ୍ କୋପଲିମର	୩.୫୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ଏବଂ ଇଥୋକ୍ସାଲେଟେଡ୍ ଆଲ୍କୋହଲର ମିଶ୍ରଣ	୩.୫୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ପଲିସିଲୋକ୍ସାନ୍ ଏମୁଲସନ୍	୦.୪୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ଆମୋରଫସ୍ ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍	୧.୦୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୧୦.୦୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ଜାନ୍ଥାନ୍ ଗମ୍	୦.୩୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
୧,୨- ବେଞ୍ଜିସୋଥିୟାଜୋଲିନ୍ - ୩ -୧	୦.୧୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ
ପାଣି (ସଲ୍ୱେଣ୍ଟ)	କ୍ୟୁ.ଏସ୍. %
ସମୁଦାୟ	**୧୦୦.୦୦୦% ୱ୍ୱ/ୱ୍ୱ**

Oriya

ПИКОЗОЛ ВЕ

ПИКОКСИСТРОБИН 7.05% + ПРОПИКОНАЗОЛ 11.71% ЭС

ЭНДОФИТНЫЙ ФУНГИЦИД

ПИКОКСИСТРОБИН 7.05% + ПРОПИКОНАЗОЛ 11.71% ЭС ЭТО ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ФУНГИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. ПИКОКСИСТРОБИН 7.05% + ПРОПИКОНАЗОЛ 11.71% ЭС ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОРАСТАНИЕ СПОР ГРИБОВ, ОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗВИТИЕ ГРИБНИЦЫ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ. ПИКОКСИСТРОБИН 7.05% + ПРОПИКОНАЗОЛ 11.71% ЭС ОБЛАДАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИБНИЦЫ. ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРЕПАРАТ ПОДАВЛЯЕТ ПРОРАСТАНИЕ СПОР ГРИБОВ ПОСЛЕ ИХ ПОПАДАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ЛИСТА