ஹெக்ஸ்ஹோகோனஜோல் 5% ஈசி

சிதாரா (கலப்பின பூஞ்சாணங்கொல்லி)

இது ஊடுருவிக் செயல்படும் பூஞ்சாணங்கொல்லி. இதில் ஹெக்ஸ்ஹோகோனஜோல் 5% ஈசி தீவிர ஒருங்கிணைப்பை மற்றும் சீரி தூய்மையுடைய உயர்தரப்பொருட்களுடன் கலந்து அடங்கி யுள்ளன. இது ஆப்பிளில் காயத் தோல், தென்னை குரும்பொடி மற்றும் தோன்கருவல், நிலக் கடலையில் திக்கா நோய், மாமரத்தில் சாம்பல் நோய், கோயாவில் துரு நோய், பிளாக்பெரியில் பிளிஸ்டர் கருவல் மற்றும் திராட்சையில் சாம்பல் நோயை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பயிர்	நோய்	பொதுப்பெயரளவு			கலப்பித்தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கடைசி நாள் இடைப்பட்ட காத்திருப்புக் காலம் (நாட்கள்)
		தீநு. (கிலோ/ஹே)	மருந்து (மி.லி/ஹே)	நீர்த்தல் (மி.லி/100 லி)	
ஆப்பிள்	மாவு தேமல்	0.0025%	0.05% (50 மி.லி./100 லி.)	1000	30
நெல்	துரு	50	1000	500	40
கிவக்-இலை மா	நோய்	50	1000	500	40
	திக்கா சாம்பல் நோய்	75	1500	500	30
		0.005% (5 கிராம்/100 லி.)	0.1% (100 மி.லி./100 லி.)	100	தேவையில்லை
கோயாவில்	துரு நோய்	0.005%	0.1% (100 மி.லி./100 லி.)	100	தேவையில்லை
தேநீரை	பிளிஸ்டர் கருவல்	10	20 மி.லி.	பயன்பட்டுவரும் 70-80 நாப்பான் ஸ்ப்ரேயர் 175-200	30
திராட்சை	சாம்பல் நோய்	25-50	500-1000	500	14

பயன்படுத்துகிற விதம் குறிப்புகள்: பயிர் பாதுகாப்பு கருவி தேவையான அளவு தெளிக்கொல்லியுடன் 5% ஈசி ஹெக்ஸ்ஹோகோனஜோல் அல்லது சிதாரா தேவைக்கு ஏற்ப தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து ஒரு சீரான மாற்று கலவையாக மாற்றவும். பிறகு தெளிப்பு அளவுக்கு தேவையான தீவிர தண்ணீரையும் சேர்த்து நன்கு கலக்கி தெளிப்பு கலவையைத் தயார் செய்யவும். தெளிக்கும் போதும் தொடர்ச்சியாக கலக்கி தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், கம்பு தெளிப்பான் தானாக தெளிப்பான் மற்றும் தெளிப்பான் தானாக பேட்டரி தெளிப்பான், அல்லது அல்லிப் சாவி தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. மனம், சுவாசிப்பு மற்றும் கண்களுக்கு பாதுகாக்கக் கவசங்கள், தலைக்கவசங்கள், போன்றவற்றினிருந்து தூய்மை வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் உடல், திறந்த காயங்களை பகுதிகளுக்கு தவிர்க்கவும். 3. மருந்தை தெளிப்பதற்கு முன்னரும் உறிஞ்சவதற்கு தவிர்க்கவும் மருந்தினை கலந்தவுடன் தெளிக்கவும். 4. மருந்து தெளித்தபிறகு மருந்து கலந்தவிட்ட கலன்களை உடம்பின் பாகங்களையும் கத்தாக கழுவவும். 5. மருந்தை கலந்தவிட்ட ஆடைகளையும், உடம்பின் பாகங்களையும் கத்தாக கழுவவும். 6. கலந்தவுடன் கலந்தவுடன் தெளிப்பு கலவை தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 7. கலந்தவிட்ட மருந்து உட்கொள்ளக் கூடாது. 8. கலந்த தண்ணீர் சேர்த்துதான் தண்ணீர் கொண்டு கலந்த 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். 9. மருந்தை கலந்தவிட்டபோ அதை தொடாமலோ காற்றுள்ள பகுதிக்கு மாற்றவும். 10. கலந்தவிட்ட மருந்து பட்டுவிட்டால் கண்களை உப்பு கலந்த தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 11. கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால் கண்களை உப்பு கலந்த தண்ணீர்க்குள்ளான தண்ணீர் கொண்டு கழுவி 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். 12. மருந்தை கலந்தவிட்டபோ அதை தொடாமலோ கண்ணாடி கொண்டு கழுவவும்.

விஷமுறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து மற்றும் அறிகுறிப்படியிலான சிகிச்சை அளிக்கவும். அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்தும் பயிர்களுக்கான அப்படியிடுவிக்குதல்: 1. எந்திய மருந்துகள் உள்ள பொட்டலங்கள் மற்றும் பொதிந்துள்ள வகை போன்றவற்றை சுற்றுப்புறம் மற்றும் மற்றும் நீர் நிலைகள் மைப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பின் காலி பொட்டலங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது. அவை பாதுகாப்பான முறையில் விடுப்பு வைக்கப்பட்டக் கூடாது. 3. காலி பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு மண் நுழைப்பட இருக்கக் கூடாது. 4. மருந்து உட்கொள்ளக் கூடாது. 5. காலி மருந்தினி மருந்து பட்டுவிட்டால் அதனை கண்ணாடி கொண்டு கழுவவும். 6. கலந்தவிட்ட மருந்து மீதமிருந்தால் அதை மறுபடியும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

மருந்தினை சேமிக்கும் விதம்: மருந்தினை பிரதானமாக வைக்கவும் மற்றும் மருந்தினை வைக்கும் இடம் பாதுகாப்பு கருவிகளை