சிதாரா பிளஸ் (மற்றுமொரு பெயர்/பிற பூச்சிக்கொல்லி) ஹெக்ஸாகொனசோல் 5% எஸ் சி

ஹெக்ஸாகொனசோலே 5% சதவீத ஏஸ் சி ஆகும். ஒரு லிட்டருக்கு நீர் சேர்க்கப்படும் பூச்சிக்கொல்லியாகும். இது மா மற்றும் திராட்சை மற்றும் தெங்கப்பிலிகை சாம்பல் நோய் மற்றும் இலையுடைய கருகல் நோய்களுக்கு கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	பொதுவின் பெயர்	தீவிர மூலப்பொருள்	பெறுகிட்டுக்கு அளவு		கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையிலான நாட்கள் (நாட்கள்)
		A.I gm/ %	சூத்திரம் லிட்டர்/%	ஏக்கருக்கு லிட்டர் (மி.லி.)	
மா	சாம்பல் - தோய்	0.01% அல்லது 10 கிராம்/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	0.2% அல்லது 200 மி.லி/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	மருந்தின் அளவு மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கு ஏற்ப	27
தென்னை	இலையுடைய கருகல் நோய்	0.01% அல்லது 10 கிராம்/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	0.2% அல்லது 200 மி.லி/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	மருந்தின் அளவு மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கு ஏற்ப	40
திராட்சை	சாம்பல் நோய்	0.01% அல்லது 10 கிராம்/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	0.2% அல்லது 200 மி.லி/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	மருந்தின் அளவு மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கு ஏற்ப	14

உபயோக வழிமுறைகள்: அ) தெளிப்புக் கலவை தயாரித்தல்: தேவையான அளவு தெளிக்கொல்லியை 5% எஸ் சி ஹெக்ஸாகொனசோலுடன் கலந்து தேவையான அளவு தண்ணீரை சேர்த்து தேவையான கலவை பெற கலக்கவும். ஆ) தெளிப்பான்: பெரிய தோட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். கலக்கும் பாத்திரம், கலக்கும் பாத்திரம், சாக்கடி தெளிப்பான், சாக்கடி தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், விசை-பாதை தெளிப்பான், கம்ப்ரெஷன் தாங்கான் தெளிப்பான், கம்ப்ரெஷன் தாங்கான் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் அதனால் எச்சரிக்கை பயன் தெளிப்பான். **மருந்தின்பாதுகாப்பு:** 1. கையுடை பொன்னிறமாக்கப்பட்டு இருக்க பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணியுங்கள். 2. தெளிக்கும் விலக்கி கையுடைகளை, 3. ஒரு நாளுக்கு மேலாக தெளிக்கும் விலக்கி கையுடைகளை தவிர்க்கவும். 4. கலப்பு, கலக்கும் மற்றும் தெளிக்கும் போது. 5. தெளிக்கும்போது பழங்கள், தானியம், சோளம்,மூலிகை மீன் வளர்ப்பு, குடிநீர், மரங்கு சாப்பிடும் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் மீன் பிடிப்பவர்கள் மற்றும் பறவை வளர்ப்பு. 6. கலக்கும் பொருளை மறுபயன்பாடு செய்யவோ அல்லது மறுசுழற்சி செய்யவோ கூடாது. 7. கலக்கும் கருவிகளை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பு தரம் வித்தியில் தெளிப்பானை பயன்படுத்துவதற்கு முன் கருவி சுத்தம் செய்யவும். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடித்தல், குடித்தல், சாதுவு சாப்பிடுதல் மற்றும் பயன்படுத்த கூடாது. 6. கலக்கும் பொருள் மறுபயன்பாடு செய்யவோ அல்லது மறுசுழற்சி செய்யவோ கூடாது. 7. ஆடைகள் மற்றும் கருவிகளின் மீது கலக்கும் பொருளை அகற்றுவதற்கு முன் ஆடைகளை கழுவுதல் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளை சுத்தம் செய்யவும். 3. கண்களில் மற்றும் பல்வாத்தை தரம் குறைந்தால்.15 நிமிடங்கள் கண்களில் மற்றும் பல்வாத்தை தரம் குறைந்தால் வழங்கவும். 4. மருந்தை உடனடியாக நீக்கி, ஒரு முகக்கவசம் மற்றும் கையுடை இத்திற்கு சென்றால் செல்லவும். **விஷ முதலிய அறிகுறிகள்:** தும்மல், கலைவை, புகட்டல், கண்ட பகுதி, சுவாச குவிப்பை ஏற்படலாம். **ஆபத்தான உதவி:** 1. மருந்தை விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையிலிருந்து மருந்தை வெளியேற்ற வாந்தி எடுக்கவும். மற்றும் மருந்தை விழுங்கி நிரம்ப நீர்கலந்த பொருளை கொடுக்கவும். 2. மருந்து கண்களில் பட்டிருந்தால் கண்களை நன்கு கழுவி கண்ணாடியை அகற்றவும். 3. கண்ணில் பட்டிருந்தால் மருந்தை நீர்கலந்த பொருளை கொடுக்கவும். 4. மருந்தை உடனடியாக நீக்கி, ஒரு முகக்கவசம் மற்றும் கையுடை இத்திற்கு சென்றால் செல்லவும். **விஷ முறிவு மருந்து:** குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு மருந்து ஏதும் இல்லை. **சேமிப்பு மற்றும் கையாளுதல்:** 1. பூச்சிக்கொல்லியை உணவு கலக்கவோ தீவனம் கலக்கவோ கூடாது. 2. பூச்சிக்கொல்லியை அசல் கொள்கலனில் மட்டுமே சேமிக்கவும். 3. கொள்கலனை மூடி வைக்கவும். 4. Wash thoroughly after handling. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Limitations and cautions for use:** Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, Live stock, game, wild bird and animals. **Phytotoxicity :** Hexaconazole 5% SC is not phytotoxic when used as per recommendations. **Compatibility:** Hexaconazole 5% SC is compatible with commonly used insecticides and fungicides. **Symptoms of Poisoning:** Nervousness, Anxiety, tremors, convulsions, allergic manifestations may occur. **First Aid:** 1.If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2.If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3.If eyes are contaminated, flush with plenty of water. Remove any contact lens. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal Of Used Containers:** Used packages or surplus materials and washings of the fungicides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2.The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3.Packages shall be broken and buried away from habitation. **Storage Conditions : 1.** The Packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and the nature of the fungicide. 2.The store rooms should be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the stores should be dry and cool.

Chemical Composition :

Hexaconazole technical (Min. purity 92%)		5.430 %	W/W
Propylene glycol		5.000 %	W/W
Emulsifiers A	(Blend of polyoxyethylene polyoxypropylene ethers and calcium salt of alkyl benzene sulfonate)	3.000 %	W/W
Emulsifiers B	(Amine salt of polyalkyl aryl ether phosphate)	3.000 %	W/W
Emulsifiers C		2.500 %	W/W
Potassium phosphite		10.000 %	W/W
Polysaccharide		0.200 %	W/W
Defoamer		0.250 %	W/W
Distilled/D.M.Water		68.120%	W/W
Wetting and dispersing		2.500 %	W/W
Agent (Sodium salt of fatty alcohol)			
Total		100.000 %	W/W

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

English

ஸிதாரா ப்லஸ் (மற்றுமொரு பெயர்/பிற பூச்சிக்கொல்லி) ஹெக்ஸாகொனசோல் 5% எஸ் சி

ஹெக்ஸாகொனசோலே 5% சதவீத ஏஸ் சி ஆகும். ஒரு லிட்டருக்கு நீர் சேர்க்கப்படும் பூச்சிக்கொல்லியாகும். இது மா மற்றும் திராட்சை மற்றும் தெங்கப்பிலிகை சாம்பல் நோய் மற்றும் இலையுடைய கருகல் நோய்களுக்கு கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	பொதுவின் பெயர்	தீவிர மூலப்பொருள்	பெறுகிட்டுக்கு அளவு		கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையிலான நாட்கள் (நாட்கள்)
		A.I gm/ %	சூத்திரம் லிட்டர்/%	ஏக்கருக்கு லிட்டர் (மி.லி.)	
மா	சாம்பல் - தோய்	0.01% அல்லது 10 கிராம்/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	0.2% அல்லது 200 மி.லி/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	மருந்தின் அளவு மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கு ஏற்ப	27
தென்னை	இலையுடைய கருகல் நோய்	0.01% அல்லது 10 கிராம்/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	0.2% அல்லது 200 மி.லி/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	மருந்தின் அளவு மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கு ஏற்ப	40
திராட்சை	சாம்பல் நோய்	0.01% அல்லது 10 கிராம்/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	0.2% அல்லது 200 மி.லி/ 100 லிட்டர் தண்ணீர்	மருந்தின் அளவு மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு சாதனங்களுக்கு ஏற்ப	14

உபயோக வழிமுறைகள்: அ) தெளிப்புக் கலவை தயாரித்தல்: தேவையான அளவு தெளிக்கொல்லியை 5% எஸ் சி ஹெக்ஸாகொனசோலுடன் கலந்து தேவையான அளவு தண்ணீரை சேர்த்து தேவையான கலவை பெற கலக்கவும். ஆ) தெளிப்பான்: பெரிய தோட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். கலக்கும் பாத்திரம், கலக்கும் பாத்திரம், சாக்கடி தெளிப்பான், சாக்கடி தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், விசை-பாதை தெளிப்பான், கம்ப்ரெஷன் தாங்கான் தெளிப்பான், கம்ப்ரெஷன் தாங்கான் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் அதனால் எச்சரிக்கை பயன் தெளிப்பான். **முன்னெச்சரிக்கை:** 1. கையுடை பொன்னிறமாக்கப்பட்டு இருக்க பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை அணியுங்கள். 2. தெளிக்கும் விலக்கி கையுடைகளை, 3. ஒரு நாளுக்கு மேலாக தெளிக்கும் விலக்கி கையுடைகளை தவிர்க்கவும். 4. கலப்பு, கலக்கும் மற்றும் தெளிக்கும் போது. 5. தெளிக்கும்போது பழங்கள், தானியம், சோளம்,மூலிகை மீன் வளர்ப்பு, குடிநீர், மரங்கு சாப்பிடும் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் மீன் பிடிப்பவர்கள் மற்றும் பறவை வளர்ப்பு. 6. கலக்கும் பொருளை மறுபயன்பாடு செய்யவோ அல்லது மறுசுழற்சி செய்யவோ கூடாது. 7. கலக்கும் கருவிகளை சுத்தமாக வைத்திருக்கவும் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கு பாதுகாப்பு தரம் வித்தியில் தெளிப்பானை பயன்படுத்துவதற்கு முன் கருவி சுத்தம் செய்யவும். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடித்தல், குடித்தல், சாதுவு சாப்பிடுதல் மற்றும் பயன்படுத்த கூடாது. 6. கலக்கும் பொருள் மறுபயன்பாடு செய்யவோ அல்லது மறுசுழற்சி செய்யவோ கூடாது. 7. ஆடைகள் மற்றும் கருவிகளின் மீது கலக்கும் பொருளை அகற்றுவதற்கு முன் ஆடைகளை கழுவுதல் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளை சுத்தம் செய்யவும். 3. கண்களில் மற்றும் பல்வாத்தை தரம் குறைந்தால்.15 நிமிடங்கள் கண்களில் மற்றும் பல்வாத்தை தரம் குறைந்தால் வழங்கவும். 4. மருந்தை உடனடியாக நீக்கி, ஒரு முகக்கவசம் மற்றும் கையுடை இத்திற்கு சென்றால் செல்லவும். **விஷ முதலிய அறிகுறிகள்:** தும்மல், கலைவை, புகட்டல், கண்ட பகுதி, சுவாச குவிப்பை ஏற்படலாம். **ஆபத்தான உதவி:** 1. மருந்தை விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையிலிருந்து மருந்தை வெளியேற்ற வாந்தி எடுக்கவும். மற்றும் மருந்தை விழுங்கி நிரம்ப நீர்கலந்த பொருளை கொடுக்கவும். 2. மருந்து கண்களில் பட்டிருந்தால் கண்களை நன்கு கழுவி கண்ணாடியை அகற்றவும். 3. கண்ணில் பட்டிருந்தால் மருந்தை நீர்கலந்த பொருளை கொடுக்கவும். 4. மருந்தை உடனடியாக நீக்கி, ஒரு முகக்கவசம் மற்றும் கையுடை இத்திற்கு சென்றால் செல்லவும். **விஷ முறிவு மருந்து:** குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு மருந்து ஏதும் இல்லை. **சேமிப்பு மற்றும் கையாளுதல்:** 1. பூச்சிக்கொல்லியை உணவு கலக்கவோ தீவனம் கலக்கவோ கூடாது. 2. பூச்சிக்கொல்லியை அசல் கொள்கலனில் மட்டுமே சேமிக்கவும். 3. கொள்கலனை மூடி வைக்கவும். 4. Wash thoroughly after handling. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Limitations and cautions for use :** Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, Live stock, game, wild bird and animals. **Phytotoxicity :** Hexaconazole 5% SC is not phytotoxic when used as per recommendations. **Compatibility:** Hexaconazole 5% SC is compatible with commonly used insecticides and fungicides. **Symptoms of Poisoning:** Nervousness, Anxiety, tremors, convulsions, allergic manifestations may occur. **First Aid:** 1.If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2.If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3.If eyes are contaminated, flush with plenty of water. Remove any contact lens. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Disposal Of Used Containers:** Used packages or surplus materials and washings of the fungicides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2.The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3.Packages shall be broken and buried away from habitation. **Storage Conditions : 1.** The Packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and the nature of the fungicide. 2.The store rooms should be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the stores should be dry and cool.

ஹெக்ஸாகொனசோல் டெக்னிகல் (குறைந்தபட்ச தூய்மை 92%)		5.430%	w/w
ஸைலீன் கிளைகால்		5.000%	w/w
எமல்சிபையர்கள் ஏ	(பாலிஆக்ஸிஎதிலீன் ஆக்ஸிஎதிலீன் ஈதர்கள் மற்றும் ஆல்கில் பென்ஸீன் சல்ஃபோனேட் கால்சியம் உப்பின் கலவை)	3.000%	w/w
எமல்சிபையர்கள் பி	(அமைன் சால்ட் ஆஃப் பாலி அல்கில் அரில் ஈதர் ஃபாஸ்ஃபேட்)	3.000%	w/w
எமல்சிபையர்கள் சி		2.500%	w/w
பொட்டாஷியம் ஃபாஸ்ஃபைட்		10.000%	w/w
பாலிஸாக்ரைட்		0.200%	w/w
டீஃபோமர்		0.250%	w/w
டிஸ்டில்டு/டி.எம் வாட்டர்		68.120%	w/w
நனையப் மற்றும் பரவல் காரணி(சோடியம் ஃபாட்டி ஆல்கஹால்)		2.500%	w/w
மொத்தம்		100.000%	w/w

தயாரிப்பாளர் மற்றும் விற்பனையாளர் : இண்டிஃபில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: கல்பதரு ஸ்கொயர், 4வது மாடி, கொண்டிவிடா ரோடு, ஆப்-அந்தேரி-குர்லா ரோடு, அந்தேரி (கிழக்கு) மும்பை 400 059

TAMIL

సితారా ప్లస్ (మరియు పేరు/ఇతర పురుగుమందు) హెక్సాకొనజోల్ 5% ఎస్ సి

హెక్సాకొనజోల్ 5% శాతం ఎస్ సి ఒక దైహిక పురుగుమందు. ఒక లీటరుకు నీరు కలుపుకోవాలి. ఇది మా మరియు తీగాలకు మరియు తెగుళ్ళబోలిన బూడిద తెగులు మరియు ఆకులపై మచ్చ తెగుళ్ళను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

సిఫార్సులు:

పంట(లు)	సాధారణ పేరు	క్రియాశీల పదార్థం	మోతాదు		పంట చివరి స్ప్రేకు మరియు పంట కోతకు మధ్య సిఫార్సు చేయబడిన కనీస రోజులు
		శాతం	సూత్రీకరణ లీటర్/%	ఎకరానికి లీటర్ (మి.లీ.)	
మామిడి	బూడిద తెగులు	0.01% (లేదా) 10 గ్రాములు 100 లీటర్ నీరు	0.2% (లేదా) 200 మి.లీ. 100 లీటర్ నీరు	పెద్ద మొత్తం మరియు పంట రక్షణ పద్ధతుల ప్రకారం	27
కొబ్బరి	ఆకుల మచ్చ తెగులు	0.01% (లేదా) 10 గ్రాములు 100 లీటర్ నీరు	0.2% (లేదా) 200 మి.లీ. 100 లీటర్ నీరు	పెద్ద మొత్తం మరియు పంట రక్షణ పద్ధతుల ప్రకారం	40
ద్రాక్ష	బూడిద తెగులు	0.01% (లేదా) 10 గ్రాములు 100 లీటర్ నీరు	0.2% (లేదా) 200 మి.లీ. 100 లీటర్ నీరు	పెద్ద మొత్తం మరియు పంట రక్షణ పద్ధతుల ప్రకారం	14

వినియోగ సూచనలు: అ) తెగుళ్ళ మిశ్రమాన్ని తయారుచేయడం: అవసరమైన అన్ని హెక్సాకొనజోల్ 5% శాతం ఎస్ సి, ఎస్సెన్షియల్ ఆయిల్ లేదా ఎమల్సిఫైయర్ తో కలపండి. ఆ) పిచికారీ: పెద్ద తోటలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. కలపడం, పిచికారీ చేయడం, పిచికారీ చేయడం, పిచికారీ చేయ