ছত্তীছি প্র'পাকইজাফণ ১০% ইচি বাঙ্গিমম অপতনানাম

প্রপাকুইজাফণ ১০% এচি হিজে এবিধ গজানি নিদান শিছড় প্রয়োগ করা অপতুনানাম, মিবিধ চ্যাটাম, নাটিমাং আর শিমাজ পেচিড হোরাং হরণ পাতব অপতুনানাম কাবাব অতিমায় ফনগাবক।

বাবহারব বাবে অনুমোদন :

শস	নিয়ন্ত্রিত খীং-নাম	প্রতি হেক্টরব মাত্রা			শেষ স্প্রেব পরা হোগোরাইনব অগুমহা সময় (দিন)
		স.উ. (গ্রাম)	মধ্যমেলাম (মিলি)	পানী (লিটাৰ)	
চ্যাবীন (গ্রামচিন মেক্স)	১. বাংলাড় খীং (একিনো'চ'ক'নাম একিনো'চ'ক ক্রাব হাগি) ২. ক্রেব খীং (ডিজিটেরিয়া সাংগুইনেলি) ৩. জাচিন ফুট খীং (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৪. গুচ খীং (ইগিচিটেরিয়া ইগিচেনা)	৫০-৭৫	৫০০-৭৫০	৫০০-৭৫০	২১
মাচি মাচ (চিঙ্গা মুংগ')	১.বাংলাড় খীং (একিনো'চ'ক'নাম) ২.জাচিন ফুট খীং (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৩.ক্রেব খীং (ডিজিটেরিয়া সাংগুইনেলি) ৪.গুচ খীং (ইগিচিটেরিয়া ইগিচেনা)	৭৫-১০০	৭৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	২১
শিমাজ	একিনো'চ'ক'নাম ডিজিটেরিয়া একিনো'চিনি ডিজিটেরিয়া সাংগুইনেলি	৬২.৫	৬২৫	৫০০	৭

উদ্ভিদ-বিষয়ক্রাম : অনুমোদন জানাব অনাহী ব্যবহাব কবিলে উদ্ভিদব প্রতি বিষাক্ত নহয় । **ব্যবহাবব নিবেশ : প্রয়োগ পদ্ধতি :** প্রতি হেক্টাৰব ৫০০-৭৫০ লিটাৰ পানীত শেষ চাচপোনকলপে প্রয়োগ কবিব । **প্রয়োগব বাবে ব্যবহাৰ সঁহাৰি :** ক্রেব নেন বা'ক্রেব লগাই লোবা উদ্ভিদ বিষাক্ত নহয় । **প্রয়োগব বাবে ব্যবহাৰ সঁহাৰি :** ইয়াপি । **ব্যবহাৰকাৰীক কবলগীয়া সাবধানতা :** ১. খোৱাজল, খোৱাবস্তু খোৱাবস্তু খাব পাৰে আৰু গাভৰ পৰা দূৰত থাকিব । ২. বৃষ্টি, চড় আৰু ছাগৰ হাবাব দাবিবাব নিমিত্ত । ৩. শেষ কবিবা উপাত্ত বাবে নিমিত্ত । বাতাহৰ প্ৰকৰ ভিন্নতাৰ শেষ কবিব । ৪. শেষ কবাব শেষত বৃষ্টিব কাবণে কাবি আৰু বাব বৃষ্টিব অসম্ভৱতা হলে শেষ কবিব । ৫. শেষ কবাব সময়ত কোনো কাবণে কবাব খোৱা-বোৱা বা ধূমপান নকবিব । ৬. মিহলাবাব কাজ শেষ কবাব সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত সাজ-পোচাক পিন্ধি লব । **বিষক্রিয়াব লক্ষণসমূহ :** উচ্চ বিষক্রিয়াব লক্ষণসমূহ অনিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰব আৰু অস্থায়ী কণকৰে মাত্ৰ । অধিক পৰিমাণত শেষ্টেন্সে শেষ বিষক্রিয়াসমূহ কেবল অনুমানমাত্ৰেহে । **প্রাথমিক সাহায্য :** ১. যদিবে শেষ্টেন্সে খৈছে, তিৰিব তিৰতৰ আহুৰিলৈ সুস্থবাহী নি, চেহিয়াটোক বমিবিলি শিৰিবাব নহয় বমি কবাবলৈ বাধিব । ২ৰিব্য বেলী আহেন কে থাকিলে বমি নকবাবাব । ২. কাপোৰ-কানি আৰু বাব হাল মুখৰ হলে, কাপোৰ-কানি আৰু বাব মুখৰ আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ছাবাব সাবি ধুই লবাব । ৪. মাথিব চকুৰ ভাগৰ, নিমখীয়া/পৰিষ্কাৰ পানীৰে প্ৰায় ১০-১৫ মিনিট সময় ধুই চকু ধুব । ৪. উপাত্ত গলে, বেনাবি মুকলিব বিষক্ত বহাইবে নৈ যাব । **বিষ-চিকিৎসক :** কোনো বিশেষ বিষ-চিকিৎসকৰ বিষয়ে জনা নাযায় । লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা চলাব । **মাছুকবকবণ :** **হিচি :** ১ অনানা সাবধী, বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী মাছুকে ব্যবাব বাবে ব্যবহাৰ কোবা বা ব্যৱিব পৰা অতিকৰণ পৰিহাৰ কৰিব লাগে । ২ অপতুনানাকৰ মাছুত কবা উচিত অথবা ছবাব বাবে অতিকৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেনা মাৰি পৃথক আনমানিত মাছুত কবা উচিত । ২. অপতুনানাকৰ মাছুত কবা কোবা বা ব্যৱিবোৰ মাছুত, পোহৰ বথা, শুকান, বতাহ চলাচল অধিক পথা আৰু অধিক বাপদৰ বাবা বৰ্ষিত হব লাগবোৰে যথেষ্ট আকৰ-কবল কোবা উচিত । **খালী শেকেচী জাবিব নষ্টকবণ :** ১) খালী শেকেচীবোৰক পুনঃ ব্যবহাৰ কবা উচিত নহয় । ২) খালী শেকেচীবোৰক পানীতে ৫ বাব আওকণা উচিত আৰু শেষ শেকেচ সেয়া চালি দিয়া উচিত । বিকল্পস্বৰূপে সাদা আৰু পানীত উচিত শেষ কবা আৰুবোৰ এটা গাঁতত সেয়া পোতাই দিয়া উচিত । ৩) খালী শেকেচীবোৰক ভাতি-ভিজি জনবসতিৰ পথা আঁতৰত মাটিৰ কবল এজোৰ নিৰাপদে পুতি পেলোবা উচিত যাতে ভাবা পৰিবেশ বা পানীত প্ৰদূষণ ঘটিব নোবাবে ।

বাবহাৰব গঠন :

প্ৰপাকুইজাফণ স. উ.	:	১০.০০% ৬/৩
এলকে'চল ইথাক্সিলেট	:	৩৯.২১% ৬/৩
কেষ্টৰ আঁচল ইথাক্সিলেট	:	১.৯৬% ৬/৩
ক্ৰাবক—এন মিথাইল পাৰ্ব'লিডানন	:	৯.৮০% ৬/৩
চি ১০ - চি ১৪ হাইড্ৰোকাৰবন মিশ্ৰণ	:	বাকী পৰিমাণ
মুঠ	:	১০০.০০% ৬/৩

ASSAMME

সোসাইটী প্রোপাক্বিজাফণ ১০% ইচি বাঙ্গিমম অপতনানাম

প্রপাকুইজাফণ ১০% এচি হিজে এবিধ গজানি নিদান শিছড় প্রয়োগ করা অপতুনানাম, মিবিধ চ্যাটাম, নাটিমাং আর শিমাজ পেচিড হোরাং হরণ পাতব অপতুনানাম কাবাব অতিমায় ফনগাবক।

প্রয়োগব নিৰ্দেশনাৰলী :

শস্য	কীট	প্রতি হেক্টৰ মাত্ৰা			শেষ স্প্ৰেব পৰা হোৰাইনব অগুমহা সময় (দিন)
		স.উ. (গ্ৰাম)	মধ্যমেলাম (মিলি)	পানী (লিটাৰ)	
সোয়াবীন (গ্লাইচিন মেক্স)	১. বাৰ্নাৰ্ড গছ (এচিনোচ'ক'নাম এচিনোচ'ক ক্ৰুগেলি) ২. ক্ৰেব গছ (ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি) ৩. জাৰ্মেন ফুট গছ (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৪. গুচ গছ (ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা)	৫০-৭৫	৫০০-৭৫০	৫০০-৭৫০	২১
মাচ মুগ (চিঙ্গা মুংগ')	১.বাৰ্নাৰ্ড গছ (এচিনোচ'ক'নাম) ২.জাৰ্মেন ফুট গছ (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৩.ক্ৰেব গছ (ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি) ৪.গুচ গছ (ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা)	৭৫-১০০	৭৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	২১
মুগ (ভিগ্না মুংগো)	১.বাৰ্নাৰ্ড গছ (এচিনোচ'ক'নাম) ২.জাৰ্মেন ফুট গছ (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৩.ক্ৰেব গছ (ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি) ৪.গুচ গছ (ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা)	৭৫-১০০	৭৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	২১
বুৰা (ভিগ্না মুংগো)	১.বাৰ্নাৰ্ড গছ (এচিনোচ'ক'নাম) ২.জাৰ্মেন ফুট গছ (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৩.ক্ৰেব গছ (ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি) ৪.গুচ গছ (ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা)	৭৫-১০০	৭৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	২১
ৰাহৰ মাচ (ভিগ্না মুংগো)	১.বাৰ্নাৰ্ড গছ (এচিনোচ'ক'নাম) ২.জাৰ্মেন ফুট গছ (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৩.ক্ৰেব গছ (ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি) ৪.গুচ গছ (ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা)	৭৫-১০০	৭৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	২১
উৰদ (ভিগ্না মুংগো)	১.বাৰ্নাৰ্ড গছ (এচিনোচ'ক'নাম) ২.জাৰ্মেন ফুট গছ (ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা) ৩.ক্ৰেব গছ (ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি) ৪.গুচ গছ (ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা)	৭৫-১০০	৭৫০-১০০০	৫০০-৭৫০	২১
কাঁদা	এচিনোচ'ক'নাম, ডিজিটেৰিয়া সাংগুইনেলি, ডাক্টাইলোথিকাম এগিপ্টেনা, ইগিচিটেৰিয়া ইগিচেনা, ফলাসিয়ি মাচুৰ	৬২.৫	৬২৫	৫০০	৭

বনস্পতী হানীকৰেকটা : ব্যৱহাৰ কৰা অনুসাৰে ইংলাদ্দৰ কৰণে হানীকৰেকৰ নহী । **উপযোগ কৰিব লিযে নিৰ্দেশ : প্ৰয়োগ বিধী :** ছিঞ্চকাৰ ৫০০-৭৫০ লিটাৰ পানীত শেষ পানী প্ৰতি হেক্টাৰ । **কৃষি ৰক্ষা সাধন :** ছিঞ্চকাৰ কৰোতে সময় শেষলৈকে ছিঞ্চকাৰ যন্ত্ৰ, ফুট ছিঞ্চকাৰ যন্ত্ৰ কাৰ লেকৰ ফৰ্টৰ পেন নোজল আৰু ফৰ্টৰ পেন নোজল. **যোগ কৰাযাবলী ব্যাবহাৰী ব্যৱস্থা :** ৭. ব্যাবহাৰৰ, ব্যাবহাৰৰ ৰৈবাবী বিষাৰী খাৰী আদি ব্যৱহাৰযোগ্যৰ দুৰ হোৱা. ৫. বাৰ, ৰুক্ত আৰু ছাগৰ হাবাব দাবিবাব নিমিত্ত । ৬. শেষ কবিবা উপাত্ত বাবে নিমিত্ত । বাতাহৰ প্ৰকৰ ভিন্নতাৰ শেষ কবিব । ৪. শেষ কবাব শেষত বৃষ্টিব কাবণে কাবি আৰু বাব বৃষ্টিব অসম্ভৱতা হলে শেষ কবিব । ৫. শেষ কবাব সময়ত কোনো কাবণে কবাব খোৱা-বোৱা বা ধূমপান নকবিব । ৬. মিহলাবাব কাজ শেষ কবাব সময়ত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত সাজ-পোচাক পিন্ধি লব । **বিষক্রিয়াব লক্ষণসমূহ :** উচ্চ বিষক্রিয়াব লক্ষণসমূহ অনিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰব আৰু অস্থায়ী কণকৰে মাত্ৰ । অধিক পৰিমাণত শেষ্টেন্সে শেষ বিষক্রিয়াসমূহ কেবল অনুমানমাত্ৰেহে । **প্রাথমিক সাহায্য :** ১. যদিবে শেষ্টেন্সে খৈছে, তিৰিব তিৰতৰ আহুৰিলৈ সুস্থবাহী নি, চেহিয়াটোক বমিবিলি শিৰিবাব নহয় বমি কবাবলৈ বাধিব । ২ৰিব্য বেলী আহেন কে থাকিলে বমি নকবাবাব । ২. কাপোৰ-কানি আৰু বাব হাল মুখৰ হলে, কাপোৰ-কানি আৰু বাব মুখৰ আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ছাবাব সাবি ধুই লবাব । ৪. মাথিব চকুৰ ভাগৰ, নিমখীয়া/পৰিষ্কাৰ পানীৰে প্ৰায় ১০-১৫ মিনিট সময় ধুই চকু ধুব । ৪. উপাত্ত গলে, বেনাবি মুকলিব বিষক্ত বহাইবে নৈ যাব । **বিষ-চিকিৎসক :** কোনো বিশেষ বিষ-চিকিৎসকৰ বিষয়ে জনা নাযায় । লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা চলাব । **মাছুকবকবণ :** **হিচি :** ১ অনানা সাবধী, বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী মাছুকে ব্যবাব বাবে ব্যবহাৰ কোবা বা ব্যৱিব পৰা অতিকৰণ পৰিহাৰ কৰিব লাগে । ২ অপতুনানাকৰ মাছুত কবা কোবা বা ব্যৱিবোৰ মাছুত, পোহৰ বথা, শুকান, বতাহ চলাচল অধিক পথা আৰু অধিক বাপদৰ বাবা বৰ্ষিত হব লাগবোৰে যথেষ্ট আকৰ-কবল কোবা উচিত । **খালী শেকেচী জাবিব নষ্টকবণ :** ১) খালী শেকেচীবোৰক পুনঃ ব্যবহাৰ কবা উচিত নহয় । ২) খালী শেকেচীবোৰক পানীতে ৫ বাব আওকণা উচিত আৰু শেষ শেকেচ সেয়া চালি দিয়া উচিত । বিকল্পস্বৰূপে সাদা আৰু পানীত উচিত শেষ কবা আৰুবোৰ এটা গাঁতত সেয়া পোতাই দিয়া উচিত । ৩) খালী শেকেচীবোৰক ভাতি-ভিজি জনবসতিৰ পথা আঁতৰত মাটিৰ কবল এজোৰ নিৰাপদে পুতি পেলোবা উচিত যাতে ভাবা পৰিবেশ বা পানীত প্ৰদূষণ ঘটিব নোবাবে ।

বাবহাৰব গঠন :

প্ৰপাকুইজাফণ স. উ.	:	১০.০০% ৬/৩
এলকে'চল ইথাক্সিলেট	:	৩৯.২১% ৬/৩
কেষ্টৰ আঁচল ইথাক্সিলেট	:	১.৯৬% ৬/৩
ক্ৰাবক—এন মিথাইল পাৰ্ব'লিডানন	:	৯.৮০% ৬/৩
চি ১০ - চি ১৪ হাইড্ৰোকাৰবন মিশ্ৰণ	:	বাকী পৰিমাণ
মুঠ	:	১০০.০০% ৬/৩

ASSAMME

ലോക്കോട്ടി പ്രൊപ്രക്വിസാഫ്ക്സ് 10% ഇസി ഒരുതരം ഇലവട്ടത്തെ കളനാശിനി

ലോക്കോട്ടി പ്രൊപ്രക്വിസാഫ്ക്സ് 10% ഇസി മുള്ളങ്കി, ഫൊസിയസിനു ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കളനാശിനിയാണ്, ഗോതമ്പിൽ, ഉരുളി, ഇല്ലി എന്നിവയിലെ ഓലേരോക്കിട്ടു കളകൾക്ക് പരിധിയാണ്

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

കളകൾ	നിയന്ത്രണപ്പെടുന്ന കളകൾ	ഹെക്ടറിന് ലായനി			അവസാന തളിക്കും വിളവെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഇടവേള കണക്കിലെടുക്കേണ്ട സമയം (ദിവസം)
		സ.ഗ്ര. (ഗ്രാം)	ഫ്ലാമാഴ്സ് (മി.ലി)	വെള്ളം (ലി)	
ഗോതമ്പ് ബാർലി (ഒരുതരം നീണ്ട പുല്ല് മാക്സിറ)	1. കുളുവ പുല്ല് (ഫുലിനോസ്പോറ കൊറ്റുവേന) 2. ബ്രോമ് പുല്ല് (ബ്രോമസ്കോമിനോറം ഇന്റർപ്പിനോ) 3. ചെറുതൊട്ടി പുല്ലുകൾ (ലോലിയം ടെമുലെന്റം ഇന്റർപ്പിനോ) 4. ഗുണ്ടി ഗോതമ്പ് (ട്രിട്ടിക്കം ഡ്യൂറം)	50-75	500-750	500-750	21
	1. കുളുവ പുല്ല് (ഫുലിനോസ്പോറ കൊറ്റുവേന) 2. ബ്രോമ് പുല്ല് (ബ്രോമസ്കോമിനോറം ഇന്റർപ്പിനോ) 3. ചെറുതൊട്ടി പുല്ലുകൾ (ലോലിയം ടെമുലെന്റം ഇന്റർപ്പിനോ) 4. ഗുണ്ടി ഗോതമ്പ് (ട്രിട്ടിക്കം ഡ്യൂറം)	50-75	500-750	500-750	21
ഗ്ലൂക്കൺ ഗ്രാസ് (ഫാലിസ് മൈനോറ)	1. കുളുവ പുല്ല് (ഫുലിനോസ്പോറ കൊറ്റുവേന) 2. ബ്രോമ് പുല്ല് (ബ്രോമസ്കോമിനോറം ഇന്റർപ്പിനോ) 3. ഗുണ്ടി ഗോതമ്പ് (ട്രിട്ടിക്കം ഡ്യൂറം)	75-100	750-1000	500-750	21
ഇല്ലി	1. കുളുവ പുല്ല് (ഫുലിനോസ്പോറ കൊറ്റുവേന) 2. ബ്രോമ് പുല്ല് (ബ്രോമസ്കോമിനോറം ഇന്റർപ്പിനോ) 3. ഗുണ്ടി ഗോതമ്പ് (ട്രിട്ടിക്കം ഡ്യൂറം)	62.5	625	500	7

പരിമരക്ഷകൾ വിഷതുമ്പലകൾ: പരിമ്പുതരത്തുപ്പ പ്രധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിമരക്ഷകൾ ഒരുതരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ **ഗ്ലൂക്കോട്ടി കൂട്ടിപ്പുകൾ:** ഗ്ലൂക്കോട്ടി ഗ്ലൂക്കോട്ടി ഗ്ലൂക്കോട്ടി