FIPRONIL 5 % SC

STALKER® SC

(Systemic and Contact Insecticide)

स्टॉकर एस सी

फिप्रोनिल 5 प्रतिशत एस सी

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड,
रजि. ऑफ़िस: कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी–कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०५९

Manufacturer Premises : Unit SS - C/o. S.S. Crop Care Pvt. Ltd.,
Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023,
Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat

उत्पादन परिसर: युनिट एस एस - C/o. एस.एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड,
शेड नं. –१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) – ४६२०२३,
युनिट एच – प्लॉट नं. १०४–१–ए, जीआयडीसी हालोल–२, जि.– पंचमहाल – ३८९३५०, गुजरात

For Identification of Manufacture Premises Address please see first Alphabet of Batch No.

उत्पादन परिसर के पता की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

® – Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.Toll Free No. : 1800-120-003-004, email : customercare@indofil.com

Manufactured & Marketed by:

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

11-22(PR)

স্টাল্কর এচসি — ফিপ্নিল ৫% এচসি — (কীটনাশক)

ফিপ্নিল ৫% এচসি হৈছে এবিধ কীটনাশক যিটো ধানত হোৱা কীটনাশক ব্ৰাউন পিছনা পোকা, হলদিয়া সৰিয়হ, ব্ৰাউন সৰিয়হ, গ্ৰেভিলিয়া পাত কাটি, ধানৰ পত্ৰ ভগিয়া পোকা, ধানৰ সৰু কীট, কলা টিক্ৰিড সৰিয়হ, চক মাৰিশপ্ৰে ইত্যাদি, বন্ধাকবিজ হোৱা ডিচিক্স, জলকীয়াত হোৱা স্থাইট জাতীয় পোকা, মোচা পোকা আৰু ফল বিন্ধনা পোকা, কুইচানত হোৱা শিপা বিন্ধনা পোকা আৰু কপাহত হোৱা মোৱা পোকা, গোল পোকা, স্থাইট জাতীয় পোকা, বন্ধাবাখি আৰু কপ্পা পোকা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হয়।

ব্যৱহাৰৰ অনুমোদন:

শস্য	কীট-পতঙ্গৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা (প্ৰতি হেক্টৰ) সা: উ: (গ্ৰাম)	ফৰ্মুলেশন (মিলি)	ডিলবাৰ (লিটাৰ)	শেষ স্প্ৰেৰ পৰা চাপলাইকে কাটিবলৈ বহু লগা কাল
ধান	মজাহোৱা পোকে	৫০ -	১০০০ -	৫০০	৩০ দিন
	মুখাফড় কবিৰ	৭৫	১৫০০		
	চেটেজিয়া পাত কাবি				
	ধানৰ পাতমেৰিয়া পোকে				
	ধানৰ গল মিজ				
	ৱ'ৰ্ম মেগট				
	বন্ধা পিচিয়া গছ কবিৰ				
বন্ধাকবি	চকৰবগ ৰেক মথ	৪০ -	৮০০ -	৫০০	৭ দিন
		৫০	১০০০		
জলকীয়া	থ্ৰিপ্ছ, মোৱাপোক,	৪০ -	৮০০ -	৫০০	৭ দিন
	ৰুবাফুলক পোকে	৫০	১০০০		
কুইচানত	আফৰিয়া আফৰিয়া	৭৫ -	১৫০০ -	৫০০	৯ মাস
	আৰু শিপাৰিয়া পোকে	১০০	২০০০		
কপাহ	মোৱাপোক	৭৫ -	১৫০০ -	৫০০	৬ দিন
	গো পোকে	১০০	২০০০		
	স্থাইট জাতীয় পোকে				
	বন্ধাবাখি				
	কপ্পা পোকে	১০০	২০০০	৫০০	

প্ৰয়োগৰ সময়: ধান: বোৱাৰ পিছৰ ২৫-৭ পৰা ৩০ দিনৰ ভিতৰত ফিপ্ৰনিল ৫% প্ৰয়োগ কৰা উচিত। বন্ধাকবি: বোৱাৰ ৩০-৩৫ দিনৰ পিছত অথবা চেতিয়াই কীট-পতঙ্গই আক্ৰমণ কৰা দেখা যায়, যিটোহেই প্ৰথমে ঘটে সেই সময়ত প্ৰথম স্প্ৰে কৰা উচিত। ৭-১০ দিনৰ ব্যৱধানত আৰু ২/৩ বাৰ স্প্ৰে কৰিব। জলকীয়া: বোৱাৰ ৪০-৫০ দিনৰ পিছত অথবা চেতিয়াই কীট-পতঙ্গই আক্ৰমণ কৰা দেখা যায়, যিটোহেই প্ৰথমে ঘটে সেই সময়ত প্ৰথম স্প্ৰে কৰা উচিত। ৭-১০ দিনৰ ব্যৱধানত আৰু ২/৩ বাৰ স্প্ৰে কৰিব। কুইচান: আফৰিয়া আফৰিয়া পোকৰ বাবে বোৱাৰ ৩-৫ দিনৰ পিছত ডাল-পাতৰ প্ৰয়োগ কৰিব আৰু শিপাৰিয়া পোকৰ বাবে বোৱাৰ সময়ত প্ৰয়োগ আৰু মাটি দিয়াই শোধন কৰিব।

ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ: প্ৰয়োগৰ বাবে ব্যৱহাৰ ২ঁছুটি: চেপাচক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কণ্ঠচালিত নেপচাক স্প্ৰেয়াৰ, কণ্ঠচালিত নেপচাক বেটেৰী, স্প্ৰেয়াৰ বা ৰকেট-এইচটিপি স্প্ৰেয়াৰ আদি। **সংৰক্ষণমূহ:** ১. ভাল সাহচী, খাদ্য সামগ্ৰী বা খাদ্য পশু খাদ্যৰ পৰা দূৰত ৰাখিব। ২. ধূম, চড় আৰু ছালত লাগিবলৈ নিদিব। ৩. স্প্ৰে কৰিবা উপাহত কৰা কাম কৰিব আৰু কৰিব আৰু আৰুৰ ভালদৰে ধুই পেলাব লাগিব। ৪. স্প্ৰে কাৰ্য সময়ত ধূমপান কৰা নাযাব। ৫. চকুত সাহিলে, প্ৰচুৰ ১০-১৫ মিনিট সময় ধৰি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ নিৰ্মলতা পানীৰে চকুৰ ধুই ধুই পেলাব। ৬. চকুত সাহিলে, প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ নিৰ্মলতা পানীৰে চকুৰ ধুই ধুই পেলাব। ৭. উপাহত সাহিলে চেতাৱ। বিষয়: কোনো বিশেষ বিষয়ৰ বিষয়ে জনা নাযাব। লেবল অনুযায়ী ব্যৱিহাৰ চলাব। **ব্যৱহাৰত নাই কৰণ:** ১. খাদ্য পোকেৰে, অহাৰিছি কৰা আৰু কেটিন, পাত্ৰ হোৱা-পকনা কৰা পানী আদি পৰিষ্কাৰ আৰু পানীৰ প্ৰচুৰ ঘটিল নোহোৱাকৈ নিৰ্মাণৰ নাই কৰাটো চেকুৰনাকৰবিৰ উৎপাদকৰ, অৰ্থাৎ লোক আৰু ব্যৱহাৰকাৰক কৰিবা হব। ২. ব্যৱহৃত পোকেৰে পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰ, পোৰে সেইবিলাক ব্যৱিহাৰ এবি অহা অপিচিত। ৩. পোকেৰেবিলাক ভাৰি-চিন্তি, অনবগ্ৰিক পৰা আঁতৰত মাটিৰ তলত পুতি পেলোৱা উচিত। **মাতৃকবৰ:** ১) কীটনাশক থকা পোকেৰেবিলাক অন্যান্য সাহচী মাতৃৰ বখাব বাবে ব্যৱহৃত কোচা বা ইটিৰ পৰা আঁতৰত পৃথক কোচা বা ইটিৰ মাতৃৰ বখা উচিত অথবা কীটনাশক পৰিমাণ আৰু শুকুৰিত ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পৃথক আলমাৰিত তলা মাৰি ৰাখিব। ২) কীটনাশক মাতৃৰ বখা কোচা বা ইটিয়োৰখ মজবুত, শুকনা, পোকমুক্ত, বতাহ চলাচল কৰিব পৰা আৰু কপাহ দ্বাৰা ঢকি ৰখা নোহোৱাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

ৰাসায়নিক গঠন:

ফিপ্ৰনিল সক্ৰিয় উপাদান (ন্যূনতম বিশুদ্ধতা ১০%)	৫.০% ওজন/ওজন
ৰেপিচুৱল তেল	৫.০% ওজন/ওজন
ৰেটিন এজেন্ট (নেফথেলিন চালফোনেট)	৩.০% ওজন/ওজন
চাচপেণ্ডিং এজেন্ট (চাচিয়াম লিগনো চালফোনেট)	৮.০% ওজন/ওজন
ষ্টিকিং/ষ্টেবিলাইজিং এজেন্ট (কাৰ্বাক্সি মিথাইল চেলুজ'ক)	৪.০% ওজন/ওজন
ডিস্পাৰ্সিং এজেন্ট (চাইচোনাফথিল মিথানল চালফ'নিক এচিডৰ চাচিয়াম চাল্ট)	৩.০% ওজন/ওজন
ইমালচিফাইৱৰ মিশ্ৰণ (এনচিকল ফেনল ইথাক্সিলেট, ৰেজলিয়াম এলকিল বেনজিল চালফ'নেট)	
প্ৰপাইইলিন মিশ্ৰণ পানী)	৮.০% ওজন/ওজন
পানী	পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ
মুঠ	১০০.০% ওজন/ওজন

Assamese

স্টালকর এস.সী. — ঃপিপ্রোনিলে 5% এস.সী. — (ঘুসকিকৰ্কোলৰী)

ঃপিপ্রোনিলে 5% এস.সী. ঐক ঘুসকিকৰ্কোলৰীযাকুও. ইয়ু হেৰে ঘুসকিকৰ্কোলৰী ঘুসকিকৰ্কোলৰী ঘুসকিকৰ্কোলৰী