द्रवपदार्थ यांचे संतुलन राखा. वेदनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मॉर्फिन आणि पिथेडाइन देता येते. लक्षणे सुरू राहिल्या डायमरकेप्रॉल किंवा पेनिसिलेमाइन द्या. पेनिसिलीन १०-४० मिग्रॉ./किग्रॉ./दिवस (कमाल १-२ ग्रॉ/दिवस भागिले चार मात्रा या प्रमाणात) या प्रमाणात पाच दिवसापर्यंत दिले जाऊ शकते. डायमरकॅप्रॉल हे पहिले चार दिवस ३ मिग्रॉ/किग्रॉ या मात्रेने दर चार तासांनी आणि दोन मिग्रॉ/किग्रॉ प्रमाणे दर बारा तासांनी याप्रमाणे एकूण दहा दिवस रक्तवाहिनीतून दिले जाते. जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी पहिल्या चार तासात विषबाधेनुसार द्या.

शिफारशी : केळ्यावरील पानांचे ठिपके व फळ सडणे, टोमॅटो व बटाट्यावरील सुरुवातीस व नंतर येणारा करपा, सुपारीच्या पानावरील ठिपके व फळाचे सडणे, द्राक्षावरील केवडा आणि भात, वेलची, जिरे, कॉफी, चहा व टोमॅटोच्या पिकावरील तपकिरी ठिपके त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी याची शिफारस केली आहे. थंड व कोरड्या जागे मध्ये ठेवा. उष्णता आणि आगीपासून दूर ठेवा.

ٹرُوکوپ **کاپر آکسیکلورایڈ ۵۰ ٪ ڈبلیو پی** **(کنٹیکٹ فانجیسایڈ)**

سی ء چھڑ ء وارہباو اثردار فانجیسایڈ بس کاپر آکسیکلورایڈ ۵۰ ٪ وزن/وزن کاپر کنٹنٹ ء ہیلیس ایڈیونٹس میٹھ دارہار۔ کیمیائی ترکیبی جز: کاپر آکسیکلورایڈ تکنیکی (مشمکم ۵۷ ٪ صاف کاپر سان) ۸۵.۰۰ ٪ وزن/وزن، گلمن وول ایجنٹ انکٹل نیتھتلل سلفونیٹ ۲.۰۰ ٪ وزن/وزن، وٹینک ایجنٹ انکٹل ایرلیل سلفونیٹ ۲.۰۰ ٪ وزن/وزن، چپکن وول ایجنٹ کارٹسی میتھتیل سیلیوس ۳.۰۰ ٪ وزن/وزن، چینا/کیولینڈ میڈھ ۸.۰۰ ٪ وزن/وزن، کل: ۱۰۰.۰۰٪ وزن/وزن۔ استعمالک طریق: استعمال کرن ء یوذنہ وچھیو دین ء آمڑ پوچی۔ احتیاط: ۱۔ گھین چین گن بانن نش، غلی گھین چین کن بانن نش ء چاداین بند خزہ نش تھماوو دور۔ ۲۔ اسس، اچھن ت ء زم ء سیتھ رلن ء نش کرینو احتیاط۔ ۳۔ چھرکاوک گرہ اندر مین نش کرینو پرہیز۔ ٹوکی کرینو چھرکاو پوکن ہوایک رخ آس ء۔ ٤۔ چھرکاوہت ء چھایو لازن ء امت پاوت ء جسم پورہ پاہ نھہ۔ ٥۔ چھرکاو دوران کس ء سکیٹ چیون، تریش چین، کھیان یا ڑپن۔ ٦۔ چھرکاو کرنس دوران یا رلاونس دوران کس ء پورہ حفاظتک پاو این لاگن ء۔ علاج: میاءد کرینو خالی گیسٹرک لیونگ طریق ء دودھ سیتھ یا اہم طور پوٹیشم فیروسائیڈک سلوشن سیتھ۔ دمیو خھوٹک سفیدی ت ء باقی ڈیٹرجنٹس۔ الیکٹرولائٹ تہ آبک بیلنس تھماوو برابر ماڑنین دور ء ہیتھتین دمیو دخ رکاوو ء کھتر۔ اگر اثرات باسیائے دمیو ڈایمرکیپرول یا پینیسلیمایین۔ پینیسلیمایین ڈوز ہیکو دستھ ۱۰-۴۰ ایم جی/کلوگرام/دہ دستھ (زیادہ کھوت زیادہ ۱-۲ گرام پرتھتہ دوہ ٹوزن حصن بند ڈوز بناوستھ) پانزن دوہ ٹن۔ ڈائیکرامپول ڈوز ہیکو دستھ ۳ ایم جی/کلوگرام پرتھتہ ڈورہ گنٹ ء گوڈنگن ٹوزن دوہ ٹن ت ء ۱۲ ایم جی/ کلوگرام پرتھتہ ۱۲ گنٹ ء کل ۱۰ ٹن دوہ ٹن رگو گن۔ دمیو زہر لینگن گوڈنگ ٹوزن گنٹن منز زیادہ فایدہ واتناوو ء کھتر۔ فائیڈ کرن ء آمت: ی ء چھڑ ء فائیڈ کرن ء آمت کیلن منز پنگ داخ ت ء میو دوہن، ٹماٹرن ت ء اولوین منز گوڈ ت ء بہت ء لگن واجن بلیٹن، بیٹل کن پتس داخ تہ گوڈ دوہ نس، وچھن منز ڈاون ملڑو نش، ت ء کنگس گورین داخس، داچین، زیر، کافی، چائے، تولگ فسکلس داخس چگن ء کھتر۔ تھماوڈان سرد، خشک جائے گرمی ت ء بار نش دور

Manufactured & Marketed by : Indofil Industries Limited, Redg. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादक व विक्रेता : इंडोफिल इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, रजि. ऑफ़िस: कल्पतरू स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९

Factory : Unit SS - C/o S.S. Crop Care Limited, Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) - 462023, **Unit G** - Plot No. 2201,2202,2336,2337, G.I.D.C., Panoli, Taluka: Ankleshwar, Dist.: Bharuch, Gujarat - 394 116

फैक्टरी : यूनिट एसएस - C/o एस. एस. क्रॉप केअर लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरीया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) - ४६२०२३, **यूनिट जी** प्लॉट नं. २२०१,२२०२,२३३६,२३३७, जी.आय.डी.सी., पानोली, ता.: अंकलेश्वर, जि.: भरूच, गुजरात - ३९४ ११६

Batch No.:
बैच नं.:

Mfg. Date :
उत्पादन तिथि :

Exp. Date :
समापन तिथि :

Max. retail price ₹ :
inclusive of all taxes
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
सभी करों सहित

For any complaint contact
Customer Care Cell at
Indofil Industries Limited,
Kalpataru Square, 4th Floor,
Kondivita Road,
Off Andheri-Kurla Road,
Andheri (East),
Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

For identification of Factory please see first Alphabet of Batch No. फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखें

Regn. No.: CIR-44,236/2003-Copper Oxychloride (WP)(235)-850
रजि. नं.: सीआईआर-४४,२३६/२००३-कॉपर ऑक्सीक्लोराईड (डब्ल्यू पी)(२३५)-८५०
Mfg. Lic. No.: Unit SS - 124, Unit G - 850
उत्पादन लाईसन्स नं.: यूनिट एसएस - १२४, यूनिट जी - ८५०

COPPER OXYCHLORIDE 50% WP

TRUCOP®

CONTACT FUNGICIDE

ट्रूकॉप

INDOFIL SEAL OF QUALITY

खतरा
DANGER

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए

Manufactured & Marketed by :

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

® - Registered Trademark of Indofil Industries Limited, Mumbai, India

COPPER OXYCHLORIDE 50% WP

TRUCOP ® **CONTACT FUNGICIDE**

Chemical Composition : Copper Oxychloride Tech. (Min purity 57% Cu content) 85.000% w/w, Dispersing agent Alkyl napthyl sulphonate 2.000% w/w, Wetting agent Alkyl aryl sulphonate 2.000% w/w,Sticking agent Carboxy methyl cellulose 3.000% w/w, China Lavigated Clay 8.000% w/w.Total : 100.00 % W/W. **Directions of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions** : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of the wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** Empty stomach by gastric lavage with milk or preferably sol. of Potassium ferrocyanide. Administer egg white and other demulcents. Maintain electrolyte and fluid balance. Morphine and Pethidine may be given to control pain. If symptoms persists, give dimercaprol or penicillamine. Pencillamine may be given in the dose of 10-40 mg/kg/day (max 1-2 gm/day divided into four doses) for five days. Dimercaprol is given in the dose of 3mg/kg every four hours for first four day and 2mg/kg every 12 hours for a total of 10 days by intravenous route. Give within first four hours as per poisoning to obtain maximum benefit. **Recommendations :** It is recommended to control leaf spot and fruit rot of banana, late and early blight of tomato and potato, leaf spot and foot rot of betel, downy mildew of grapes and brown leaf spot of paddy, cardamom, cumin, coffee, tea and tobacco crops. Keep in cool, dry place away from heat & open flame.

कॉपर आक्सीक्लोराइड ५०% संमिश्रणीय चूर्ण

ट्रूकॉप **स्पर्शीय फफूंदीनाशक**

रासायनिक संरचना : कॉपर आक्सीक्लोराइड (भारानुसार ५७ प्रतिशत कॉपर पर आधारित) ८५.०००% भार/भार, वेटिंग एजेन्ट – एलकेलएरिल सल्फोनेट २.०००% भार/भार, डिस्पर्सिंग एजेन्ट – एलकेल नैपथिल सल्फोनेट २.०००% भार/भार, स्टिकिंग एजेन्ट – कर्बाक्सीमिथाइल सैल्युलोस – ३.०००% भार/भार, चायनाक्ले / लवीगेटेड क्ले – ८.०००% भार/भार, **योग : १००.०००% भार/भार. उपयोग के लिये निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया :** १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। **विष नाशक :** रोगी को दूध या पोटेशियम फैरोसायनायड के घोल के साथ गैसट्रिक लवेज देकर पेट खाली करें। पेट साफ कर अंडे का सफेद भाग या अन्य डेमुलूसेट दे। इलेक्टोलाइड या अन्य संतुलित आहार दे। दर्द कम करने के लिए मारफीन या पेथिडीन दे। जहर के लक्षण दिखने पर डायमरकेप्राल या पेनिसिलामीन दे। पेनिसिलामीन की मात्रा १०–४० मिग्रा./किग्रा/प्रति दिन अधिकतम १–२ ग्रा प्रति दिन चार भागो मे बांट कर पाँच दिन देनी चाहिये। डायमरकेप्राल ३ मिग्रा./किग्रा पहले चार दिन प्रति चार घंटे पर तथा २ मिग्रा/किग्रा हर १२ घंटे पर कुल १० दिन तक देना चाहिये। अधिक फायदे के लिये जहर चढने के पहले चार घंटे के अंदर दवा दें। डायमरकेप्राल का इंजेक्शन नाडियों मे दें। **उपयोग :** इसका उपयोग केला के पर्णचित्ती तथा फल विगलन, टमाटर और आलू के अगेता तथा पछेता अंगमारी, पान के पर्णचित्ती व पद विगलन, अंगुर के मृदु रोमिल आसिता तथा धान, इलायची, जीरा, काफी, चाय और तम्बाकू के रोगी को रोकने हेतु किया जाता है। सुखी और ठंडी जगह में रखे। आग और गर्मी से दुर रखे।

कॉपर ऑक्सीक्लोराईड ५०% डब्ल्यू पी

ट्रूकॉप **स्पर्शजन्य बुरशीनाशक**

रासायनिक संरचना : कॉपर ऑक्सीक्लोराइड टेक. (किमान शुद्धता ५७% सीयू पदार्थ) ८५.०००% मा/मा, पसरविणारा घटक अल्काइल नॅफ्थाइल सल्फोनेट २.०००% मा/मा, भिजविणारा घटक अल्काइल अराइल सल्फोनेट २.०००% मा/मा, चिकटवून ठेवणारा घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज ३.०००% मा/मा, चायना लॅविगेटेड क्ले ८.०००% मा/मा, एकूण :१००.०० मा/मा. **वापरासाठी सूचना :** वापर करण्यापूर्वी कृपया सोबत दिलेले पत्रक वाचा. **खबरदारी** : १. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे आणि पशुखाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क येऊ देऊ नका. ३. फवारणीचे बाष्प श्वासात जाऊ देऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग व्यवस्थित धुवून काढा. ५, फवारणी करीत असताना धूम्रपान करू नका तसेच काहीही खाऊपिऊ व चघळू नका. ६. मिश्रण तयार करताना व फवारणी करताना संपूर्णतः सुरक्षात्मक कपडे वापरा. **उतारा :** दूध अथवा शक्यतो पोटॅशियम फेरासायनाईडचे द्रावण वापरून गॅस्ट्रिक लॅव्हेजने पोट रिकामे करून घ्या. अंड्याचा पांढरा भाग आणि इतर उपशामक पदार्थ द्या. इलेक्ट्रोलाइट आणि