TADKA 71®

Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG

(Systemic Herbicide)

Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG is a non selective, post emergence herbicide for the control of annual, perennial, broadleaf and grassy weeds. Ammonium salt of Glyhosate 71% SG when applied to foliage reaches the roots and rhizomes, the plant parts the process of translocation, thus destroying the weeds from below the ground. It is especially effective against the difficult to control weeds.

Recommendation :

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
		A.I. (Kg)	Formulation (Kg)		
Tea and non crop	Acalypha indica, Sida acuilata, Ipomea digitata, Chicorium entibus, Digera arvensis, Digitaria sanguinalis, Paspalum conjugatum, Ageratum, conyzodes, Cynadon dactylon, Cyperus rotundus, Eragrostis spp	2.13	3	500	7

Direction of Use : Apply to perennial weeds as post emergence application which should be have at least 4 to 5 leaves so that translocation into the plant can occur. Very early treatment of vegetation may reduce weed control but good results are obtained by treating mature plant. Glyphosate 71% S.G. is to be diluted with clean water and sprayed uniformly using an efficient sprayer at dosage given in table. Measure out quantity of the product and mix it well with required quantity of water. Application is to be done through knapsack or backpack sprayer. (FARMER PROTECTION EQUIPMENT : Standard knapsack or backpack sprayer fitted with fan jet cone or flood jet nozzle are satisfactory for spraying. The manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the closed in sealed, original packing.

Precaution : Do not use cooking utensils for preparing sprays. Use stick for stirring the spray. Wear hand gloves to avoid contact with your skin. also avoid inhalation and contact with eyes. Wear protecting clothing, mask, goggles and boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution.

Symptoms Of Poisoning : It is primarily irritant to skin, eyes and respiratory tract.

First Aid : Symptomatic harmful if swallowed. Do not get into the eyes, skin and clothes. In case of contact, wash immediately with plenty of water for at least 15 minute. In case of Poisoning, call a physician. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after working is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray material in to them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not spray when bees are active. When used at recommended dosage, no adverse effect on wild life. In case of any sign of poisoning, immediately contact with doctor.

Antidote : Gastric lavage, supportive and symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be duty of manufactures, formulators of herbicide and operators to dispose packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be kept outside to prevent their reuse. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the material. The rooms or premises means for storing shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Ammonium Salt of Glyphosate a.i. (in situ) (Based on 100% purity)	71.00%w/w
Intert Polyoxyethylene Amine Surfactant	12.50%w/w
Moisture	1.00%w/w
Ammonium solphate	QS % w/w
Total	**100.000%w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

English

तड़का 71

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी.

(अंतप्रवाही खरपतवारनाशक)

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी. एक अकुंश पश्चात, अंतप्रवाही खरपतवारनाशी है जो एकवार्षिक, बहुवार्षिक, चौड़ी पत्ती तथा घास खरपतवारों को नष्ट एवं नान-क्राप क्षेत्र में नियंत्रित करता है। अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी. का जब पौधे की पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है तब यह पौधे की जड़ एवं राइजोम तक प्रवाही प्रक्रिया द्वारा पहुंचाता है। इस प्रकार खरपतवारों को जमीन के नीचे से ही खत्म करता है। यह कठिन नियंत्रण वाले खरपतवारों के लिए विशेषकर उपयोगी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली.)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स.त.तत्व (कि.ग्रा)	संरचना (कि.ग्रा)		
चाय व नॉन क्रॉप	एकालिफा इंडिका , सिडा अॅक्युटाला, आयपोमीआ डिजिटाता चिकोरियम एंटिबस, डायरेसा आर्वेन्सिस, डिजिटारिया सैंगुनॉलिस, पेस्पालम कॉन्युग्टम, अगेरेटम कॉनिझोइडस, सायनाडान डेक्टायलोन, सायपरस रोटुंडस, इरागोस्टिस एसपी	२.१३	३	५००	७

उपयोग के लिए निर्देश : जिन बहुवर्षीय खरपतवार पर कम से कम ४ से ५ पत्ते हो ऐसे खरपतवार पर अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी. का इस्तेमाल अकुश पश्चात करें ताकि स्थानान्तरण हो सके। नई पौधों अवस्था में हो तो खरपतवार को कम करता है पूर्ण अवस्था के खरपतवारों पर इसका असर अच्छा होता है। अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी. का घोल साफ पानी में कर के सिफारिश की गई दर से एकसमान इस्तेमाल अच्छी उपकरणों से करें। दवाई के घोल का प्रमाण नीचे दिए गए टेबल के अनुसार कीटिपाव। मात्रा के अनुसार दवाईयां नापकर उसका पानी में अच्छी तरह घोल बनाइये और नैपसेक या बैकपेक स्प्रेअर्स से उसका उपयोग करें । पौध सुरक्षा यंत्र - नैपसेक या बैकपेक स्प्रेअर्स, फैन जेट कोन और फ्लाट जेट नोझल के साथ उपयोग करें ।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : घोल बनाने के लिए खाना पकाने के बर्तनो के इस्तेमाल मत कीजिए। घोल को हिलाने के लिए लकडी का प्रयोग करें । त्वचा के सम्पर्क से बचने के लिए दस्ताने पहने । सांस द्वारा अन्दर जाने और आंखो के सम्पर्क से बचे । स्प्रे करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े मास्क, बूटस, चश्मा आदि पहनें । खुद को स्प्रे के सामने न लाये । नोजल्स मे मुहँ से फूकने न मारे । उपयोग की उठाते, रखते या प्रयोग करते समय धूम्रपान, खाना, पीना नही चाहिए । इस्तेमाल किये गए स्प्रे घोल को इधाना का संग्रहण मत कीजिये, प्रतिदिन प्रयोग के बाद स्प्रेयर और अन्य बर्तनो को पानी से धोये । कार्य समाप्त होने के बाद हाथो को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोये।

विष के लक्षण : सम्पर्क होने पर झुरयाता मे त्वचा, आंखो तथा श्वासनली मे जलन पैदा होती है ।

प्राथमिक चिकित्सा : निगलने पर नुकसान पहुँचता है । मुहँ त्वचा और आंखो के सम्पर्क से बचायें । यदि सम्पर्क हो तो भरपूर पानी से १५ मिनट तक धोए । त्वचीय ज़ाखर्म को बुलाइये ।

चेपनाशक : अमाशय लवणनुतुसार दवाई दीजिए ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १.कीटनाशक निर्माताओ या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडकोड कर आबादी से दूर जमीन मे गाड देना चाहिए । २.प्रयोग किए गए डिब्बो को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोडे । ३. डिब्बों या बडी बुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की नदी, पोने का पानी विषैला न हो ।

संग्रहण की शर्तें : कीटनाशक के डिब्बो को अलग अलग कमरे या अलमारियो मे कीटनाशक के प्रमाण और प्रकार के हिसाब से अन्य कमरे या अलमारियो विशेषकर खाद्य पदार्थों रखे गए जाने वाले पदार्थो से दूर लाला जा चाहीं में रखें । जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो तो सुखा, प्रकाशमय हवादार तथा पर्याप्त लंबा होना चाहिए, जिससे कीटनाशक की मात्र से मजूबत का डर ना रहे ।

रासायनिक संरचना :

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट (इन सीटू - १०० शुद्धता पर आधारित)	७१.००% भार/भार
इनर्ट पॉलीऑक्सी इथलीन अमाईन सरफेक्टॅंट	१२.५०% भार/भार
पानी	१.००% भार/भार
अमोनियम सलफेट	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग	**१००.००% भार/भार**

चेतावनी : इस लेबल / पत्रिका में निर्देशित किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें ।

Hindi

तडका 71

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ % एस. जी.

(आंतप्रवाही तणनाशक)

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ % एसजी हे अंकुरनांतर पानरपाणी तणनाशक असून एकाच पानावर दर वर्षी येणाऱ्या, बहुवर्षीय, रुंद पानांच्या तसेच गवतांच्या तणांच्या नियंत्रणासाठी वापरला जाते. अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एसजी वनस्पतिच्या पानावरचा तणांवर फवारणी केल्यानंतर प्रक्रियेने त्यांच्या मूळांपर्यंत जाऊन त्यांचा नाश करतो. त्यामुळे तणांचे नियंत्रण होणे कठीण असते त्यांच्यासाठी हे विशेषत: उपयोगी आहे.

उपयोग:

पिके	कीटकाचे नाव	मात्रा (हे)		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	शेवटच्या फवारणीपासून काढणीपर्यंतचा कालावधी (दिवसांमध्ये)
		ए. आय. (किग्रा)	संरचना (किग्रा)		
चहा व नॉन क्रॉप	ऐकालिफा इंडिका , सिडा अॅक्युटाला, आयपोमिआ डिजिटाता चिकोरियम एंटिबस, डायरेसा आर्वेन्सिस, डिजिटारिया सैंगुनॉलिस, पेस्पालम कॉन्युग्टम, अगेरेटम कॉनिझोइडस, सायनाडान डेक्टायलोन, सायपरस रोटुंडस, इरागोस्टिस एसपीसी.	2.13	3	500	7

वापरताशी सूचना : ज्या तणांवर विभाग ४ ते ३ पाने आलेली असतील अशा बहुवर्षीय तणांसाठी वापरावे. नवाने रोपांमध्ये स्थानांतरण होऊन शकेल. तण अगदी लहान असताना वापरल्यास तणांवर नियंत्रण देवता येईल पण तण वाढल्यानंतर तणांवर फवारल्यास अधिक चांगले परिणाम दिसून येतात. अमोनियम ७१% एसजी स्वच्छ पाण्यात मिसळून घ्यावे व ते वरील तक्त्यात दिलेल्या प्रमाणानुसार, चांगल्या फवारणी यंत्राद्वारे फवारावे. उत्पादन मोजून घ्यावे व ते पाणी आवश्यक गाळत घेऊन त्यात मिसळावे. पॅन जेट कोन किंवा फ्लड जेट नोझल बसवलेले नॅपसॅक किंवा बॅकपॅक स्प्रेअर्स वापरावे. उत्पादन बंद सीलमध्ये, मूळ पॅकिंगमध्ये प्राप्त केलेले असल्यास उत्पादक उत्पादनाच्या दर्जाची हमी देतील.

वापरताना सावधगिरी : फवारणीचे मिश्रण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नयेत. फवारणीचे मिश्रण हलवीने ढवळावे. त्वचेशी संबंध टाळण्यासाठी हातमोजे वापरावेत. बाहयाडे आत येऊ नये व डोळ्यांशी संपर्क टाळावा. फवारणीच्या हितीयावापासून स्वत:चे संरक्षण करावे. नोझल्सचा फुंकून घोटा. उपयोग झालाकाय किंवा वापर करताना वाहीही खाऊ नका. रिकाम फवारणीचा पदार्थ तसा ठेवू नये.

विषबाधेची लक्षणे : त्वचेची, डोळ्यांची जळजळ होणे व श्वसनमार्गाचा त्रास होणे.

प्रथमोपचार : जर विषारी गेले तर घोळवायचा असेल. डोळे, त्वचा व कपडयांशी संपर्क येऊ देऊ नका. संपर्क आल्यास, ताबडतोब भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे धुवावे. विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना बोलवा. दररोज वापरी झाल्यानंतर भांडी भरपूर पाण्याने किमान १५ मिनिटे धुवावे. काम संपल्यानंतर हाता भरपूर साबण व पाण्याने धुवावेत व कपडे बदलावेत. प्रदूषित झालेले कपडे धुवावेत. फवारणीचे उरलेले साहित्य झऱ्यात, ओढ्यात, पाण्याच्या सोतांमध्ये धुवून, प्रदूषित बादल्या धुवून त्या पाणी प्रदूषित करू नये. जेव्हा मधमाशा सक्रिय असतील तेव्हा फवारणी करू नये. शिफारस केलेल्या मात्रेनुसार वापरल्यास, वन्य पशुंवर परिणाम होत नाही. विषबाधेची लक्षणे दिसल्यास ताबडतोब डॉक्टरांना बोलावावे.

विषनाशक उतारा : आमाशय (गॅस्ट्रिक लव्हाज), आधारीत व लक्षणानुसार उपचार करावे.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट : १. तणनाशकाचे उत्पादक, फॉरम्युलेटर्स यांनी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्याची व धुवाणाची विल्हेवाट सुरक्षित पद्धतीने लावली पाहिजे, उपयुक्त पर्यावरणाचे व पाण्याचे प्रदूषण टाळले जाईल. २. वापरलेले पॅकेजेस बाहेर टाकून देऊ नयेत, व त्याचा पुनर्वापर टाळावा. ३. पॅकेजेस तोडून टाकावीत व मानवस्थाच्या वस्तीपासून दूर गेल्यानंतर पुरावीत.

साठवणुकीच्या अटी : कीटनाशकाची पॅकेजेस स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा इतर साहित्य/वस्तू, साठवलेल्या ठिकाणापासून दूर साठवावीत किंवा साहित्याच्या संख्या व आकारानुसार कुलुपाची सोय असलेल्या स्वतंत्र कपाटात साठवावीत. साठवणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या चांगल्या बांधणीच्या, कोरड्या, भरपूर उजेड असलेल्या, हवा खेळती असणाऱ्या व पुरेशा मोठ्या आकारच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचना :

अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१% एसजी (इन सीटू) (१०० % शुद्धतेवर आधारीत)	७१.००% भार/भार
इनर्ट पॉलिऑक्सिएथिलिन अमाइन सरफेक्टंट	१२.५० % भार/भार
पाणी	१.००% भार/भार
अमोनियम सलफेट	आवश्यकतेनुसार % भार/भार
एकूण	**१००.००% भार/भार**

सावधगिरीची सूचना : या लेबल/पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांसाठी वापर करू नये.

Marathi

તડકા 71

એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ 71% એસજી

(આંતરપ્રવાહી નીંદણનાશક)

ગ્લાયફોસેટનો એમોનિયમ ક્ષાર (એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ) 71% એસજી એક નિન-પસંદગીકારક, અંકુરણ પછી વાપરવામાં નીંદણનાશક છે, જે વાર્ષિક, બહુવાર્ષિક, પહોળા પાનના તથા ઘાસીય નીંદણોને નિયંત્રિત કરવા વાપરવામાં આવે છે. જ્યારે પર્ણિકાઓ પર એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ 71% એસજીની છંટકાવ કરવામાં આવે ત્યારે, તે સ્થળાંતરણની પ્રક્રિયા દ્વારા છોડવાઓના મૂળિયા અને મૂળિયાઓની ટોચ સુધી પહોંચે છે, તે રીતે, જમીનની નીચેથી નીંદણોનો નાશ કરે છે. ખેડવામાં કઠણતા ધરાવતા નીંદણો વિરુદ્ધ આ વિશેષતા અસરકારક છે.

ભલામણ :

પાક (પાકો)	નીંદણોનાં સામાન્ય નામ	માત્રા/ હેક્ટર		મંદ પાણમાં મંદ પાણી (લી.)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતિક્ષા સમય (દિવસમાં)
		સ.ત. (કિ.ગ્રા.)	કેમિકલિનામ (કિ.ગ્રા.)		
ચા અને નિન-ક્રોપ ક્ષેત્ર	ઐકાલિફા ઇન્ડિકા સિડા એક્યુટાલા,આઇપોમિઆ ડિજિટેરિઆ, ચિકોરીયમ એંટિબસ, ડાયરિસેરા સેલિન્વેનિસિસ, પેપાલમ કોન્જ્યુગેટમ, એરેટમ કોનીઝોઇડસ, સાયનાડોન ડેક્ટીલોન, સાયપેરસ રોટુંડસ, એરાગ્રોસ્ટિસ એસપીબી.	2.13	3	500	7

ઉપયોગ અને દિશાઓ અંકુરણો ઉપ્પર પહોચી છંટકાવ તરીકે, જેનાં ૪થી 8 પાંદડાંઓ ફૂટ્યાં હોય તેવાં વાર્ષિક નીંદણો પર છંટકાવ કરો, જેથી છોડમાં સ્થળાંતરણ થઈ શકે. વનસ્પતિનો બહુ પહેલાંનો છંટકાવ નિંદણ નિયંત્રણ ઓછું કરી શકે છે, પરંતુ પરિપક્વ છોડનો છંટકાવથી સારાં પરિણામો મેળવી શકાય છે. એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ 71% એસજીને સ્વચ્છ પાણી વડે મંદ પાડવું જોઈએ અને ઇચ્છિત માત્રા અનુસાર ફરજિયાત સ્પ્રેયર વડે સમાનરૂપે છંટકાવ કરવો. પ્રોડક્ટની ચોક્કસ માત્રા માપવી જોઈએ અને પછી ઝરણ સ્પ્રેયર વડે પ્રોડક્ટ ઓલવીને સારી રીતે ભેળવો. સ્પ્રેયરો અથવા નોઝલ સ્પ્રેયર મારફત ઉપયોગ થવો જોઈએ.

ફ્રિ સ્પ્રેયરો ઉપયોગ : ફિલ્ટરમ સ્ટાઈ જેટ નોઝલ લગાડેલાં સ્ટાન્ડર્ડ નેપસેક અથવા બેકપેક સ્પ્રેયર છંટકાવ માટે સંતોષપ્રદ છે. જો સીલબંધ, મૂળ પેકિંગમાં પ્રાપ્ત કરેલો હોય, ઉત્પાદક પ્રોડક્ટની ગુણવત્તાની ખોરવી બાંધે છે.

સાવધાની : છંટકાવ મોઢેથી ફુકાવા તૈયાર કરવા માટે રાંધવાનાં વાસણોનો ઉપયોગ કરવો નહીં. નીંદણનાશકોને હાથ પ્રમાણમાં પાણીમાં ઓગળેલી રાખીને કેડાતી કરવાં. તમારી ત્વચાનો સ્પર્શ ટાળવા માટે હાથમોજાંનો ઉપયોગ કરો. વધુમાં સુરક્ષાનું અને ખોબાનું સ્પર્શ નહીં કરવાં કામ કરતાં તેની કાળજી લેવી. છંટકાવ કરતી વખતે રક્ષણાત્મક પોષાક, માસ્ક, ગોગલ્સ અને બૂટનો ઉપયોગ કરવો અને તેથી દૂરસેરેથી પોતાનું રક્ષણ કરવું. નોઝલી નોઝલમાં ફુંકવું નહીં. નીંદણો નોઝલમાં ફુંકવું નહીં. વધારે પડતાં ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ખાવું, પીવું કે ધૂમ્રપાન ન કરવું. વધારપડતાંફાલતુ સ્પ્રાયર સેલ્ટિંદન ન કરવું.

ઝેરની અસરનાં લક્ષણો : પ્રાથમિકપણે આ ત્વચા, આંખો અને શ્વસનતંત્ર માટે બળતરા ઉત્પન્ન કરનારું સ્વભાવ છે.

પ્રાથમિક સારવાર : જો ગળી જવામાં લેવા તો, ઝેરી અસુરાર ઉપ્પર કરવી. આંખો, ત્વચા અને વસ્ત્રોમાં ન છંટાય તેની કાળજી લેવી. જો સ્પર્શ થયો હોય તો, પુષ્કળ પાણી વડે ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ માટે ધોઈ નાખો. જો ઝેરી અસર થઈ હોય તો, ચિકિત્સકને બોલાવવા. ઉપયોગ પછી સ્પ્રેયર, બાલ્ટીઓ અને અન્ય વાસણો પાણીથી વારંવાર ધોઈ નાખો. પુષ્કળ પાણી અને સાબુ વડે હાથ ધોયા અને કામ પૂરું થઈ ગયા બાદ વસ્ત્રો બદલવાં. વહેમાં, દૂષિત પડતો ઓવાં. વાઇલ પ્રાઇવાટ ધોવાણને ગરકાવો, સરોવરો, જળમાર્ગ વગેરેમાં વધારાનીની પ્રદૂષિત ન થવાં. જ્યારે મધમાખીનો સક્રિય કાળ હોય ત્યારે છંટકાવ ન કરવો. ભલામણ કરેલી માત્રામાં છંટકાવ કરવામાં આવે ત્યારે વન્યપ્રાણીઓ માટે પ્રતિકૂળ અસર થતી નથી. ઝેર થવાનાં કોઈ ચિહ્નો જણાય તો તરત જ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો.

વિષમારણ : ગેસ્ટ્રિક લવેજ, અવલંબનાત્મક તથા લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપવી.

વપરાયેલાં કન્ટેઇનરોનો નિકાલ : 1. નીંદણનાશકો ફોર્મ્યુલેટરર્સ (ઉત્પાદકો) તથા ઓપરેટરોની ફરજ રહેશે કે, તેમણે પેકેજુસ અને વધારાનાં મટેરિઅલ્સ અને મશીન અને કન્ટેનરમાંથી ધોવાણનો સુરક્ષિતરીતે નિકાલ કરે તેથી કરવે કે, પર્યાવરણ અથવા જળપ્રદૂષણ ટાળી શકાય. 2. વપરાયેલાં પેકેજુસ બાકીનો ઉપયોગ ન કરવાં તેથી તેઓ ખુલ્લાં ન રાખવાં. 3. ફ્રિક ઝેરે જેવી પાડીને ઢાંકી નાખવાં જોઈએ અને વસ્તીથી દૂર દાટવાં જોઈએ.

સંગ્રહણ સ્થિતિઓ : સામાન્યરીતે પ્રોડક્ટ ઓફ ડ્રમનાઓ, અન્ય વસ્તુઓ, ખાદ્ય ક્રીમ ખાદ્યમાંઓમાં સંગ્રહ કરવાની ઓરડીઓ, અલમારી ઓરડીઓમાં અથવા જગ્યાઓમાં પાર્ટીશન જથ્થા તથા ગુણવત્તામાં આધાર રાખી સંગ્રહ કરવાં જોઈએ. સંગ્રહીત કરવાની ઓરડીઓ અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે બંધાયેલી, સૂકી, અને પૂરતા હવા-ઉજાસવાળી અને પૂરતી મોકળાયાવાળી હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક સંયોજન :

એમોનિયમ સોલ્ટ ઓફ ગ્લાયફોસેટ સ.ઘ. (મૂળ સ્વરૂપે) (૧૦૦% શુદ્ધતા પર આધારિત)	71.000% વ/વ
નિષ્ક્રિય પોલીઓક્સીઇથાઇલીન ઇન્યુમીન સર્ફેક્ટન્ટ	12.50% વ/વ
જલ	1.00% વ/વ
એમોનિયમ સલ્ફેટ	સુયોગ્યરૂપે % વ/વ
કુલ	**100.000% વ/વ**

ચેતવણી : આ લેબલ /પરિપત્ર પર દર્શાવ્યા સિવાયની પાકો પર વાપરવું નહીં.

Gujarati

TADKA 71®

तड़का 71

(Systemic Herbicide)

(अंतप्रवाही खरपतवारनाशक)

Manufactured & Marketed by:
Indofil Industries Limited,
Regd. Office : Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

उत्पादन एवं विक्रेता :
इंडोफिल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
रजि.ऑफिस : कल्पतरु स्क्वेअर, ४थी मंजिल, कोन्डीविटा रोड, ऑफ अन्धेरी-कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९

Factory : Unit SS - C/o S. S. Crop Care Pvt. Ltd., Shed No. -10, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P) - 462023,
Unit H - Plot No. 104-1-A, GIDC Halol-2, Dist. - Panchmahal - 389350, Gujarat

फैक्टरी : यूनिट एस एस- C/o एस. क्रॉप केयर प्रा. लिमिटेड, शेड नं. -१०, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) - ४६२०२३,
यूनिट एच- प्लॉट नं. १०४-१-ए, जीआयडीसी हालोल-२, जि.- पंचमहाल - ३८९३५०, गुजरात

For Identification of Factory please see first Alphabet of Batch No.

फैक्टरी की पहचान के लिए बैच नंबर का पहला अक्षर देखे

For any complaint contact Customer Care Cell at Indofil Industries Limited, Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.
Toll Free No. : 1800-120-003-004,
email : customercare@indofil.com

®-Registered Trademark of INDOFIL INDUSTRIES LIMITED, Mumbai, India

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED

07.22

ТАДКА 71

Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ प्रतिशत एस.जी.

(अंतप्रवाही खरपतवारनाशक)

अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ % एस.जी. हा एकदल प्रजाती, बीज पोते आणि बहु पानी तणांचे नियंत्रणे हे वापरू धान्यिक शेत किंवा बांध-बंदारयांवर, पूजन देव हे कामकर वापरले जाते. अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट ७१ % सेलची ही वापरले जाते झुंड हे तोडणी वापरी है. पूजारी पुढिल पुढिल फवारणी देव रोपांच्या वाढ वेगवेगळ्या ठेव पाऊंच वापरी है, पिक वाढ़ वापरीत वा पाय मनीत दे देठां वापरी है। मिळाले वापरीत है बाबू पुढिलची प्रमाणित भरपूरी है, पुढिलं वापरीत है पिकाच्या वाढ़ वापरीत है।

शिफारसी :

प्रमाण	तणीत दर भाग नां	मात्रा/ हेक्टर		मंद पाण्या मंद पाणी (ली.)	कापणि शिवाय जे काम ही करणी है पिक संरक्षण (दिवस दिन)
		स.घ. (कि.ग्रा)	कीटनाशक (कि.ग्रा.)		
चाय आणि नॉन क्रॉप	चाय आणि नॉन क्रॉपमध्ये एकालिफा, सिडा अकाइटा, एकालिफा इंडिका, चिकोरियम एंटिबस, डायरिसेरा सेलिन्वेनिसिस, पेपालम कोन्जुगेटम, एरेटम कोनीझोइडस, सायनाडान डेक्टीलोन, सायपेरस रोटुंडस, एरागोस्टिस एसपीसी.	2.13	3	500	7

चेतावणी सल्ला : पाऊस पडल्यानंतर तणांवर फवारणी करावी म्हणजे तणांचे नियंत्रण चांगले होईल. तणांची उगवण होण्यापूर्वी फवारणी करू नये. तणांची उगवण झाल्यानंतर तणांवर फवारणी करावी. तणांच्या वाढीच्या वेळी फवारणी करावी. तणांच्या वाढीच्या वेळी फवारणी करावी. तणांच्या वाढीच्या वेळी