ટેમ્બોફિલ

ટેમ્બ્રોટ્રાન 34.4% ઙ/ઙ એસ.સી.
સ્વદેશી ઉત્પાદન માટે
(નિર્દોષી આથોજનાશક)

ટેમ્બોફિલ 34.4% ઙઙમ/ઙઙમ કલ્ટર્સ ધરાવતાં મગ્રા 344 ગ્રામ ટેમ્બોફિલ સક્રિય ઉપાદન દ્વારા 420 ગ્રામ ટેમ્બોફિલ સક્રિય નિરૂપણ જેટલાં સમાન.

ઉપયોગ :

પાક	કીટોના સામાન્ય નામ	મગ્રા/હેક્ટર a.i. (ગ્રામ)	ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.)	પાણીમાં ઓગાવા (લી.)	ભલામણ કરાયેલા પાકની લણણી પહેલાં રાહ જોવાનો સમય (દિવસો)
મકાઈ	સ્તાવી ચોખ્ખી બાંધવાવાટ	૧૨૦	૨૮૬	૫૦૦	૫૫

ઉપયોગ માટેની દિશાઓ - ટેમ્બોટ્રાન 34.4% વજન/વજન દ્વારા મિશ્રણ તૈયાર કરવું. ત્યારબાદ જરૂરી માત્રામાં પાકમાં ઓઝોલીફ અને ઘાસચારાના નીંદણના વિકાસ પહેલાં સ્પ્રેઇંગ કરવી મહીને ઉપયોગમાં લેવાતાં નીંદણ નાશક છે.

સ્પ્રેઇંગ૨૦૦/૧૦૦૦ મિલી/હેક્ટર સાથે વજન/વજન દ્વારા સંકલ્પના દ્વારા ટેમ્બોટ્રાન 34.4% નો ઉપયોગ કરો.

સમય અને ઉપયોગની પદ્ધતિ - નીંદણ નાશકનો ઉપયોગ, પ્રકાશ વખત ખાલે પાકમાં વ્યાપક પાંદડાવાળા અને ઘાસવાળું નીંદણ ઉમેરાય છે અને ઘાસ પર ૩ થી ૬ ઉપયોગ કરો.

નીંદણનાશકોના ઉપયોગ માટે સ્પ્રેઇંગ તકનીકો :

પ્રસ્વો - ઉપર ઇમ્પ્રોસમાં પ્રમાણે.

મિશ્રણ માટેની દિશાઓ - ટેમ્બોટ્રાન 34.4% વજન/વજન દ્વારા ઇચ્છા મુજબ જરૂરી પાણીમાં ભળી લો.

ઉપયોગ પ્રતિબિંધિતો - સ્પષ્ટ ખાસકર ફરતાંવાળા ઉપયોગ કરો. નજીકનું પવનની દિશામાં ઉપયોગ કરશો નહીં.

ફરીથી પ્રવેશ સમય - ૨૪ કલાક.

પૂર્વ લણણી અંતરાલ - મકાઈ પર દિવસ (પર કોષ્ટકમાં બતાવ્યા મુજબ).

ઉપયોગનો સમય - મુખ્યત્વે સવાર અથવા સાંજે.

આવતાં અને ઉપયોગની મહત્તમ સંખ્યા - જરૂરિયાત મુજબ વધુ એક ઉપયોગ.

ટ્રેન - કૃષિ ઉપયોગ માટે.

ઝોલો ઝેરી ઘ્વ - બલાયણ કરેલ ઝોન મુજબ ઉપયોગમાં લેવાતી પમરી જા ઓલિસાઇડ ઝેરી નથી.

સંભાળ કે જે દરમિયાન કીડીનુંપ્રાણ પર જંતુનાશકો લાગુ પાડવામાં આવશે નહીં -

પાક પાડ ત્યારે અને લણણી પહેલા ઉપયોગ ન કરો.

માટી અને પ્રાણી - તમામ પ્રકારની માટી અને પ્રાણી.

કૃષિ સ્થળ - ખેડેલ સ્થળે, લીડ સ્પ્રેર સ્પ્રેયર કૃષ્ટક, બેટરી ઓપરેટેડ સ્પ્રેયેર કૃષ્ટક અને ઉમ્ક્રમ ઝ્ઝ પાવર સંચાલિત ઇટ્રાપ ઉપયોગ.

નોઝલ - હોલો શંક્વ

પ્રવસ્રકારની દ્વારા સાવચેતી :

નીંદણનાશક સાથે અણસાવધીમાં ઉલ્લંઘનો ઠ્રિંગ કાળજી લેવાં જોઈએ. ત્યારબાદ ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ઉત્પાદકની સૂચનાઓ વાંચો.