কোগোরেজ

ট্রাভাযাবলাজোল ৭.৫% + মাংকোজেব ৬৭.৫% ডব্লিউপি

(ট্রাভাযাবলাজোল ৭.৫% + মাংকোজেব ৬৭.৫% ডব্লিউপি ধারণ করে এমন ডব্লিউপি)

ট্রাভাযাবলাজোল 18% + মাংকোজেব 62% ডব্লিউপি ধারণ করে এমন ডব্লিউপি

ট্রাভাযাবলাজোল ৭.৫% + মাংকোজেব ৬৭.৫% ডব্লিউপি ধারণ করে এমন ডব্লিউপি

ট্রাভাযাবলাজোল ৭.৫% + মাংকোজেব ৬৭.৫% ডব্লিউপি

ট্রাভাযাবলাজোল ৭.৫% + মাংকোজেব ৬৭.৫% ডব্লিউপি

উপযোগ

ফসল	রোগের নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রা	
		গ্রা.সি. (গ্রা.)	গ্রাম/লিটার (গ্রা.)
ধান	ব্লাস্ট	180+620=225+775	1000-1250
	খোলপোড়া	225+775	1250
কলা	সিগাটোকা লিফ স্পট	225+775	1250
	সিগাটোকা লিফ স্ট্রিক	225+775	1250

প্রয়োগের সময়/মাত্রা: ভালো ফলাফলের জন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার আগে বা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগ করুন। ১ লিটার জলে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তরে ৩ বার প্রয়োগ করুন। ধান: ৫০ দিন বয়সে প্রথম প্রয়োগ। কলা: ৩ মাস বয়সে প্রথম প্রয়োগ।

প্রয়োগ পদ্ধতি: ফলন ও গুণমান বজায় রাখতে ট্রাভাযাবলাজোল ৭.৫% + মাংকোজেব ৬৭.৫% ডব্লিউপি ধারণ করে এমন ডব্লিউপি ১ লিটার জলে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তরে ৩ বার প্রয়োগ করুন। ধান: ৫০ দিন বয়সে প্রথম প্রয়োগ। কলা: ৩ মাস বয়সে প্রথম প্রয়োগ।

সতর্কতা: ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার সময় ধূমপান, খাবার বা পানীয় গ্রহণ করবেন না। ব্যবহার করার পর হাত ও মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার সময় পুরো শরীর ঢাকা পোশাক এবং মাইক্রো ফিবার গ্লাভস পরুন। চোখ, ত্বক ও শ্বাসনালী রক্ষা করুন। ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার পর ভালো করে গোসল করুন।

সংরক্ষণ: ফুঙ্গিসাইড ঠান্ডা, শুকনো, বাতাস চলাচল করা এবং শিশু ও পশুর নাগালের বাইরে রাখুন। খাদ্য, পানীয় ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। মূল পাত্রে বন্ধ রাখুন।

সতর্কতা: ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার সময় ধূমপান, খাবার বা পানীয় গ্রহণ করবেন না। ব্যবহার করার পর হাত ও মুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার সময় পুরো শরীর ঢাকা পোশাক এবং মাইক্রো ফিবার গ্লাভস পরুন। চোখ, ত্বক ও শ্বাসনালী রক্ষা করুন। ফুঙ্গিসাইড ব্যবহার করার পর ভালো করে গোসল করুন।

সংরক্ষণ: ফুঙ্গিসাইড ঠান্ডা, শুকনো, বাতাস চলাচল করা এবং শিশু ও পশুর নাগালের বাইরে রাখুন। খাদ্য, পানীয় ও পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। মূল পাত্রে বন্ধ রাখুন।

কোকোরেড

মাংকোজেব ৬২% ডব্লিউপি

(মাংকোজেব ৬২% ডব্লিউপি ধারণ করে এমন ডব্লিউপি)

মাংকোজেব 62% ডব্লিউপি ধারণ করে এমন ডব্লিউপি

মাংকোজেব 62% ডব্লিউপি

মাংকোজেব 62% ডব্লিউপি

উপযোগ

ফসল	রোগের নাম	ডোজের পরিমাণ প্রতি একরে			বীজবোনার পূর্বে বীজ শোধন
		এ.আই (জি)	পেরেন্টাল ফরমুলেশন (জি)	ব্যবহার (লি)	
লেবু	ডাউনি মিলডিউ (পেরোনোস্পোরা লেবোনেসিস) ফোলেন্স), ব্লুমোল্ডস্টাই (কোলেটোট্রিকাম গ্লোয়োস্পোরিওইডেস), ফিলোস্টিকটা লেবোনেসিস), লেবোনেসিস), লেবোনেসিস),