ఇండోశూర్

కాంటాక్ట్ మరియు సిస్టమిక్ చర్యతో కూడిన శిలీంధ్రనాశిని

సైనోమాక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్లూపి

సైనోమాక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% కలిగి ఉన్న ఇరుకైన స్పెక్ట్రం శిలీంధ్రనాశిని. ఇది ఆకు మరియు పండ్ల తెగులు, ఆలస్యమైన బ్లైట్, బంగాళాదుంప మరియు టమోటాలపై ఎర్లీ బ్లైట్ తెగులు మరియు సిట్రస్ పండ్లపై పండ్ల గుమ్మడి (ఫైటోఫ్తోరా పాల్మివోరా) వంటి వ్యాధులకు వ్యతిరేకంగా రక్షణను అందిస్తుంది.

సిఫార్సు

పంట (పం)	శత్రువు పేరు	మోతాదు/ఎకరానికి		నీటి పరిమాణం	కోసుకోవడానికి ముందు వేచి ఉండే సమయం
		ఆల్ (గ్రాము)	ఫార్ములేషన్ (గ్రాము)	(లీటర్)	
పండ్లు	బంగాళాదుంప ఎర్లీ బ్లైట్	1080	1500	500-750	10
టొమాటో	ఎర్లీ బ్లైట్	1080	1500	500-750	10
సిట్రస్	పండ్ల గుమ్మడి (ఫైటోఫ్తోరా పాల్మివోరా)	180 నీ/ 100 లీ	250 నీ/ 100 లీ	10 లీ/ 100 లీ.	82

ఉపయోగించే విధానం: పంట సజావుగా పెరుగుదల కొరకు ఎరువు మరియు పురుగుమందు పిచికారీ చేసిన తర్వాత మాత్రమే పిచికారీ చేయండి. పండ్ల తెగులు మరియు ఆలస్యమైన బ్లైట్ కోసం, 7 నుండి 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయండి. పండ్ల గుమ్మడి కోసం, 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయండి.

పిచికారీ సమయం: పండ్ల తెగులు మరియు ఆలస్యమైన బ్లైట్ కోసం, వ్యాధి సంకేతాలు కనిపించిన వెంటనే పిచికారీ చేయండి. పండ్ల గుమ్మడి కోసం, వ్యాధి సంకేతాలు కనిపించిన వెంటనే పిచికారీ చేయండి.

పిచికారీ పద్ధతి: పిచికారీ చేసే ముందు, పిచికారీ చేసే ద్రావణం యొక్క సరైన పరిమాణాన్ని లెక్కించండి. ఆకులు మరియు పండ్లు పూర్తిగా తడిసేలా సమానంగా పిచికారీ చేయండి.

పిచికారీ పరికరాలు: పిచికారీ చేసే ముందు పిచికారీ పరికరాలు శుభ్రంగా మరియు పనిచేస్తున్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

పిచికారీ ఫ్రీక్వెన్సీ: పిచికారీ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యాధి ఒత్తిడి మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పండ్ల తెగులు మరియు ఆలస్యమైన బ్లైట్ కోసం, 7 నుండి 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయండి. పండ్ల గుమ్మడి కోసం, 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయండి.

పిచికారీ సమయం: పండ్ల తెగులు మరియు ఆలస్యమైన బ్లైట్ కోసం, వ్యాధి సంకేతాలు కనిపించిన వెంటనే పిచికారీ చేయండి. పండ్ల గుమ్మడి కోసం, వ్యాధి సంకేతాలు కనిపించిన వెంటనే పిచికారీ చేయండి.

పిచికారీ పద్ధతి: పిచికారీ చేసే ముందు, పిచికారీ చేసే ద్రావణం యొక్క సరైన పరిమాణాన్ని లెక్కించండి. ఆకులు మరియు పండ్లు పూర్తిగా తడిసేలా సమానంగా పిచికారీ చేయండి.

పిచికారీ పరికరాలు: పిచికారీ చేసే ముందు పిచికారీ పరికరాలు శుభ్రంగా మరియు పనిచేస్తున్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

పిచికారీ ఫ్రీక్వెన్సీ: పిచికారీ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ వ్యాధి ఒత్తిడి మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పండ్ల తెగులు మరియు ఆలస్యమైన బ్లైట్ కోసం, 7 నుండి 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయండి. పండ్ల గుమ్మడి కోసం, 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారీ చేయండి.

**హెచ్చరిక