MAXILIZER®

Granules

Biostimultant Based on Seaweed Extracts

Maxilizer® Granules is a microbiology research product derived from Seaweed Extracts through unique process. An advanced technology formulation to stimulate various plant processes and maximize plant growth and yield.

Composition:

Seaweed Biomass Containing : Seaweed Extracts, Hydrolyzed proteins & Amino acids : 5% Min., Carrier Bentonite Granules : to make 100%, **Total : 100.00%**

Specification:

Colour: Black colour granules, Odour: Marine, pH: > 4.00, Bulk density: > 0.80.

Direction & Method of Application:

For Agriculture use only. Mix Maxilizer® Granules 10-15 kg with recommended doses of fertilizer (RDF) and broadcast in one hectare area.

For small trees (<5 years) apply Maxilizer® Granules 200 g per tree and for big trees more than 5 years, apply Maxilizer® Granules 500g per tree can be mixed recommended dose of fertilizer and apply near root zone.

Crop	Application	Time
Wheat/	1st Application	15-20 days after sowing along with recommended dose of fertilizer
Jowar/ Bajra/ Maize	2nd Application	At reproductive stage, At panicle initiation in Wheat
Paddy	1st Application	15-20 days after transplanting along with recommended dose of fertilizer
	2nd Application	At panicle initiation stage
Cotton	1st Application	At the time of sowing along with recommended dose of fertilizer
	2nd Application	40 to 45 days after sowing along with fertilizer
Soybean	1st Application	At the time of sowing along with recommended dose of fertilizer
	2nd Application	40 to 45 days after sowing along with fertilizer
Sugarcane	1st Application	30 days after planting
	2nd Application	50 to 60 days after planting along with fertilizer
	3rd Application	90 days after planting
Banana	1st Application	At the time of planting along with fertilizer
	2nd Application	60 to 75 days after planting along with fertilizer
	3rd Application	At flower initiation and fruit development
Vegetable, Chilli, Cauliflower, Tomato, Brinjal, Carrot, Coriander, Cabbage	1st Application	At the time of sowing / transplanting along with recommended dose of fertilizer
	2nd Application	20-30 days after 1st Application
Onion / Garlic	1st Application	10 days after transplanting
	2nd Application	30-35 days after transplanting at bulb formation stage
Potato	1st Application	15 days after sowing along with recommended Dose of fertilizer
	2nd Application	40-45 days after sowing
Tea	1st Application	Young plants 20gm per plant near root zone
	2nd Application	Apply after every 30-35 days
Apple	1st Application	15 days after harvest of last season
	2nd Application	At Green Tip stage
	3rd Application	At Wallnut Stage

Dosage : Use 10-15 kg per hectare

Compatibility : Compatible with most of the fertilizers.

Storage conditions : Keep in original container tightly closed at safe place. Avoid storing in direct sun light and freezing temperature.

Caution : Keep out of reach of children.

First Aid Measures : There are no specific hazards known to be associated with this product, although precautions should be taken to avoid unnecessary contact with skin, eyes and mouth. Eyes: Irrigate thoroughly with water at least 10 minutes. If discomfort persists obtain medical attention. Skin: Wash skin thoroughly with water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. In severe cases obtain medical attention. Ingestion: Wash out mouth thoroughly with water, obtain medical attention. Inhalation: Remove from exposure in open air. In severe cases obtain medical attention.

Disclaimer : As use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than uniform quality of the product.

English

मॅक्झीलायझर

ग्रॅन्यूल्स

समुद्री शेवाल के अर्क पर आधारित बायोस्टिमुलेंट

मैक्सिलाइज़र ग्रैन्यूल्स सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान उत्पाद है जो अद्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से समुद्री शैवाल के अर्क से प्राप्त होता है। विभिन्न पौधों की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और पौधों की वृद्धि और उपज को अधिकतम करने के लिए यह एक उन्नत तकनिकी निर्माण है।

संरचना: तरल बायोमास युक्त: समुद्री शैवाल का अर्क, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन और अमीनो एसिड: ५% न्यूनतम, कैरियर बेंटोनाइट ग्रैन्यूल्स : १००% बनाने के लिए, **कुल: १००.००%**

विनिर्देश:

रंग: काले रंग के दाने, गंध: समुद्री, पीएच: >४.००, थोक घनत्व:>०.८०.

उपयोग के दिशा निर्देश व तरीका:

केवल कृषि उपयोग के लिए। मैक्सिलाइज़र ग्रैन्यूल्स को १०–१५ किलो उर्वरक (आरडीएफ) की सुझाई खुराक में मिलाएं और एक हेक्टेयर क्षेत्र में फैलाएं।

छोटे पेड़ों के लिए (<५ साल) मैक्सिलाइज़र ग्रैन्यूल्स २०० ग्राम प्रति पेड़ और ५ साल से बड़े पेड़ों के लिए, मैक्सिलाइज़र ग्रैन्यूल्स ५०० ग्राम प्रति पेड़ उर्वरक की सुझाई खुराक में मिलाएं और जड़ के पास लगाएं।

पीक	उपयोग	समय
गेहूं/	पहला उपयोग	बुवाई के १५–२० दिन बाद उर्वरक की सुझाई खुराक के साथ
ज्वार/बाजरी/मक्का	दूसरा उपयोग	पुनउत्पादक अवस्था, गेहूं में बाली आने की अवस्था
धान	पहला उपयोग	रोपाई के १५–२० दिन बाद उर्वरक की सुझाई खुराक के साथ
	दूसरा उपयोग	बाली आने की अवस्था
कपास	पहला उपयोग	बुवाई के समय उर्वरक की सुझाई खुराक के साथ
	दूसरा उपयोग	बुवाई के ४० से ४५ दिन बाद उर्वरक के साथ
सोयाबीन	पहला उपयोग	बुवाई के समय उर्वरक की सुझाई खुराक के साथ
	दूसरा उपयोग	बुवाई के ४० से ४५ दिन बाद उर्वरक के साथ
गन्ना	पहला उपयोग	उर्वरक के साथ बुवाई के ३० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	उर्वरक के साथ बुवाई के ५० से ६० दिन बाद
	तीसरा उपयोग	उर्वरक के साथ ३रा प्रयोग बुवाई के ९० दिन बाद
केला	पहला उपयोग	उर्वरक के साथ रोपण के समय
	दूसरा उपयोग	उर्वरक के साथ रोपण के ६० से ७५ दिन बाद
	तीसरा उपयोग	फूल आने और फल विकास पर
सब्जी, मिर्च,फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, गाजर, धनिया, पत्ता गोभी	पहला उपयोग	बुवाई/रोपाई के समय उर्वरक की सुझाई खुराक के साथ
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग पहले उपयोग के २०–३० दिन बाद
प्याज/लहसुन	पहला उपयोग	रोपाई के १० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	कंद बनने के चरण में बुवाई के ३०–३५ दिन बाद
आलू	पहला उपयोग	बुवाई के १५ दिन बाद उर्वरक की सुझाई खुराक के साथ
	दूसरा उपयोग	बुवाई के ४०–४५ दिन बाद
चाय	पहला उपयोग	जड़ क्षेत्र के निकट नए पौधों में २० ग्राम प्रति पौधा
	दूसरा उपयोग	हर ३०–३५ दिनों के बाद उपयोग करें
सेब	पहला प्रयोग	पिछले मौसम की कटाई के १५ दिन बाद
	२रा प्रयोग	ग्रीन टिप निकलने की अवस्था पर
	३रा प्रयोग	अखरोट के आकार के फल बनाने पर

मात्रा : १०–१५ किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग करें

अनुकूलता : अधिकांश उर्वरकों के साथ सुसंगत।

भंडारण की स्थिति : मूल कंटेनर में सुरक्षित स्थान पर कसकर बंद रखें। सीधी धूप और ठंडे तापमान में भंडारण से बचें।

सावधानी : बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

प्राथमिक उपचार के उपाय : इस उत्पाद से जुड़े कोई विशिष्ट खतरे ज्ञात नहीं हैं, हालांकि त्वचा, आंखों और मुंह के अनावश्यक संपर्क से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आंखें: कम से कम १० मिनट पानी से अच्छी तरह से धोएं। यदि असुविधा बनी रहती है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। त्वचा: त्वचा को पानी से अच्छी तरह धोएं। सभी संक्रमित कपड़े हटा दें और दुबारा उपयोग से पहले धो लें। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। निगल लेने पर: पानी से अच्छी तरह से मुंह धोएं, चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। सांस से लेना: दूषित जगह से खुली हवा में ले जाएं। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

अस्वीकरण : चूंकि इस उत्पाद का उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है, हम उत्पाद की समान गुणवत्ता के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।

Hindi

मॅक्झीलायझर

ग्रॅन्यूल्स

समुद्री शेवाळ ह्या अर्क पर आधारित बायोस्टिमुलेंट

मॅक्झीलायझर ग्रॅन्यूल्स हे एका अद्वितीय प्रक्रियेद्वारे समुद्री शैवाळ, हायड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स व अमिनो एसिड्स ५% किमान, कॅरियर बेंटोनाइट ग्रॅन्युअल्स: १००% बनवण्यासाठी, **एकूण: १००.००%**

तपशील:

रंग: काळ्या रंगाचे कण, गंध: मरीन, पीएच: >४.००, बल्क घनता: >०.८०.

निर्देश व वापरण्याची पद्धत:

केवळ शेतीविषयक वापरासाठी. शिफारस केलेल्या खतांच्या (आरडीएफ) मात्रेबरोबर मॅक्झीलायझर ग्रॅन्युअल्स १०–१५ किग्रा मिसळा आणि एक हेक्टर क्षेत्रात पसरा.

लहान झाडांसाठी (<५ वर्षे) प्रति झाड मॅक्झीलायझर ग्रॅन्युअल्स २०० ग्रा वापरा आणि ५ वर्षांपेक्षा मोठ्या झाडांसाठी शिफारस केलेल्या प्रमाणात खतांच्या मात्रेबरोबर प्रति झाड ५०० ग्राम मिसळा आणि मुळांच्या जवळच्या क्षेत्रात वापरा.

पीक	वापर	वेळ
गहू/	१ ला वापर	पेरणीनंतर १५–२० दिवसांनी शिफारस केलेल्या खतांच्या मात्रेसोबत
ज्वारी/बाजरी/मका	२ रा वापर	पुनरुत्पादक टप्प्यावर, गव्हात लोम्ब्या येणे सुरू होण्याच्या वेळी
भात	१ ला वापर	लावणीनंतर १५–२० दिवसांनी शिफारस केलेल्या खतांच्या मात्रेसोबत
	२ रा वापर	लोम्ब्या येण्याला सुरवात होण्याच्या टप्प्यावर
कपाशी	१ ला वापर	पेरणीच्या वेळी शिफारस केलेल्या खतांच्या मात्रेसोबत
	२ रा वापर	पेरणीनंतर ४० ते ४५ दिवसांनी खतांच्या सोबत
सोयाबीन	१ ला वापर	खताच्या शिफारस केलेल्या मात्रेसोबत पेरणीच्या वेळी
	२ रा वापर	पेरणीनंतर ४० ते ४५ दिवसांनी खतांच्या सोबत
ऊस	१ ला वापर	लावणीनंतर ३० दिवसांनी खतांच्या सोबत
	२ रा वापर	लावणीनंतर ५०– ते ६० दिवसांनी खतांच्या सोबत
	३रा वापर	लावणीनंतर ९० दिवसांनी खतांच्या सोबत
केळी	१ ला वापर	लागवडीच्या वेळी खतांच्या सोबत
	२ रा वापर	लागवडीनंतर ६० ते ७५ दिवसांनी खतांच्या सोबत
	३ रा वापर	फुले येणे आणि फळ तयार होणे सुरू होण्याच्या वेळी
भाज्या, मिरची,फुलकोबी, टोमॅटो, गाजर, कोथिंबीर, पानकोबी	१ ला वापर	पेरणी/लावणीच्या वेळी शिफारस केलेल्या खतांच्या मात्रेसोबत
	२ रा वापर	१ ल्या वापरानंतर २०–३० दिवसांनी
कांदा/लसूण	१ ला वापर	लावणीनंतर १० दिवसांनी
	२ रा वापर	लावणीनंतर ३०–३५ दिवसांनी कांदा तयार होण्याच्या टप्प्यावर
बटाटे	१ ला वापर	पेरणीनंतर १५ दिवसांनी शिफारस केलेल्या खतांच्या मात्रेसोबत
	२रा वापर	लावणीनंतर ४०–४५ दिवसांनी
चहा	१ ला वापर	नवीन रोप मुळाच्या क्षेत्रात प्रति रोप २० ग्राम
	२ रा वापर	दर ३०–३५ दिवसांनी वापरा
सफरचंद	१ ला वापर	मागील हंगामातील कापणीनंतर १५ दिवसांनी
	२ रा वापर	ग्रीन टिप येण्याच्या टप्प्यावर
	३ रा वापर	अक्रोडाच्या आकाराचे फळ तयार झाल्यावर

मात्रा : प्रति हेक्टर १०–१५ किग्रा वापरा

अनुकूलता : बहुतेक खतांबरोबर अनुकूल.

साठवण्याच्या अटी : मूळ कंटेनर घट्ट बंद करून सुरक्षित जागी ठेवा. थेट सूर्यप्रकाश किंवा गोठवण्याचा तापमानात ठेवणे टाळा.

सावधानी : मुलांच्या हाती लागणार नाही असे पाहा.

प्राथमिक उपचार : या उत्पादनाशी संबंधित विशिष्ट ज्ञात धोके नाहीत, थायविक त्वचा, डोळे आणि तोंडाशी अनावश्यक संपर्क येणे टाळण्याची काळजी घ्यावी. डोळे: किमान १० मिनीटे भरपूर पाण्याने हबके मारा. अस्वस्थता चालू राहिली तर वैद्यकीय मदत मिळवा. त्वचा: संपूर्णपणे पाण्याने धुवा. दूषीत कपडे काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय मदत मिळवा. पोटात जाणे: तोंड पाण्याने धुवा, वैद्यकीय मदत मिळवा. श्वासातून आत जाणे: रुग्णाला ताजा हवेत हलवा. गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय मदत मिळवा.

अस्वीकार : या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे, उत्पादनाच्या एकसमान दर्जाव्यतिरिक्त आम्ही कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.

Marathi

ᱢᱚᱠᱥᱤᱞᱤᱞᱟᱭᱡᱚᱨ

ᱜᱨᱮᱱᱭᱩᱞᱥ

**ᱚᱞᱟᱝᱚᱞ ᱚᱞᱟᱝᱚᱞ ᱨᱮᱫᱤᱭᱚᱛᱚᱨᱤᱫᱚᱨᱤᱫᱚᱨᱤᱫ