MAXILIZER®

Liquid **Biostimultant Based on Seaweed Extracts**

Maxilizer® Liquid is a microbiology research product derived from Seaweed Extracts through unique process. An advanced technology formulation to stimulate various plant processes and maximize plant growth and yield.

Composition:
Total Solid Containing : Seaweed Extracts, Hydrolyzed proteins, Amino acids : 20.00% Min., Aqueous diluents, stabilizers and preservatives : 80.00%Max., **Total:100.00%**

Specification
Colour : Blackish Brown Liquid, Odour : Marine, Total solids : > 20.0%, pH : > 4.00, Specific gravity : > 1.0 gm/cc

Direction & Method of Application
For Agriculture use only. Shake the bottle well before use. Make dilution of Maxilizer® liquid at 500-750 ml per hectare by adding recommended quantity in water.

Crop	Application	Time
Wheat	1st Application	30 days after sowing
Paddy	1st Application	At Tillering stage (25-30 DAT-Days after transplanting)
	2nd Application	At Panicle initiation stage (45-60 DAT)
	3rd Application	At Milking stage (70-85 DAT)
Cotton	1st Application	After square formation
	2nd Application	15 days after first application (Pre Bloom)
	3rd Application	15 days after second application (Boll formation)
Soybean	1st Application	Pre flowering Stage
	2nd Application	At the time of pod setting
Sugarcane	1st Application	45 to 70 days after planting
	2nd Application	6 Weeks after first application
	3rd Application	8 Weeks after second Application
Banana	1st Application	75 days after planting
	2nd Application	125 days after fruit setting
Vegetables, Chilli, Cauliflower, Tomato, Brinjal Carrot, Coriander, Cabbage,	1st Application	30 days after planting
	2nd Application	At flower initiation stage
	3rd Application	Fruit Formation Stage
Onion	1st Application	Vegetative stage (15-20 DAT)
	2nd Application	Bulb formation stage (30-35 DAT)
	3rd Application	Bulb development stage (65-75 DAT)
Garlic	1st Application	6 — 8 leaf stage
	2nd Application	2 to 3 weeks after first application
Potato	1st Application	6 — 8 leaf stage
	2nd Application	At 40 To 45 days after first application
Grapes	1st Application	Pre flowering stage
	2nd Application	At the time of fruit setting
	3rd Application	20 days after fruit setting
Apple/ Plum/ Peach/ Cherry	1st Application	At the time of intensive growth
	2nd Application	At the time of fruit setting
Tea	1st Application	At rapid leaf expansion
	2nd Application	After Each picking

Dosage: 500-750 ml per hectare

Compatibility: Maxilizer® Liquid is compatible with most agriculturally used pesticides. It is always recommended to check the compatibility before use.

Storage conditions : Keep in original container tightly closed at safe place. Avoid storing in direct sun light and freezing temperature.

Caution: Keep out of reach of children.

First Aid Measures: There are no specific hazards known to be associated with this product, although precautions should be taken to avoid unnecessary contact with skin, eyes and mouth. Eyes: Irrigate thoroughly with water at least 10 minutes. If discomfort persists obtain medical attention. Skin: Wash skin thoroughly with water. Remove contaminated clothing and wash before reuse. In severe cases obtain medical attention. Ingestion: Wash out mouth thoroughly with water, obtain medical attention. Inhalation: Remove from exposure in open air. In severe cases obtain medical attention.

Disclaimer : As use of this product is beyond our control, we do not take any responsibility other than uniform quality of the product.

English

मॅक्झीलायझर

द्रव **समुद्री वनस्पतीच्या अर्कावर आधारित जैवउत्तेजक**

मॅक्झीलायझर द्रव हे एका अद्वितीय प्रक्रियेद्वारे समुद्री वनस्पतीच्या अर्कापासून काढलेले एक सूक्ष्मजीवशास्त्रीय संशोधन उत्पादन आहे. रोपाच्या विविध प्रक्रियेना उत्तेजित करण्यासाठी रोपाची वाढ आणि पीक जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी एक प्रगतिशील तंत्रज्ञान आहे.

संरचना:
एकूण घन सामग्री: समुद्री वनस्पतीचा अर्क, हायड्रोलाइझड् प्रथीने, अमिनो एसिडस्: २०.००% किमान, एक्विअस डायलुएंट्स, स्टॅबिलायझर्स आणि संवर्धक: ८०% कमाल. **एकूण:१००%**

तपशील:
रंग काळसर तपकिरी द्रव, गंध: मरीन, एकूण घन पदार्थ: >२०.०%, pH : >४.००,
विशिष्ट गुरुत्व: >१.० ग्रा/सीसी.

निर्देश व वापरण्याची पद्धत :
केवळ शेतीविषयक वापरासाठी. वापरण्यापूर्वी बाटली चांगली हलवा. मेक्सीलायझर शिफारस केलेल्या प्रमाणात प्रति हेक्टरी ५०० ते ७५० मिली वापरा.

पीक	वापर	वेळ
गहू	१ ला वापर	पेरणीनंतर ३० दिवसांनी
भात	१ ला वापर	कळूं फुटायच्या टप्प्यावर (लावणी केल्यानंतर २५-३० दिवस)
	२ रा वापर	लोम्बा येण्याचा टप्पा (लावणी केल्यानंतर ४१-६० दिवस)
	३ रा वापर	लावणी केल्यानंतर ७०-८५ दिवस
कपाशी	१ ला वापर	बोंडूळी तयार झाल्यानंतर
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर १५ दिवसांनी (प्री ब्लूम)
	३ रा वापर	दुसऱ्या वापरानंतर १५ दिवसांनी (बोंड तयार होणे)
सोयबीन	१ ला वापर	फुलोरा पूर्व टप्पा
	२ रा वापर	शेंगा सेटिंगच्या वेळी
ऊस	१ ला वापर	लावणीनंतर ४५ ते ७० दिवसांनी
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर ६ आठवड्यांनी
	३ रा वापर	दुसऱ्या वापरानंतर ८ आठवड्यांनी
केळी	१ ला वापर	लावणीनंतर ७५ दिवसांनी
	२ रा वापर	फळ सेटिंगनंतर १२५ दिवसांनी
भाज्या, मिरची, फुलकोबी, टोमॅटो, वांगी, गाजर, कोथिंबीर, पानकोबी	१ ला वापर	लावणीनंतर ३० दिवसांनी
	२ रा वापर	फुले येण्याचा टप्पा
	३ रा वापर	फळ निर्मितीचा टप्पा
कांदा	१ ला वापर	शाकीय वाढीचा टप्पा लावणी नंतर १५ ते २० दिवस
	२ रा वापर	कांदा तयार होण्याचा टप्पा (लावणी नंतर ३० ते ३५ दिवस)
	३ रा वापर	कांदा विकसित होण्याचा टप्पा (लावणी नंतर ६० ते ७५ दिवस)
लसूण	१ ला वापर	६ –८ पानांचा टप्पा
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर २ ते ३ आठवडे
बटाटे	१ ला वापर	६ ते ८ पानांचा टप्पा
	२ रा वापर	पहिल्या वापरानंतर ४० ते ४५ दिवशी
द्राक्षे	१ ला वापर	फुलोऱ्याच्या टप्प्यावर
	२ रा वापर	फळ सेटिंगच्या वेळी
	३ रा वापर	फळ सेटिंगनंतर २० दिवसांनी
सफरचंद/प्लम/ पीच/चेरी	१ ला वापर	तीव्रतर वाढीच्या वेळी
	२ रा वापर	फळ सेटिंगच्या वेळी
चहा	१ ला वापर	पाने प्रथम वेगाने विस्तारताना
	२ रा वापर	प्रत्येक खुडणीनंतर

मात्रा: प्रति हेक्टर ५००–७५० मिली

अनुकूलता: मॅक्सिलाइझर द्रव हे शेतात वापरल्या जाणाऱ्या बहुतेक सर्व कीटकनाशकांना अनुकूल आहे. वापरण्यापूर्वी नेहमीच अनुकूलता तपासण्याची शिफारस केली जाते.

साठवण्याच्या अटी: मूळ कंटेनर घट्ट बंद करून सुरक्षित जागी ठेवा. थेट सूर्यप्रकाश किंवा गोठवणाऱ्या तापमानात ठेवणे टाळा.

सावधान: मुलांच्या हाती लागण्यापासून दूर ठेवा.

प्रथमोपचार: या उत्पादनाशी संबंधित विशिष्ट ज्ञात धोके नाहीत, थथापि त्वचा, डोळे आणि तोंडाशी अवश्यक संपर्क येण टाळण्याची काळजी घ्यायी. डोळे: किमान १० मिनीट भरपूर पाण्याने हळके नारा. अस्वस्थता चालू राहिली तर वैद्यकीय मदत मिळवा. त्वचा: संपूर्णपणे पाण्याने धुवा. दूषीत कपडे काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय मदत मिळवा. पोटात जाणे: तोंड पाण्याने धुवा. वैद्यकीय मदत मिळवा. श्वासासूद आत जाणे: रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा. गंभीर प्रकरणात वैद्यकीय मदत मिळवा.

डिस्क्लेमर : या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे, उत्पादनाच्या एकसमान दर्जाव्यतिरिक्त आम्ही कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.

Hindi

मैक्सिलाइजर

लिक्विड **समुद्री शैवाल के अर्क पर आधारित बायोस्टिमुलेंट**

मैक्सिलाइजर लिक्विड सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान उत्पाद है जो अद्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से समुद्री शैवाल के अर्क से प्राप्त होता है। विभिन्न पौधों की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने और पौधों की वृद्धि और उपज को अधिकतम करने के लिए यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण है।

संरचना:
कुल ठोस में शामिल: समुद्री शैवाल का अर्क, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, अमीनो एसिड: २०.००% न्यूनतम, घुला देनेवाला द्रव्य, स्टेबलाइजर्स और संरक्षक: ८०.००% अधिकतम, **कुल: १००.००%**

स्पेसिफिकेशन
रंग: काला भूरा तरल, गंध: समुद्री, कुल ठोस: >२०.०%, पीएच: >४.००, विशिष्ट गुरुत्व: >१.० ग्राम / सीसी

उपयोग के दिशा निर्देश व तरीका
केवल कृषि उपयोग के लिए। उपयोग से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। पानी में सुझाई गयी मात्रा मिलाकर ५००–७५० मिली प्रति हेक्टेयर की दर से मैक्सिलाइजर लिक्विड को मिलाएं।

फसल	उपयोग	समय
गेहूं	पहला उपयोग	बुवाई के ३० दिन बाद
धान	पहला उपयोग	जुताई के चरण में पहला आवेदन (बुवाई के २५ से ३० दिन बाद)
	दूसरा उपयोग	बाली निकलने की अवस्था में (बुवाई के ४५ से ६० दिन बाद)
	तीसरा उपयोग	दाने भरने की अवस्था में (बुवाई के ७० से ८५ दिन बाद)
कपास	पहला उपयोग	स्क्वेयर बनाने के बाद
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के १५ दिन बाद (फूल आने से पहले)
	तीसरा उपयोग	दूसरे उपयोग के १५ दिन बाद (टिंडे बनने से पहले)
सोयाबीन	पहला उपयोग	फूल आने से पहले की अवस्था
	दूसरा उपयोग	फली आने के समय
गन्ना	पहला उपयोग	बुवाई के ४५ से ७० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग पहले उपयोग के ६ सप्ताह बाद
	तीसरा उपयोग	तीसरा उपयोग दूसरे उपयोग के ८ सप्ताह बाद
केला	पहला उपयोग	पहला उपयोग रोपण के ७५ दिन बाद
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग फल लगने के १२५ दिन बाद
सब्जियां, मिर्च, फूलगोभी, टमाटर, बैंगन गाजर, धनिया, पत्ता गोभी	पहला उपयोग	बुवाई के ३० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	फूल निकलने की अवस्था में
	तीसरा उपयोग	फल निर्माण की अवस्था में
प्याज	पहला उपयोग	वानस्पतिक विकास की अवस्था (बुवाई के १५ से २० दिन बाद)
	दूसरा उपयोग	बल्ब गठन चरण (बुवाई के ३० से ३५ दिन बाद)
	तीसरा उपयोग	तीसरा उपयोग बल्ब विकास चरण (बुवाई के ६० से ६५ दिन बाद)
लहसुन	पहला उपयोग	६ – ८ पत्ती का चरण
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के २ से ३ सप्ताह बाद
आलू	पहला उपयोग	६ – ८ पत्ती का चरण
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के ४० से ४५ दिनों के बाद
अंगूर	पहला उपयोग	फूल आने से पहले का चरण
	दूसरा उपयोग	फल लगने के समय
	तीसरा उपयोग	फल लगने के २० दिन बाद
सेब / प्लम / आड़ू / चेरी	पहला उपयोग	गहन विकास के समय
	दूसरा उपयोग	फल आने के समय
चाय	पहला उपयोग	पहले तेजी से पत्ती विस्तार पर
	दूसरा उपयोग	प्रत्येक तुड़ाई के बाद

खुराक: ५००–७५० मिली प्रति हेक्टेयर

अनुकूलता: मैक्सिलाइजर लिक्विड कृषि उपयोग के अधिकांश कीटनाशी के साथ सुसंगत है। उपयोग से पहले संगतता की जांच की हमेशा अनुशंसा की जाती है।

भंडारण की स्थिति: मूल कंटेनर में सुरक्षित स्थान पर कसकर बंद रखें। सीधी धूप और ठंडे तापमान में भंडारण से बचें।

सावधानी: बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

प्राथमिक उपचार के उपाय: इस उत्पाद से जुड़े कोई विशिष्ट खतरे ज्ञात नहीं हैं, हालांकि त्वचा, आंखों और मुंह के अनावश्यक संपर्क से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आंखें: कम से कम १० मिनट पानी से अच्छी तरह से धोएं। यदि असुविधा बनी रहती है तो चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। त्वचा: को पानी से अच्छी तरह धोएं। सभी संक्रमित कपड़े हटा दें और दुबारा उपयोग से पहले धो लें। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। निगल लेने पर: पानी से अच्छी तरह से मुंह धोएं, चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। साँस द्वारा अंदर लेना: दूषित जगह से खुली हवा में ले जाएं। गंभीर मामलों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करें।

अस्वीकरण: चूंकि इस उत्पाद का उपयोग हमारे नियंत्रण से बाहर है, हम उत्पाद की समान गुणवत्ता के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

Marathi

મૅક્ઝિલાઇઝર

પ્રવાહી **સમુદ્રી સેવાળ અર્ક પર આધારિત બાયોસ્ટિમુલેંટ**

મૅક્ઝિલાઇઝર પ્રવાહી એક માઇક્રોબાયોલોજી રિસર્ચ ઉત્પાદન છે જેને અનોખી પ્રક્રિયા દ્વારા સમુદ્રી સેવાળ અર્કમાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ એક આધુનિક ટેક્નોલોજી ધરાવતી સંરચના છે જે વિવિધ પ્લાન્ટ પ્રોસેસીસને ઉત્તેજીત કરે છે અને છોડના વિકાસ અને ઉપજને વધારે છે.

સંરચના:
કુલ ઠોસ માં શામિલ: સમુદ્રી શેવાળ ના અર્ક, હાઇડ્રોલાઇઝ્ડ પ્રોટીન, અમીનો એસિડ: ૨૦.૦૦% ન્યૂનતમ, ઘુલા દેનેવાલા દ્રવ્ય, સ્ટેબલાઇઝર્સ અને સંરક્ષક: ૮૦.૦૦% અધિકતમ, **કુલ: ૧૦૦.૦૦%**

સ્પેસિફિકેશન
રંગ: કાલા ભૂરા તરલ, ગંધ: સમુદ્રી, કુલ ઠોસ: >૨૦.૦%, pH: >૪.૦૦, વિશિષ્ટ ગુરુત્વ: >૧.૦ ગ્રામ / સીસી

ઉપયોગ કે દિશા નિર્દેશ વ તરીકા
કેવળ કૃષિ ઉપયોગ માટે જ. ઉપયોગ સે પહલે બોતલ કો અચ્છી તરહ હિલાએં। પાની મેં સુઝાઈ ગયી માત્રા મિલાકર ૫૦૦–૭૫૦ મિલી પ્રતિ હેક્ટેયર કી દર સે મૈક્સિલાઇઝર લિક્વિડ કો મિલાએં।

फसल	उपयोग	समय
गेहूं	पहला उपयोग	बुवाई के ३० दिन बाद
धान	पहला उपयोग	जुताई के चरण में पहला आवेदन (बुवाई के २५ से ३० दिन बाद)
	दूसरा उपयोग	बाली निकलने की अवस्था में (बुवाई के ४५ से ६० दिन बाद)
	तीसरा उपयोग	दाने भरने की अवस्था में (बुवाई के ७० से ८५ दिन बाद)
कपास	पहला उपयोग	स्क्वेयर बनाने के बाद
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के १५ दिन बाद (फूल आने से पहले)
	तीसरा उपयोग	दूसरे उपयोग के १५ दिन बाद (टिंडे बनने से पहले)
सोयाबीन	पहला उपयोग	फूल आने से पहले की अवस्था
	दूसरा उपयोग	फली आने के समय
गन्ना	पहला उपयोग	बुवाई के ४५ से ७० दिन बाद
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग पहले उपयोग के ६ सप्ताह बाद
	तीसरा उपयोग	तीसरा उपयोग दूसरे उपयोग के ८ सप्ताह बाद
केला	पहला उपयोग	पहला उपयोग रोपण के ७५ दिन बाद
	दूसरा उपयोग	दूसरा उपयोग फल लगने के १२५ दिन बाद
ડેળાં	पहला उपयोग	६ग ओहां પછી १२५ દિવસે
શાકભાજી, મરચાં, ફ્લાવર, ટામેટાં, રીંગણાં, ગાજર, ધાનિયા, પાંદડાં કોબીજ	पहला उपयोग	वानस्पतिक विकास की अवस्था (बुवाई के १५ से २० दिन बाद)
	दूसरा उपयोग	बल्ब गठन चरण (बुवाई के ३० से ३५ दिन बाद)
	तीसरा उपयोग	तीसरा उपयोग बल्ब विकास चरण (बुवाई के ६० से ६५ दिन बाद)
ડુંગળી	पहला उपयोग	६ – ८ પાંદડાં કા ચરણ
	दूसरा उपयोग	पहले उपयोग के २ से ३ सप्ताह बाद
	तीसरा उपयोग	६ – ८ પાંદડાં કા ચરણ
બટાકાં	पहला उपयोग	४० से ४५ दिनों के बाद
	दूसरा उपयोग	फूल आने से पहले का चरण
દ્રાક્ષ	पहला उपयोग	फल लगने के समय
	दूसरा उपयोग	फल लगने के २० दिन बाद
સફરજન/પ્લમ/ પીચ/ચેરી	पहला उपयोग	गहन विकास के समय
	दूसरा उपयोग	फल आने के समय
चाय	पहला उपयोग	पहले तेजी से पत्ती विस्तार पर
	दूसरा उपयोग	प्रत्येक तुड़ाई के बाद

मात्रा: प्रति हेक्टर ५००–७५० મિલી

અનુકૂલતા: મૅક્સિલાઇઝર પ્રવાહી કૃષિમાં વપરાતાં મોટાભાગનાં કીટકનાશકો સાથે સુસંગત છે. હંમેશા ભલામણ કરવામાં આવે છે કે વાપરતાં પહેલાં સુસંગતતા તપાસી લો.

સંગ્રહ કરવાની શરતો: અને અસલ કન્ટેનમાં સલામત જગ્યાએ ઢાંકણાને ચુસ્તપણે બંધ કરીને રાખો. સીધા સૂર્યપ્રકાશમાં અને થીજી જતાં તાપમાનમાં સંગ્રહ કરવાનું ટાળો.

સાવચેતી: બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

પ્રાથમિક ઉપચારમાં નમસ્તે: આ ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા કોઈ ચોક્કસ ખતરાઓ નથી, આમ છતાં, ત્વચા, આંખો અને મોં સાથેનો બિનઆવશ્યક સંપર્ક ટાળો. આંખો: ઓછામાં ઓછી ૧૦ મિનિટ સુધી આંખોમાં પાણીની છાલક મારો. જો બેચેની ચાલુ રહે તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. ત્વચા: ત્વચાને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાંખો. દૂષિત થયેલાં કપડાંને ફાડી નાંખો અને ફરી વાર પહેરતાં પહેલાં ધોઈ નાંખો. ગંભીર કિસ્સામાં ડૉક્ટરી સલાહ લો. ગળવું: મોઢાને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈને ફરીને ધોઈ નાંખો. ડૉક્ટરની સલાહ લો. શ્વાસમાં જાય તો: ઉઘાડ જગ્યામાંથી ખુલ્લી હવામાં ખસેડો. ઉગ્ર કિસ્સાઓમાં ડૉક્ટરની સલાહ લો.

અસ્વીકારક: ઉત્પાદનનો ઉપયોગ અમારા નિયંત્રણની બહાર થતો હોવાથી અમે ઉત્પાદનની એકસમાન ગુણવત્તાને છોડીને કોઈ અન્ય જવાબદારી લેતાં નથી.

Gujarati

ᱢᱮᱠᱥᱤᱞᱟᱭᱡᱚᱨ

ᱞᱤᱠᱤᱫ **ᱚᱞᱤᱫᱚᱨᱤᱫ ᱵᱷᱟᱞᱤᱫᱚᱨᱤᱫ ᱢᱮᱨᱤᱫᱚᱨᱤᱫ ᱵᱟᱭᱚᱞᱚᱡᱤᱠᱟᱞ ᱞᱮᱞᱤᱞᱚᱞᱤᱞᱚᱞᱤᱞᱚ